

疾病、傷害及び死因統計分類提要(2003年版) 第1巻 総論(案)

注:WHO勧告文及び日本適用案の文中における、追加、変更等は、下線により、又削除は取り消線によって示している。

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
1	<p>3.1.5 Categories with common characteristics</p> <p><i>Categories limited to one sex</i></p> <p>The following categories apply only to females:</p> <p>A34, B37.3...Z32-36, Z39<u>-</u>, Z43.7, Z87.5, Z97.5.</p>	<p>3.1.5 共通の特徴を持った分類項目</p> <p>性により制限される分類項目</p> <p>下記の分類項目は女性に対してのみ適用される：</p> <p>A34, B37.3... Z32-36, Z39<u>-</u>, Z43.7, Z87.5, Z97.5</p>	<p>3.1.5 共通の特徴を持った分類項目</p> <p>性により制限される分類項目</p> <p>下記の分類項目は女性に対してのみ適用される：</p> <p>A34, B37.3 ... Z32-36, Z39, Z43.7, Z87.5, Z97.5</p>	適用コードの修正
2	<p>4.1.3 International form of medical certificate of cause of death</p> <p>... Part I of the form is for diseases related to the train of events leading directly to death, and Part II is for unrelated but contributory conditions.</p> <p><u>The medical practitioner or other qualified certifier should use his or her clinical judgement in completing the medical certificate of cause of death. Automated systems must not include lists or other prompts to guide the certifier as these necessarily limit the range of diagnoses and therefore have an adverse effect on the accuracy and usefulness of the report.</u></p>	<p>4.1.3 死亡診断書の国際様式</p> <p>..この様式の 欄は、直接に死を引き起こした一連の事象に関連した疾病に対して使用され、 欄は、関連はないが寄与した病態について使用される。</p> <p><u>医師及びその他の死亡証明者は、自らの臨床的判断により死亡診断書を完成させるものとする。自動システムには、この診断書を導くための一覧またはその他の指示を含んではならない。なぜなら、これらは必然的に診断の範囲を限定し、それゆえ報告の正確さと有用性に逆効果を及ぼすからである。</u></p>	<p>4.1.3 死亡診断書の国際様式</p> <p>..この様式の 欄は、直接に死を引き起こした一連の事象に関連した疾病に対して使用され、 欄は、関連はないが寄与した病態について使用される。</p>	説明文の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
3	<p>4.1.6 Some considerations on selection rules</p> <p><i>Example 5:</i> I (a) Generalized metastases <u>5 weeks</u></p> <p>(b) Bronchopneumonia <u>3 days</u></p> <p>(c) Lung cancer <u>11 months</u></p>	<p>4.1.6 選択ルールについての留意事項</p> <p>例5: I (a)全身転移 <u>5週間</u></p> <p>(b)気管支肺炎 <u>3日間</u></p> <p>(c)肺癌 <u>11ヶ月</u></p>	<p>4.1.6 選択ルールについての留意事項</p> <p>例5: I (a)全身転移</p> <p>(b)気管支肺炎</p> <p>(c)肺癌</p>	<p>期間の追加</p> <p>期間の追加</p> <p>期間の追加</p>
4	<p>Rule 3</p> <p><i>Assumed direct consequences of another condition</i></p> <p><u>Any pneumonia in J12-J18 should be considered an obvious consequence of conditions that impair the immune system. Pneumonia in J18.0 and J18.2-J18.9 should be considered an obvious consequence of wasting diseases (such as malignant neoplasm and malnutrition) and diseases causing paralysis (such as cerebral haemorrhage or thrombosis), as well as serious respiratory conditions, communicable diseases, and serious injuries. Pneumonia in J18.0 and J18.2-J18.9, J69.0, and J69.8 should also be considered an obvious consequence of conditions that affect the process of swallowing. Note: A list of conditions is available from the World Health Organization.</u></p>	<p>ルール3</p> <p>他の病態からの直接影響の推定</p> <p><u>J12-J18のすべての肺炎は、免疫機構を弱める病態の明白な影響と考えるべきである。J18.0とJ18.2-J18.9の肺炎は、消耗病(悪性新生物や栄養失調症など)や麻痺の原因となる疾病(脳出血または血栓症など)、そしてまた重度の呼吸器異常、伝染病および重度の外傷の明白な影響と考えるべきである。J18.0とJ18.2-J18.9、J69.0およびJ69.8の肺炎もまた、嚥下過程に影響を及ぼす病態の明白な影響と考えるべきである。注：病態一覧は世界保健機関から入手可能である。</u></p>	<p>ルール3</p> <p>他の病態からの直接影響の推定</p> <p>肺炎および気管支肺炎は、たぶんあらゆる疾病の合併症として受け入れられる可能性がある。特に、気管支肺炎は、特定の伝染病や重症の損傷と同様に、消耗性疾患(たとえば、悪性新生物、栄養失調(症))や麻痺を生じさせる疾患(たとえば、脳損傷、脊髄損傷、脳出血、脳血栓症、ポリオ)の影響によるものと考えられる。</p>	<p>現項目内容の差し替え</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>Any disease</u> Diseases described or qualified as "embolic" may be assumed to be a direct consequence of venous thrombosis, phlebitis or thrombophlebitis, valvular heart disease, atrial fibrillation, childbirth and or any operation. <u>However, there must be a clear route from the place where the thrombus formed and the place of the embolism. Thus, venous thrombosis or thrombophlebitis may cause pulmonary embolism. Thrombi that form in the left side of the heart (for example on mitral or aortic valves), or are due to atrial fibrillations, may cause embolism to the arteries of the body circulation. Similarly, thrombi that form around the right side heart valves (tricuspid and pulmonary valves) may give rise to embolism in the pulmonary arteries. Also, thrombi that form in the left side of the heart could pass to the right side if a cardiac septal defect is present.</u></p> <p><u>Arterial embolism in the systemic circulation should be considered an obvious consequence of atrial fibrillation. When pulmonary embolism is reported due to atrial fibrillation, the sequence should be accepted. However, pulmonary embolism should not be considered an obvious consequence of atrial fibrillation.</u></p>	<p>「塞栓性」と記載または診断された疾病については、<u>静脈血栓症、静脈炎、血栓（性）静脈炎、弁膜性心疾患、心房細動、分娩またはその他の手術の直接の影響によるものと考えられる。ただし、血栓が形成された場所と塞栓症の場所からも明確な経路がなくてはならない。このため、静脈血栓症または血栓（性）静脈炎は肺塞栓症を引き起こす場合がある。心臓左側に形成される血栓（例えば僧帽弁または大動脈弁上など）、または心房細動を原因とする血栓は、身体循環の動脈に塞栓症を引き起こす場合がある。同様に、右側心臓弁の周囲に形成される血栓（三尖弁と肺動脈弁）は、肺動脈に塞栓症を引き起こす場合がある。また、心臓左側に形成される血栓は、心臓中隔欠損症が存在する場合に、右側に通過する場合がある。</u></p> <p><u>体循環内の動脈塞栓症は心房細動の明らかな影響であると考えべきである。肺（動脈）塞栓症が心房細動を原因とすると報告されたときは、その因果関係を採用する。ただし、肺（動脈）塞栓症は、心房細動の明らかな結果であると考えてはならない。</u></p>	<p>「塞栓性」と記載または診断された疾病については、<u>静脈血栓症、静脈炎、血栓（性）静脈炎、弁膜性心疾患、心房細動、分娩または手術の直接の影響によるものと考えられる。</u></p>	<p>説明文の削除、修正、追加</p> <p>説明文の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>Dementia, without a mention of specified cause, should be considered a consequence of conditions that typically involve irreversible brain damage. However, when a specified cause is given, only a condition that may lead to irreversible brain damage should be accepted as cause of the dementia, even if irreversible brain damage is not a typical feature of the condition.</u></p> <p>Any disease described as secondary should be assumed to be a direct consequence of the most probable primary cause entered on the certificate.</p> <p>Secondary or unspecified anaemia, malnutrition, marasmus or cachexia may be assumed to be a consequence of any malignant neoplasm, <u>paralytic disease, or disease which limits the ability to care for oneself, including dementia and degenerative diseases of the nervous system.</u></p> <p>Nephritic syndrome may be assumed to be a consequence of any streptococcal infection (scarlet fever, streptococcal sore throat, etc). <u>Acute renal failure should be assumed as an obvious consequence of a urinary tract infection, provided that there is no indication that the renal failure was present before the urinary tract infection.</u></p>	<p><u>原因について明示された言及のない痴呆は、一般的に不可逆性脳障害を伴う一連の病態の影響とみなすべきである。ただし、明示された原因がある場合、不可逆性脳障害に繋がる可能性のある病態だけがその痴呆の原因として考えられるべきである。これは不可逆性脳損傷がその結果として引き起こされる病態の典型的特徴でない場合も同様である。</u></p> <p>二次性<続発性>と記載された疾患は、死亡診断書に記載されたこれに最も因果関係のある一次的原因の影響によるものと考えられる。</p> <p>二次性<続発性>もしくは詳細不明の貧血、栄養失調(症)、消耗症<マラスムス>または悪液質は、悪性新生物、<u>麻痺性疾患、または痴呆や神経系の変性疾患など、自立能力を制限する病気の影響によるものと考えられる。</u></p> <p>腎炎症候群は、レンサ球菌感染症(猩紅熱、レンサ球菌咽頭痛<sore throat>など)の影響によるものと考えられる。<u>急性腎不全は、それが尿路感染症よりも前から存在していたとの証拠がない限り、尿路感染症の明らかな影響によるものと考えられる。</u></p>	<p>二次性<続発性>と記載された疾患は、死亡診断書に記載されたこれに最も因果関係のある一次的原因の影響によるものと考えられる。</p> <p>二次性<続発性>もしくは詳細不明の貧血、栄養失調(症)、消耗症<マラスムス>または悪液質は、悪性新生物の影響によるものと考えられる。</p> <p>腎炎症候群は、レンサ球菌感染症(猩紅熱、レンサ球菌咽頭痛<sore throat>など)の影響によるものと考えられる。</p>	<p>説明文の追加</p> <p>説明文の修正、追加</p> <p>説明文の修正、追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
5	<p>4.1.8 Modification of the selected cause</p> <p>Some of the modification rules require further application of the selection rules, which will not be difficult for experienced coders, but it is important to go through the process of selection, modification and, if necessary, reselection. <u>After application of the modification rules, selection Rule 3 should be reapplied.</u></p>	<p>4.1.8 選択された死因の修正</p> <p>いくつかの修正ルールを適用するに際しては、選択ルールをもう一度適用することが必要となる場合がある。これは経験のあるコーダーには、さほど困難なことではないが、選択、修正そして必要な場合は更に再選択という過程を経ることが重要である。<u>修正ルールの適用後、選択ルール3を再び適用する必要がある。</u></p>	<p>4.1.8 選択された死因の修正</p> <p>いくつかの修正ルールを適用するに際しては、選択ルールをもう一度適用することが必要となる場合がある。これは経験のあるコーダーには、さほど困難なことではないが、選択、修正そして必要な場合は更に再選択という過程を経ることが重要である。</p>	<p>説明文の修正、追加</p>
6	<p>4.1.9 The modification rules</p> <p><i>Rule A. Senility and other ill-defined conditions</i></p> <p><u>Where the selected cause is ill-defined and a condition classified elsewhere is reported on the certificate, reselect the cause of death as if the ill-defined condition had not been reported, except to take account of that condition if it modifies the coding. The following conditions are regarded as ill-defined: I46.9 (Cardiac arrest, unspecified); I95.9 Hypotension, unspecified); I99 (Other and unspecified disorders of circulatory system); J96.0 (Acute respiratory failure); J96.9 (Respiratory failure, unspecified); P28.5 (Respiratory failure of newborn); R00-R94 or R96-R99 (Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified). Note that R95 (Sudden infant death) is not regarded as ill-defined.</u></p>	<p>4.1.9 修正ルール</p> <p>ルールA. 老衰およびその他の診断名不明確の病態</p> <p><u>選ばれた死因が不明確で、他に分類される病態が死亡診断書に記載されている場合は、その不明確な病態が記載されていないときと同様に、死因を選びなおす。ただし、コードが当該病態により変更される場合にそれを考慮するときはこれを除く。I46.9(心停止、詳細不明)；I95.9(低血圧(症)、詳細不明)；I99(循環器系のその他および詳細不明の障害)；J96.0(急性呼吸不全)；J96.9(呼吸不全、詳細不明)；P28.5(新生児の呼吸不全)；R00-R94またはR96-R99(症状、徴候および異常な臨床・検査所見、別項に分類なし)の各病態は、不明確とみなされる。R95(乳幼児突然死症候群)は不明確とみなされないことに注意する。</u></p>	<p>4.1.9 修正ルール</p> <p>ルールA. 老衰およびその他の診断名不明確の病態</p> <p>選ばれた死因が、R95(乳幼児突然死症候群)を除く第X章(症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの)に分類され、R00-R94またはR96-R99以外に分類される病態が死亡診断書に記載された場合は、第X章に分類される病態が記載されなかったものとして死因を選びなおす。ただし、その病態がコーディングを修飾している場合は、その病態を考慮する。</p>	<p>現項目内容の差し替え</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><i>Rule B. Trivial conditions</i></p> <p>Where the selected cause is a trivial condition unlikely to cause death and a more serious condition (<u>any condition except an ill-defined or another trivial condition</u>) is reported, reselect the underlying cause... ...of the trivial condition, select the adverse reaction.</p> <p><u>When a trivial condition is reported as causing any other condition, the trivial condition is not discarded, i.e. Rule B is not applicable.</u></p>	<p>ルールB. 軽微な病態</p> <p>選ばれた死因が、それ自身では死因になりそうもない軽微な病態であり、さらに重篤な病態（<u>不明確または他の軽微な病態を除く病態</u>）が記載されている場合は、原死因を選びなおす。... その副作用を選ぶ。</p> <p><u>軽微な病態が他の病態の原因となっていると記載されている場合は、その軽微な病態は無視されない。つまりルールBは適用されない。</u></p>	<p>ルールB. 軽微な病態</p> <p>選ばれた死因が、それ自身では死因になりそうもない軽微な病態であり、さらに重篤な病態が記載されている場合は、原死因を選びなおす。... その副作用を選ぶ。</p>	<p>説明文の修正、追加</p> <p>説明文の追加</p>
7	<p>4.1.10 Examples of the modification rules</p> <p><i>Rule B. Trivial conditions</i></p> <p>(A) Where the selected cause is a trivial condition unlikely to cause death and a more serious condition (<u>any condition except an ill-defined or another trivial condition</u>) is reported, reselect the underlying cause as if the trivial condition has not been reported. If the death was the result of an adverse reaction to treatment of the trivial condition, select the adverse reaction.</p> <p><i>Example 38:</i> I (a) Dental caries</p>	<p>4.1.10 修正ルール</p> <p>ルールB. 軽微な病態</p> <p>(A) 選ばれた死因が、それ自身では死因になりそうもない軽微な病態であり、さらに重篤な病態（<u>不明確または他の軽微な病態を除く病態</u>）が記載されている場合は、その軽微な病態が記載されなかったものとして、原死因を選びなおす。もし死亡が軽微な病態の治療の副作用に起因したものであれば、その副作用を選ぶ。</p> <p>例38: (a)う(齲)蝕</p>	<p>4.1.10 修正ルール</p> <p>ルールB. 軽微な病態</p> <p>(A) 選ばれた死因が、それ自身では死因になりそうもない軽微な病態であり、さらに重篤な病態が記載されている場合は、その軽微な病態が記載されなかったものとして、原死因を選びなおす。もし死亡が軽微な病態の治療の副作用に起因したものであれば、その副作用を選ぶ。</p> <p>例38: (a)う(齲)蝕</p>	<p>例示の削除、修正、追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>II <u>Cardiac arrest Diabetes</u></p> <p>Code to cardiac arrest (I46.9) diabetes (E14.9). Dental caries, selected by the General Principle, is ignored.</p> <p><i>Example 39:</i> (no change to existing example)</p> <p><u>(B) If the death was the result of an adverse reaction to treatment of the trivial condition, select the adverse reaction.</u></p> <p><i>Example 40:</i> I (a) Intraoperative haemorrhage</p> <p>(b) Tonsillectomy</p> <p>(c) Hypertrophy of tonsils</p> <p>Code to haemorrhage during surgical operation (Y60.0). <u>Code to the adverse reaction to treatment of the hypertrophy of tonsils, selected by the General Principle.</u></p> <p><u>(C) When a trivial condition is reported as causing any other condition, the trivial condition is not discarded (i.e. Rule B is not applicable).</u></p> <p><i>Example 41:</i> I (a) Bursitis and ulcerative colitis Septicaemia</p>	<p>心停止 糖尿病</p> <p>心停止(—46.9)糖尿病(E14.9)にコードする。一般原則により、 う(齲)蝕が選ばれるが、これは無視する。</p> <p>例39： (既存の例に変更なし)</p> <p><u>(B) その死が軽微な病態の治療に対する副作用に起因したもならば、その副作用を選ぶ。</u></p> <p>例40： (a) 術中出血 (b) 扁桃摘出術 (c) 扁桃肥大</p> <p>術中出血 (Y60.0) にコードする。一般原則により選択された、扁桃肥大の治療に対する副作用にコードする。</p> <p><u>(C) 軽微な病態が他の病態の原因となっていることが記載されている場合、その軽微な病態は無視されない(つまり、ルールBは適用されない)</u></p> <p>例41： (a) 滑液包炎および潰瘍性大腸炎 敗血症</p>	<p>心停止</p> <p>心停止(46.9)にコードする。一般原則により、 う(齲)蝕が選ばれるが、これは無視する。</p> <p>例39： (既存の例に変更なし)</p> <p>例41： (a) 術中出血 (b) 扁桃摘出術 (c) 扁桃肥大</p> <p>術中出血 (Y60.1) にコードする。</p> <p>例41： (a) 滑液包炎および潰瘍性大腸炎</p>	<p>例示の修正</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の修正</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の修正</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>(b) Impetigo</u></p> <p><u>Code to ulcerative colitis (K51.9). Bursitis, selected by Rule 2 (see Example 20), is ignored.</u></p> <p><u>Code to impetigo (L01.0) The trivial condition selected by the General Principle is not discarded since it is reported as the cause of another condition.</u></p> <p><u>Example 42: I (a) Paronychia-Respiratory insufficiency</u> <u>H (b) Tetanus Upper respiratory infection</u> <u>Code to tetanus (A35). Paronychia, selected by the General Principle, is ignored.</u></p> <p><u>Code to upper respiratory infection (J06.9). The trivial condition selected by the General Principle is not discarded since it is reported as the cause of another condition.</u></p> <p><u>Example 55: I (a) Pneumocystis carinii pneumonia</u> <u>(b) HIV</u> <u>Code to B20.6. HIV, selected by the General Principle, links with Pneumocystis carinii pneumonia.</u></p> <p><u>Example 56: I (a) Respiratory failure</u></p>	<p><u>(b)膿痂疹</u></p> <p><u>潰瘍性大腸炎 (K51.9) にコードする。ルール2により滑液包炎が選ばれる (例20参照) が、これは無視する。</u></p> <p><u>膿痂疹 (L01.0) にコードする。一般原則に従って選択される。また、膿痂疹が軽微な病態であっても、それが他の病態の原因であると記載されているため無視されない。</u></p> <p>例42： (a) 爪(周)囲炎 呼吸不全 —(b)破傷風 上気道感染</p> <p><u>破傷風 (A35) にコードする。一般原則により、爪 (周) 囲炎が選ばれるが、これは無視する。</u></p> <p><u>上気道感染 (J06.9) にコードする。一般原則によりこの軽微な病態が選択される。この病態は、他の病態の原因として記載されているため、軽微であっても無視されない。</u></p> <p>例55： I (a) ニューモシスチス・カリニ肺炎 (b) HIV</p> <p><u>B20.6のHIVにコードする。一般原則により、ニューモシスチス・カリニ肺炎を伴ったHIV疾患にコードする。</u></p> <p>例56： I (a) 呼吸不全</p>	<p>潰瘍性大腸炎 (K51.9) にコードする。ルール2により滑液包炎が選ばれる (例20参照) が、これは無視する。</p> <p>膿痂疹 (L01.0) にコードする。一般原則によりこの軽微な病態が選択される。この病態は、他の病態の原因として記載されているため、軽微であっても無視されない。</p> <p>例42： (a) 爪(周)囲炎 (b) 破傷風</p> <p>破傷風 (A35) にコードする。一般原則により、爪 (周) 囲炎が選ばれるが、これは無視する。</p> <p>例55： I (a) ニューモシスチス・カリニ肺炎 (b) HIV</p> <p>例56： I (a) 呼吸不全</p>	<p>例示の追加</p> <p>例示の削除</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の修正</p> <p>例示の修正</p> <p>例示の削除</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>(b) HIV</u></p> <p><u>Code to B24. Respiratory failure is an ill-defined condition and does not link to any of the categories in B20-B23.</u></p>	<p><u>(b) HIV</u></p> <p><u>B24にコードする。呼吸不全は不明確な病態であり、B20 - B23のどの分類項目にも適用しない。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>
8	<p>4.1.11 Notes for use in underlying cause mortality coding</p> <p>B20- B24 Human immunodeficiency virus [HIV] disease</p> <p>Conditions classifiable...specify the individual conditions listed.</p> <p><u>D50-D89 Diseases of blood and blood-forming organs and Certain disorders involving the immune mechanism</u></p> <p><u>as the cause of:</u></p> <p><u>B20-B24 Human immunodeficiency virus [HIV] disease and where the certificate indicates the HIV disease is a result of a blood transfusion given as treatment for the originating condition, code B20-B24</u></p> <p>A46 Erysipelas</p> <p>...</p>	<p>4.1.11 原死因コーディングのための注</p> <p>B20 - B24 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病</p> <p>同じ分類項目の複数の細分類項目に分類される病態は、...記載された個別の病態を特定するために使用してもよい。</p> <p><u>D50 - D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害</u></p> <p><u>下記を原因とするもの:</u></p> <p><u>B20 - B24 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病および死亡診断書に、起点となる病態の治療として与えられた輸血の影響がHIV病であると記載されている場合は、B20 - B24をコードする。</u></p> <p>A46 丹毒</p> <p>...</p>		<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>B16 Acute hepatitis B</p> <p>B17 Other acute viral hepatitis</p> <p>when reported as the originating antecedent cause of:</p> <p>K72.1 (Chronic hepatic failure), code B18.-</p> <p>K74.0-K74.2, K74.4-K74.6 (Fibrosis and cirrhosis of liver), code B18.-</p> <p>B20-B24 Human immunodeficiency virus [HIV] disease</p> <p>The subcategories at B20-B23 are the only optional four character codes for countries using the four character version of ICD-10. These four character subcategories are provided for use where it is not possible or not desired to use multiple cause coding.</p> <p><u>Modes of dying, ill-defined and trivial conditions reported as complications of HIV infection should not be linked to categories in B20-B23, unless there is a specific entry in Volume 3 to that effect.</u></p> <p>Conditions classifiable to two or more subcategories..</p> <p>F03-F09 Organic, including symptomatic, mental disorders</p>	<p>B16 <u>B型急性肝炎</u></p> <p>B17 <u>他の急性ウイルス性肝炎</u></p> <p><u>下記の機転となる先行原因として記載されていた場合：</u></p> <p><u>K72.1 (慢性肝不全)、B18.-にコードする。</u></p> <p><u>K74.0 K74.2、K74.4 K74.6 (肝臓の線維化と硬変) B18.-にコードする。</u></p> <p>B20 - B24 <u>ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病</u></p> <p>B20 - B23における細分類項目は、ICD-10の4桁分類版を使用している国々のために作られた単なる任意的な4桁コードである。これらの4桁細分類項目は、多重原因のコーディングができないか、使わないほうがよい場合に、使用するよう準備されている。</p> <p><u>死亡の状態、HIV感染の合併症と記載された不明確で軽微な病態は、第3巻にその旨の特定項目がない限り、B20 - B23の分類項目に適用されることがあってはならない。</u></p> <p><u>2つ以上の細分類項目に分類可能な病態。</u></p> <p>F03 - F09 <u>症候性を含む器質性精神障害</u></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>同じ分類項目の複数の細分類項目に分類される病態</p> <p>F01 - F09 症状性を含む器質性精神障害</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の削除</p> <p>例示の追加</p> <p>和訳修正提案</p> <p>参照コードの修正及び和訳の修正提案</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>Not to be used if the underlying physical condition is known</p> <p>F10-F19 Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</p> <p><i>with mention of:</i></p> <p><u>X40-X49 Accidental poisoning by and exposure to noxious substances, code X40-X49</u></p> <p><u>X60-X69 Intentional self-poisoning by and exposure to noxious substances, code X60-X69</u></p> <p><u>X85-X90 Assault by noxious substances, code X85-X90</u></p> <p><u>Y10-Y19 Poisoning by and exposure to drugs, chemicals and noxious substances, code Y10-Y19</u></p> <p>Fourth characters .0 (Acute intoxication) and .5 (Psychotic disorder) with mention of Dependence syndrome (.2), code F10-F19 with fourth character .2</p> <p><u>Fourth character .0 (Acute intoxication), code X40-X49, X60-X69, X85-X90 or Y10-Y19</u></p> <p><u>Fourth character .5 (Psychotic disorder) with mention of Dependence syndrome (.2), code F10-F19 with fourth character .2</u></p>	<p>原因となる身体的病態がわかっているならば、使用しない。</p> <p>F10 - F19 精神作用物質使用による精神および行動の障害</p> <p><u>下記の記載を伴うもの：</u></p> <p><u>X40 - X49 有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露、X40 - X49にコードする。</u></p> <p><u>X60 - X69 有害物質による意図的な自家中毒および有害物質への曝露、X60 - X69にコードする。</u></p> <p><u>X85 - X90 有害物質による他殺、X85 - X90にコードする。</u></p> <p><u>Y10 - Y19 薬剤、化学薬品および有害物質による中毒および薬剤、化学薬品および有害物質への曝露、Y10 - Y19にコードする。</u></p> <p><u>依存症候群（.2）の記載を伴う、4桁細分類項目 .0（急性中毒）および .5（精神病性障害）の場合は、4桁細分類項目 .2 を伴うF10 - F19にコードする。</u></p> <p><u>4桁細分類項目 .0（急性中毒）、X40 X49、X60 X69、X85 X90、またはY10 - Y19 にコードする。</u></p> <p><u>4桁細分類項目 .5（精神病性障害）で依存症候群（.2）の記載を伴うもの、4桁細分類項目 .2 を伴うF10 - F19にコードする。</u></p>	<p>原因となる身体的病態がわかっているならば、使用しない。</p> <p>F10 - F19 精神作用物質使用による精神および行動の障害</p> <p>依存症候群（.2）の記載を伴う、4桁細分類項目 .0（急性中毒）および .5（精神病性障害）の場合は、4桁細分類項目 .2 を伴うF10 F19にコードする。</p>	<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の削除</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>F10.- Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</p> <p>with mention of:</p> <p>K70.- (Alcoholic liver disease), code K70.-</p> <p><u>K72 (Hepatic failure, not elsewhere classified), code K70.4</u></p> <p><u>K73 (Chronic hepatitis, not elsewhere classified), code K70.1</u></p> <p><u>K74.0 (Hepatic fibrosis), code K70.2</u></p> <p><u>K74.1 (Hepatic sclerosis), code K70.2</u></p> <p><u>K74.2 (Hepatic fibrosis with hepatic sclerosis), code K70.2</u></p> <p><u>K74.6 (Other and unspecified cirrhosis of liver), code K70.3</u></p> <p><u>K75.9 (Inflammatory liver disease, unspecified), code K70.1</u></p> <p><u>K76.0 (Fatty (change) of liver, not elsewhere classified), code K70.0</u></p> <p><u>K76.9 (Liver disease, unspecified), code K70.9</u></p>	<p>F10.- アルコール使用による精神および行動の障害</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p> <p>K70.- (アルコール性肝疾患)、K70.-にコードする。</p> <p><u>K72 (肝不全、他に分類されないもの)、K70.4にコードする</u></p> <p><u>K73 (慢性肝炎、他に分類されないもの)、K70.1にコードする</u></p> <p><u>K74.0 (肝線維症)、K70.2にコードする。</u></p> <p><u>K74.1 (肝硬化症)、K70.2にコードする。</u></p> <p><u>K74.2 (肝硬化症を伴う肝線維症)、K70.2にコードする。</u></p> <p><u>K74.6 (その他および詳細不明の肝硬変)、K70.3にコードする。</u></p> <p><u>K75.9 (炎症性肝疾患、詳細不明)、K70.1にコードする。</u></p> <p><u>K76.0 (脂肪肝<肝の脂肪化>、他に分類されないもの)、K70.0にコードする。</u></p> <p><u>K76.9 (肝疾患、詳細不明)、K70.9にコードする。</u></p>	<p>F10.- アルコール使用による精神および行動の障害</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p> <p>K70.- (アルコール性肝疾患)、K70.-にコードする。</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>F10.- Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</p> <p>With mention of:</p> <p><u>E24.4 (Alcohol-induced Cushing's syndrome), code E24.4</u></p> <p><u>G31.2 (Degeneration of the nervous system due to alcohol), code G31.2</u></p> <p><u>G62.1 (Alcoholic polyneuropathy), code G62.1</u></p> <p><u>G72.1 (Alcoholic myopathy), code G72.1</u></p> <p><u>I42.6 (Alcoholic cardiomyopathy), code I42.6</u></p> <p><u>K29.2 (Alcoholic gastritis), code K29.2</u></p> <p><u>K70.- (Alcoholic liver disease), code K70.-</u></p> <p><u>K85 (Acute pancreatitis), code K85</u></p> <p><u>K86.0 (Alcohol-induced chronic pancreatitis), code K86.0</u></p> <p><u>O35.4 (Maternal care for (suspected) damage to foetus from alcohol), code, O35.4</u></p>	<p>F10.- アルコール使用による精神および行動の障害</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p> <p><u>E24.4(アルコール性クッシング<Cushing>症候群)、E24.4にコードする。</u></p> <p><u>G31.2(アルコールによる神経系の変性)、G31.2にコードする。</u></p> <p><u>G62.1(アルコール性多発(性)ニューロパチ<シ>ー)、G62.1にコードする。</u></p> <p><u>G72.1(アルコール性ミオパチ<シ>ー)、G72.1にコードする。</u></p> <p><u>I42.6(アルコール性心筋症)、I42.6にコードする。</u></p> <p><u>K29.2(アルコール性胃炎)、K29.2にコードする。</u></p> <p><u>K70.- (アルコール性肝疾患)、K70.-にコードする。</u></p> <p><u>K85 (急性膵炎)、K85にコードする。</u></p> <p><u>K86.0(アルコール性慢性膵炎)、K86.0にコードする。</u></p> <p><u>O35.4(アルコールによる胎児傷害(の疑い)のための母体ケア)、O35.4にコードする。</u></p>	<p>F10.- アルコール使用による精神および行動の障害</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>I08 Multiple valve diseases</u></p> <p><u>Not to be used for multiple valvular diseases of specified, but non rheumatic origin. When multiple valvular diseases of non-rheumatic origin are reported on the same death certificate, the underlying cause should be selected by applying the General Principle or Rules 1,2 or 3 in the normal way.</u></p>	<p><u>108 連合弁膜症</u></p> <p><u>明示された非リウマチ性の連合弁膜症には使用してはならない。非リウマチ性の連合弁膜症が同一の死亡診断書に記載されている場合、一般原則とルール1、2、または3を適用して、原死因を選択する。</u></p>		<p>参照コード及び項目の追加 例示の追加</p>
	<p><u>I60-I69 Cerebrovascular diseases</u></p> <p><u>when reported as the originating antecedent cause of conditions in:</u></p> <p><u>F01-F03, code F01</u></p>	<p><u>160 - 169 脳血管疾患</u></p> <p><u>下記の起点となる先行原因として記載された場合：</u></p> <p><u>F01 F03、F01にコードする。</u></p>		<p>参照コード及び項目の追加 例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p>
	<p><u>I67.2 Cerebral atherosclerosis</u></p> <p><u>with mention of:</u></p> <p><u>I60-I66 (Cerebral haemorrhage, cerebral infarction or stroke, occlusion and stenosis of precerebral and cerebral arteries), code I60-I64.</u></p>	<p><u>167.2 脳動脈のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの：</u></p> <p><u>160 - 166 (脳出血、脳梗塞または脳血管発作、脳実質外動脈および脳動脈の閉塞および狭窄)、160 164にコードする。</u></p>	<p><u>167.2 脳動脈のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの：</u></p> <p><u>160 - 164 (脳出血、脳梗塞または脳血管発作、160 164にコードする。</u></p>	<p>例示の修正</p>
	<p><u>I70.- Atherosclerosis</u></p> <p><u>With mention of:</u></p>	<p><u>170.- アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの：</u></p>	<p><u>170.- アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの：</u></p>	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>I10-I13 (Hypertensive disease), code I10-I13</p> <p>I20-I25 (Ischaemic heart diseases), code I20-I25</p> <p><u>I50.- (Heart failure), code I50.-</u></p> <p>I51.4 (Myocarditis, unspecified), code I51.4</p> <p>I51.5 (Myocardial degeneration), code I51.5</p> <p>I51.6 (Cardiovascular disease, unspecified), code I51.6</p> <p>I51.8 (Other ill-defined heart diseases), code I51.8</p> <p>I51.9 (Heart disease, unspecified), code I51.9</p> <p>I60-I69 (Cerebrovascular diseases), code I60-I69</p>	<p>I10 I13 (高血圧性疾患)、I10 I13にコードする。</p> <p>I20 I25 (虚血性心疾患)、I20 I25にコードする。</p> <p><u>I50.- (心不全)、I50.-にコードする。</u></p> <p>I51.4 (心筋炎、詳細不明)、I51.4にコードする。</p> <p>I51.5 (心筋変性)、I51.5にコードする。</p> <p>I51.6 (心血管疾患、詳細不明)、I51.6にコードする。</p> <p>I51.8 (その他の不明確な心疾患)、I51.8にコードする。</p> <p>I51.9 (心疾患、詳細不明)、I51.9にコードする。</p> <p>I60 - I69 (脳血管疾患)、I60 I69にコードする。</p>	<p>I10 I13 (高血圧性疾患)、I10 I13にコードする。</p> <p>I20 I25 (虚血性心疾患)、I20 I25にコードする。</p> <p>I51.4 (心筋炎、詳細不明)、I51.4にコードする。</p> <p>I51.5 (心筋変性)、I51.5にコードする。</p> <p>I51.6 (心血管疾患、詳細不明)、I51.6にコードする。</p> <p>I51.8 (その他の不明確な心疾患)、I51.8にコードする。</p> <p>I51.9 (心疾患、詳細不明)、I51.9にコードする。</p> <p>I60 - I69 (脳血管疾患)、I60 I69にコードする。</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の削除</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>When reported as the originating antecedent cause of:</p> <p>I05-I09 (Conditions classifiable to I05-I09 but not specified as rheumatic), code I34-I38</p> <p>I34-I38 (Nonrheumatic valve disorders), code I34-I38</p> <p><u>I51.9 (Heart disease, unspecified), code I25.1</u></p> <p>I71-I78 (Other diseases of arteries, arterioles and capillaries), code I71-I78</p> <p>K55.- (Vascular disorders of intestine), code K55.-</p> <p>N26 (Unspecified contracted kidney), code I12.-</p> <p>I70.- Atherosclerosis</p> <p>With mention of:</p> <p>...</p>	<p>下記の起点となる先行原因として記載された場合：</p> <p>I05 - 109 (リウマチ性として明示されていないが、I05 - 109に分類される病態)、I34 - I38にコードする。</p> <p>I34 - 138 (非リウマチ性弁障害)、I34 - I38にコードする。</p> <p><u>I51.9 (心疾患、詳細不明)、I25.1にコードする。</u></p> <p>I71 - 178 (動脈、細動脈、および毛細血管のその他の疾患)、I71 - 178にコードする。</p> <p>K55.- (腸の血行障害)、K55.-にコードする。</p> <p>N26 (詳細不明な萎縮腎)、I12.-にコードする。</p> <p>I70.- アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p> <p>...</p>	<p>下記の起点となる先行原因として記載された場合：</p> <p>I05 - 109 (リウマチ性として明示されていないが、I05 - 109に分類される病態)、I34 - I38にコードする。</p> <p>I34 - 138 (非リウマチ性弁障害)、I34 - I38にコードする。</p> <p>I71 - 178 (動脈、細動脈、および毛細血管のその他の疾患)、I71 - 178にコードする。</p> <p>K55.- (腸の血行障害)、K55.-にコードする。</p> <p>N26 (詳細不明な萎縮腎)、I12.-にコードする。</p> <p>I70.- アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p> <p>...</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>when reported as the originating antecedent cause of:</p> <p>I05-I09 (Conditions classifiable to I05-I09 but not specified as rheumatic), code I34-I38</p> <p>I34-I38 (Nonrheumatic valve disorders), code I34-I38</p> <p>I71-I78 (Other diseases of arteries, arterioles and capillaries), code I71-I78</p> <p>K55.- (Vascular disorders of intestine), code K55.-</p> <p><u>N03 (Chronic nephritis), code I12.-</u></p> <p>N26 (Unspecified contracted kidney), code I12.-</p> <p>I70.9 Generalised and unspecified atherosclerosis</p> <p>With mention of:</p>	<p>下記の起点となる先行原因として記載された場合：</p> <p>I05 - I09 (I05 I09に分類可能であるがリウマチ性であると明確化されていない病態)、I34 - I38にコードする。</p> <p>I34 - I38 (非リウマチ性弁異常)、I34 - I38にコードする。</p> <p>I71 - I78 (動脈、細動脈、および毛細管のその他の疾患)、I71 - I78にコードする。</p> <p>K55.- (腸の血管障害)、K55.-にコードする。</p> <p><u>N03 (慢性腎炎症候群)、I12.-にコードする。</u></p> <p>N26 (詳細不明の萎縮腎)、I12.-にコードする。</p> <p>I70.9 全身性および詳細不明のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p>	<p>下記の起点となる先行原因として記載された場合：</p> <p>I05 - I09 (I05 I09に分類可能であるがリウマチ性であると明確化されていない病態)、I34 - I38にコードする。</p> <p>I34 - I38 (非リウマチ性弁異常)、I34 - I38にコードする。</p> <p>I71 - I78 (動脈、細動脈、および毛細管のその他の疾患)、I71 - I78にコードする。</p> <p>K55.- (腸の血管障害)、K55.-にコードする。</p> <p>N26 (詳細不明の萎縮腎)、I12.-にコードする。</p> <p>I70.9 全身性および詳細不明のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>R02 (Gangrene, not elsewhere classified), code I70.2</p> <p>When reported as the originating antecedent cause of:</p> <p><u>F01 (Vascular dementia), code F01.-</u></p> <p>F03 (Unspecified dementia), code F01.-</p> <p>G20 (Parkinson's disease) , code G20</p> <p>J95.- Postprocedural respiratory disorders, not elsewhere classified</p> <p>Not to be used for underlying cause mortality coding. See Operations, p 71.</p> <p><u>K72 Hepatic failure, not elsewhere classified</u></p> <p><u>with mention of:</u></p> <p><u>F10.- (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol), code K70.4</u></p>	<p>R02 (え < 壊 > 疽、他に分類されないもの)、I70.2にコードする。</p> <p>下記の起点となる先行原因として記載された場合：</p> <p><u>F01 (血管性痴呆)、F01.-にコードする。</u></p> <p>F03 (詳細不明の痴呆)、F01.-にコードする。</p> <p>G20 (パーキンソン < Parkinson > 病)、G20にコードする。</p> <p>J95.- 処置後呼吸器障害、他に分類されないもの</p> <p>原死因コーディングには使用しない。手術 (71頁) を参照。</p> <p><u>K72 肝不全、他に分類されないもの</u></p> <p>下記の記載を伴うもの：</p> <p><u>F10.- (アルコール使用による精神および行動の障害)、K70.4にコードする。</u></p>	<p>R02 (え < 壊 > 疽、他に分類されないもの)、I70.2にコードする。</p> <p>下記の起点となる先行原因として記載された場合：</p> <p>F03 (詳細不明の痴呆)、F01.-にコードする。</p> <p>G20 (パーキンソン < Parkinson > 病)、G20にコードする。</p> <p>J95.- 処置後呼吸器障害、他に分類されないもの</p> <p>原死因コーディングには使用しない。手術 (71頁) を参照。</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>K73 Chronic hepatitis, not elsewhere classified</u></p> <p><u>with mention of:</u></p> <p><u>F10.- (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol), code K70.1</u></p> <p><u>K74.0 Hepatic fibrosis</u></p> <p><u>with mention of:</u></p> <p><u>F10.- (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol), code K70.2</u></p> <p><u>K74.1 Hepatic sclerosis</u></p> <p><u>with mention of:</u></p> <p><u>F10.- (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol), code K70.2</u></p> <p><u>K74.2 Hepatic fibrosis with hepatic sclerosis</u></p> <p><u>with mention of:</u></p> <p><u>F10.- (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol), code K70.2</u></p>	<p><u>K73 慢性肝炎、他に分類されないもの</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの：</u></p> <p><u>F10.- (アルコール使用による精神および行動の障害)、K70.1にコードする。</u></p> <p><u>K74.0 肝線維症</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの：</u></p> <p><u>F10.- (アルコール使用による精神および行動の障害)、K70.2にコードする。</u></p> <p><u>K74.1 肝硬化症</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの：</u></p> <p><u>F10.- (アルコール使用による精神および行動の障害)、K70.2にコードする。</u></p> <p><u>K74.2 肝硬化症を伴う肝線維症</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの：</u></p> <p><u>F10.- (アルコール使用による精神および行動の障害)、K70.2にコードする。</u></p>		<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>K74.6 Other and unspecified cirrhosis of liver</u></p> <p><u>with mention of:</u></p> <p><u>F10.- (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol), code K70.3</u></p> <p><u>K75.9 Inflammatory liver disease, unspecified</u></p> <p><u>with mention of:</u></p> <p><u>F10.- (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol), code K70.1</u></p> <p><u>K76.0 Fatty (change) of liver, not elsewhere classified</u></p> <p><u>with mention of:</u></p> <p><u>F10.- (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol), code K70.0</u></p> <p><u>K76.9 Liver disease, unspecified</u></p> <p><u>with mention of:</u></p>	<p><u>K74.6 その他および詳細不明の肝硬変</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの:</u></p> <p><u>F10.- (アルコール使用による精神および行動の障害)、K70.3にコードする。</u></p> <p><u>K75.9 炎症性肝疾患、詳細不明</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの:</u></p> <p><u>F10.- (アルコール使用による精神および行動の障害)、K70.1にコードする。</u></p> <p><u>K76.0 脂肪肝<肝の脂肪化>、他に分類されないもの</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの:</u></p> <p><u>F10.- (アルコール使用による精神および行動の障害)、K70.0にコードする。</u></p> <p><u>K76.9 肝疾患、詳細不明</u></p> <p><u>下記の記載を伴うもの:</u></p>		<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>F10.- (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol), code K70.9</u></p> <p><u>P70.3 – P72.0 Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn</u></p> <p><u>Not to be used for underlying cause mortality coding. If no other perinatal cause is reported, code to Condition originating in the perinatal period, unspecified (P96.9).</u></p> <p><u>P72.2 – P74 Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn</u></p> <p><u>Not to be used for underlying cause mortality coding. If no other perinatal cause is reported, code to Condition originating in the perinatal period, unspecified (P96.9).</u></p> <p>R69.- Unknown and unspecified causes of morbidity</p> <p>S00-T98 Injury, poisoning and certain other consequences of external causes</p> <p>Not to be used for underlying cause mortality coding except as an additional code to the relevant category in V01-Y89.</p>	<p><u>F10.- (アルコール使用による精神および行動の障害)、K70.9にコードする。</u></p> <p><u>P70.3 P72.0 胎児および新生児に特異的な一過性の内分泌障害および代謝障害</u></p> <p><u>原死因コーディングには使用しない。他の周産期の原因が記載されていない場合は、周産期を起点とする病態、詳細不明 (P96.9) にコードする。</u></p> <p><u>P72.2 P74 胎児および新生児に特異的な一過性の内分泌障害および代謝障害</u></p> <p><u>原死因コーディングには使用しない。他の周産期の原因が記載されていない場合は、周産期を起点とする病態、詳細不明 (P96.9) にコードする。</u></p> <p>R69.- 原因不明および詳細不明の疾病</p> <p>S00 - T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響</p> <p>V01 - Y89における関連する項目への追加コードとして以外は、原死因コーディングには使用しない。</p>	<p>R69.- 原因不明および詳細不明の疾病</p> <p>S00 - T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響</p> <p>V01 - Y89における関連する項目への追加コードとして以外は、原死因コーディングには使用しない。</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>参照コードの修正</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>When a disease of bone density is reported on the same line or as the original antecedent cause of a fracture, the fracture should be considered pathological, code M80.-.</p> <p>S02.- ...</p> <p>T36-T50 Poisoning by drugs, medicaments and biological substances</p> <p>—(accidental poisoning and poisoning of undetermined intent by alcohol or dependence-producing drugs)</p> <p>with mention of:</p> <p>F10-F19 with fourth character .2 (alcohol dependence or drug dependence), code F10-F19 with fourth character .2</p> <p>X40-X49 Accidental poisoning by and exposure to noxious substances</p> <p>Y10-Y15 Poisoning by and exposure to noxious substances, undetermined intent</p> <p>(poisoning by alcohol or dependence-producing drugs)</p>	<p><u>骨密度による疾病が同列に記載されているか、または骨折の起点となる先行原因として記載されている場合、骨折は病的と考えるべきであり、M80.-にコードする。</u></p> <p>S02.- ...</p> <p>T36-T50 薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒</p> <p>(事故による中毒およびアルコールまたは依存性薬物による意図不明な中毒)</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p> <p>4桁細分類項目.2 (アルコール依存または薬物依存)を伴うF10-F19、4桁細分類項目.2を伴うF10-F19にコードする。</p> <p>X40-X49 有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露</p> <p>Y10-Y15 有害物質による中毒および有害物質への曝露、意図不明</p> <p>(アルコールまたは依存性薬物による中毒)</p>	<p>T36 - T50 薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒</p> <p>(事故による中毒およびアルコールまたは依存性薬物による意図不明な中毒)</p> <p>下記の記載を伴うもの：</p> <p>4桁細分類項目.2 (アルコール依存または薬物依存)を伴うF10 - F19、4桁細分類項目.2を伴うF10 - F19にコードする。</p> <p>X40 - X49 有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露</p> <p>Y10 - Y15 有害物質による中毒および有害物質への曝露、意図不明</p> <p>(アルコールまたは依存性薬物による中毒)</p>	<p>例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の削除</p> <p>例示の削除</p> <p>例示の削除</p> <p>例示の削除</p> <p>参照コード及び項目の削除</p> <p>参照コード及び項目の削除</p> <p>例示の削除</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類																																																						
	<p>with mention of:</p> <p>F10-F19 with fourth character .2 (alcohol dependence or drug dependence), code F10-F19 with fourth character .2</p>	<p>下記の記載を伴うもの：</p> <p>4桁細分類項目.2（アルコール依存または薬物依存）を伴うF10-F19、4桁細分類項目.2を伴うF10-F19にコードする。</p>	<p>下記の記載を伴うもの：</p> <p>4桁細分類項目.2（アルコール依存または薬物依存）を伴うF10-F19、4桁細分類項目.2を伴うF10-F19にコードする。</p>	<p>例示の削除</p> <p>例示の削除</p>																																																						
9	<p><i>Table 1. Summary of linkages by code number</i></p> <table border="1" data-bbox="91 767 667 1369"> <thead> <tr> <th>Selected cause</th> <th>As cause of:</th> <th>Resulting linked code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D50-D59</td> <td>B20-B24</td> <td>B20-B24</td> </tr> <tr> <td>E86</td> <td>A00-A09</td> <td>A00-A09</td> </tr> <tr> <td>F10-F19</td> <td>X40-X49</td> <td>X40-X49</td> </tr> <tr> <td>F10-F19</td> <td>X60-X69</td> <td>X60-X69</td> </tr> <tr> <td>F10-F19</td> <td>X85-X90</td> <td>X85-X90</td> </tr> <tr> <td>F10-F19</td> <td>Y10-Y19</td> <td>Y10-Y19</td> </tr> </tbody> </table>	Selected cause	As cause of:	Resulting linked code	D50-D59	B20-B24	B20-B24	E86	A00-A09	A00-A09	F10-F19	X40-X49	X40-X49	F10-F19	X60-X69	X60-X69	F10-F19	X85-X90	X85-X90	F10-F19	Y10-Y19	Y10-Y19	<p>表1 . コード番号による連鎖表</p> <table border="1" data-bbox="680 671 1319 1369"> <thead> <tr> <th>第1欄</th> <th>第3欄</th> <th>第4欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>選ばれた原因</td> <td>引き起こされた病態</td> <td>連鎖コード</td> </tr> <tr> <td>D50 - D59</td> <td>B20 - B24</td> <td>B20 - B24</td> </tr> <tr> <td>E86</td> <td>A00 - A09</td> <td>A00 - A09</td> </tr> <tr> <td>F10 - F19</td> <td>X40 - X49</td> <td>X40 - X49</td> </tr> <tr> <td>F10 - F19</td> <td>X60 - X69</td> <td>X60 - X69</td> </tr> <tr> <td>F10 - F19</td> <td>X85 - X90</td> <td>X85 - X90</td> </tr> <tr> <td>F10 - F19</td> <td>Y10 - Y19</td> <td>Y10 - Y19</td> </tr> </tbody> </table>	第1欄	第3欄	第4欄	選ばれた原因	引き起こされた病態	連鎖コード	D50 - D59	B20 - B24	B20 - B24	E86	A00 - A09	A00 - A09	F10 - F19	X40 - X49	X40 - X49	F10 - F19	X60 - X69	X60 - X69	F10 - F19	X85 - X90	X85 - X90	F10 - F19	Y10 - Y19	Y10 - Y19	<p>表1 . コード番号による連鎖表</p> <table border="1" data-bbox="1332 671 1906 991"> <thead> <tr> <th>第1欄</th> <th>第3欄</th> <th>第4欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>選ばれた原因</td> <td>引き起こされた病態</td> <td>連鎖コード</td> </tr> <tr> <td>E86</td> <td>A00 - A09</td> <td>A00 - A09</td> </tr> </tbody> </table>	第1欄	第3欄	第4欄	選ばれた原因	引き起こされた病態	連鎖コード	E86	A00 - A09	A00 - A09	<p>参照コードの追加</p> <p>参照コードの追加</p> <p>参照コードの追加</p> <p>参照コードの追加</p> <p>参照コードの追加</p>
Selected cause	As cause of:	Resulting linked code																																																								
D50-D59	B20-B24	B20-B24																																																								
E86	A00-A09	A00-A09																																																								
F10-F19	X40-X49	X40-X49																																																								
F10-F19	X60-X69	X60-X69																																																								
F10-F19	X85-X90	X85-X90																																																								
F10-F19	Y10-Y19	Y10-Y19																																																								
第1欄	第3欄	第4欄																																																								
選ばれた原因	引き起こされた病態	連鎖コード																																																								
D50 - D59	B20 - B24	B20 - B24																																																								
E86	A00 - A09	A00 - A09																																																								
F10 - F19	X40 - X49	X40 - X49																																																								
F10 - F19	X60 - X69	X60 - X69																																																								
F10 - F19	X85 - X90	X85 - X90																																																								
F10 - F19	Y10 - Y19	Y10 - Y19																																																								
第1欄	第3欄	第4欄																																																								
選ばれた原因	引き起こされた病態	連鎖コード																																																								
E86	A00 - A09	A00 - A09																																																								

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	T36 T50 F10 F19 (F1x.2) F10 F19 (F1x.2)	T36 T50 F10 F19 (F1x.2) F10 F19 (F1x.2)	T36 - T50 F10 - F19 (F1x.2) F10 - F19 (F1x.2)	参照コードの削除
	X40 X49 } F10 F19 (F1x.2) F10 F19 (F1x.2)	X40 X49 } 0 F10 F19 (F1x.2) F10 F19 (F1x.2)	X40 - X49 } 0 F10 - F19 (F1x.2) F10 - F19 (F1x.2)	参照コードの削除
	Y10 Y15 } F10 F19 (F1x.2) F10 F19 (F1x.2)	Y10 Y15 } F10 F19 (F1x.2) F10 F19 (F1x.2)	Y10 - Y15 } F10 - F19 (F1x.2) F10 - F19 (F1x.2)	参照コードの削除
	F10 E24.4 E24.4	F10 E24.4 E24.4	F10 E24.4 E24.4	参照コードの削除
	G31.2 G31.2	G31.2 G31.2	G31.2 G31.2	参照コードの削除
	G62.1 G62.1	G62.1 G62.1	G62.1 G62.1	参照コードの削除
	G72.1 G72.1	G72.1 G72.1	G72.1 G72.1	参照コードの削除
	I42 I42.6	I42 I42.6	I42 I42.6	参照コードの削除
	K29.2 K29.2	K29.2 K29.2	K29.2 K29.2	参照コードの削除
	K70. K70.	K70. K70.	K70. - K70. -	参照コードの削除
	K85 K85	K85 K85	K85 K85	参照コードの削除
	K86.0 K86.0	K86.0 K86.0	K86.0 K86.0	参照コードの削除
	O35.4 O35.4	O35.4 O35.4	O35.4 O35.4	参照コードの削除
	<i>Table 2. Summary of codes not to be used in underlying cause mortality coding</i>	表 2 . 死亡コーディングには使用されないコードの表	表 2 . 死亡コーディングには使用されないコードの表	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	Codes not to be used for underlying cause Mortality coding (code to item in parentheses; If no code is indicated, code to R99)	原死因コーディングには使用されないコード（括弧内の項目にコードする；もし、コードが示されていないならば、R99にコードする）	原死因コーディングには使用されないコード（括弧内の項目にコードする；もし、コードが示されていないならば、R99にコードする）	
	<u>F10.0 (code to X45, X65, X85, or Y15)</u>	<u>F10.0 (X45、 X65、 X85、 またはY15にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>F11.0 (code to X42, X62, X85, or Y12)</u>	<u>F11.0 (X42、 X62、 X85、 またはY12にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>F12.0 (code to X42, X62, X85, or Y12)</u>	<u>F12.0 (X42、 X62、 X85、 またはY12にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>F13.0 (code to X41, X61, X85, or Y11)</u>	<u>F13.0 (X41、 X61、 X85、 またはY11にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>F14.0 (code to X42, X62, X85, or Y12)</u>	<u>F14.0 (X42、 X62、 X85、 またはY12にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>F15.0 (code to X41, X61, X85, or Y11)</u>	<u>F15.0 (X41、 X61、 X85、 またはY11にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>F16.0 (code to X42, X62, X85, or Y12)</u>	<u>F16.0 (X42、 X62、 X85、 またはY12にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>F17.0 (code to X49, X69, X89, or Y19)</u>	<u>F17.0 (X49、 X69、 X89、 またはY19にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>F18.0 (code to X46, X66, X89, or Y16)</u>	<u>F18.0 (X46、 X66、 X89、 またはY16にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>F19.0 (code to X40-X49, X60-X69, X85-X90, or Y10-Y19)</u>	<u>F19.0 (X40 - X49、 X60 - X69、 X85 - X90、 またはY10 - Y19にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>P70.3 - P72.0 (code to P96.9)</u>	<u>P70.3 - P72.0 (P96.9にコードする)</u>		参照コードの追加
	<u>P72.2 - P74 (code to P96.9)</u>	<u>P72.2 - P74 (P96.9にコードする)</u>		参照コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
10	<p>4.2.2 Interpretation of “highly improbable”</p> <p>The expression “highly improbable” has been used since the Sixth Revision of the ICD to indicate an unacceptable causal relationship. As a guide to the acceptability of sequences in the application of the General Principle and the selection rules, the following relationships should be regarded as “highly improbable”:</p> <p><u>(a) any infectious disease may be accepted as “due to” disorders of the immune mechanism such as human immunodeficiency virus [HIV] disease or AIDS;</u></p> <p><u>(b) an infectious or parasitic disease (A00-B99) reported as “due to” any disease outside this chapter, except that:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) · septicaemia (A40-A41) · erysipelas (A46) <p>accepted as “due to” any</p>	<p>4.2.2 「因果関係がほとんどない」の解釈</p> <p>「因果関係がほとんどない」という表現は、因果関係として受け入れられないことを示すために、第6回修正ICDから用いられてきたものである。一般原則および選択ルールの適用にあたって、因果関係として受け入れることのできるもののガイドとして、下記の関係は「因果関係がほとんどない」とみなされるべきである。：</p> <p><u>(a) あらゆる感染症は、ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病やAIDSなどの免疫機能の異常「による」と考えられる。</u></p> <p><u>(b) 感染症または寄生虫症（A00 - B99）が、この章以外に記載されている疾病「による」と記載された場合。ただし、下記のものは除く：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 感染性と推定される下痢および胃腸炎（A09） ・ 敗血症（A40 - A41） ・ 丹毒（A46） <p>その他の疾病「による」と考えてよい。</p>	<p>4.2.2 「因果関係がほとんどない」の解釈</p> <p>「因果関係がほとんどない」という表現は、因果関係として受け入れられないことを示すために、第6回修正ICDから用いられてきたものである。一般原則および選択ルールの適用にあたって、因果関係として受け入れることのできるもののガイドとして、下記の関係は「因果関係がほとんどない」とみなされるべきである。：</p> <p><u>(a) 感染症または寄生虫症（A00 - B99）が、この章以外に記載されている疾病「による」と記載された場合。ただし、下記のものは除く：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 感染性と推定される下痢および胃腸炎（A09） ・ 敗血症（A40 - A41） ・ 丹毒（A46） <p>その他の疾病「による」と考えてよい。</p>	<p>新規(a)を追加</p> <p>以下旧の(a)を(b)に繰り下げ準じ番号変更</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>・ gas gangrene (A48.0)</p> <p>・ Vincent's angina (A69.1)</p> <p>・ mycoses (B35-B49)</p> <p>・ any infectious disease may be accepted as “due to” immunosuppression by chemicals (chemotherapy) and radiation.</p> <p>・ <u>any infectious disease classified to A00-B19 or B25-B64 reported as “due to” a malignant neoplasm will also be an acceptable sequence.</u></p> <p>・ varicella and zoster infections (B01-B02) may be accepted as “due to” diabetes, tuberculosis and lymphoproliferative neoplasms;</p> <p>(c) a malignant neoplasm reported as “due to” any other disease, except human immunodeficiency virus (HIV) disease;</p> <p>(d) haemophilia (D66, D67, D68.0-D68.2) reported as “due to” any other disease;</p>	<p>・ ガスえ<壊>疽 (A48.0)</p> <p>・ ワンサン (Vincent) 口峽炎<アングナ> (A69.1)</p> <p>・ 真菌症 (B35 - B49)</p> <p>・ あらゆる感染症は、化学物質 (化学療法) および放射線による免疫抑制「による」と考えてよい。</p> <p>・ <u>悪性新生物「による」と記載されているA00 - B19またはB25 - B64に分類される感染症はすべてこのように考えてよい。</u></p> <p>・ 水痘、帯状疱疹感染症 (B01 - B02) は、糖尿病、結核およびリンパ増殖性新生物「による」と考えてよい。 ;</p> <p><u>(c) 悪性新生物が、その他の疾患「による」と記載された場合。ただし、ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病は除く ;</u></p> <p><u>(d) 血友病 (D66, D67, D68.0 - D68.2) が、その他の疾患「による」と記載された場合 ;</u></p>	<p>・ ガスえ<壊>疽 (A48.0)</p> <p>・ ワンサン (Vincent) 口峽炎<アングナ> (A69.1)</p> <p>・ 真菌症 (B35 - B49)</p> <p>・ あらゆる感染症は、化学物質 (化学療法) および放射線による免疫抑制「による」と考えてよい。</p> <p>・ 水痘、帯状疱疹感染症 (B01 - B02) は、糖尿病、結核およびリンパ増殖性新生物「による」と考えてよい。 ;</p> <p><u>(b) 悪性新生物が、その他の疾患「による」と記載された場合。ただし、ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病は除く ;</u></p> <p><u>(c) 血友病 (D66, D67, D68.0 - D68.2) が、その他の疾患「による」と記載された場合 ;</u></p>	<p>説明文の追加</p> <p>(b)を(c)に繰り下げ</p> <p>(c)を(d)に繰り下げ</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>(e) diabetes (E10-E14) reported as “due to” any other disease except:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ haemochromatosis (E83.1), ・ diseases of pancreas (K85-K86), ・ pancreatic neoplasms (C25.-, D13.6, D13.7, D37.7), ・ malnutrition (E40-E46); 	<p>(e) 糖尿病 (E10 - E14) が、他の疾病「による」と記載された場合。ただし、下記のものは除く：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ヘモクロマトーシス < 血色素症 > (E83.1) ・ 膵疾患 (K85 - K86) ・ 膵の新生物 (C25. -、D13.6、D13.7、D37.7) ・ 栄養失調 (症) (E40 - E46) ; 	<p>(d) 糖尿病 (E10 - E14) が、他の疾病「による」と記載された場合。ただし、下記のものは除く：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ヘモクロマトーシス < 血色素症 > (E83.1) ・ 膵疾患 (K85 - K86) ・ 膵の新生物 (C25. -、D13.6、D13.7、D37.7) ・ 栄養失調 (症) (E40 - E46) ; 	<p>(d)を(e)に繰り下げ</p>
	<p>(f) rheumatic fever (I00-I02) or rheumatic heart disease (I05-I09) reported as “due to” any disease other than scarlet fever (A38), streptococcal septicaemia (A40.0-), streptococcal sore throat (J02.0) and acute tonsillitis (J03.-);</p>	<p>(f) リウマチ熱 (I00 - I02) またリウマチ性心疾患 (I05 - I09) が猩紅熱 (A38)、レンサ球菌性敗血症 (A40. -)、レンサ球菌性咽頭痛 (J02.0) および急性扁桃炎 (J03. -) 以外の疾病「による」と記載された場合；</p>	<p>(e) リウマチ熱 (I00 - I02) またリウマチ性心疾患 (I05 - I09) が猩紅熱 (A38)、レンサ球菌性敗血症 (A40. -)、レンサ球菌性咽頭痛 (J02.0) および急性扁桃炎 (J03. -) 以外の疾病「による」と記載された場合；</p>	<p>(e)を(f)に繰り下げ</p>
	<p>(g) any hypertensive condition reported as “due to” any neoplasm except:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ endocrine neoplasms, ・ renal neoplasms, ・ carcinoid tumours; 	<p>(g) 高血圧性病態が、下記以外の新生物「による」と記載された場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 内分泌系の新生物 ・ 腎の新生物 ・ カルチノイド腫瘍； 	<p>(f) 高血圧性病態が、下記以外の新生物「による」と記載された場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 内分泌系の新生物 ・ 腎の新生物 ・ カルチノイド腫瘍； 	<p>(f)を(g)に繰り下げ</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>(h) chronic ischaemic heart disease (I20, I25) reported as “due to” any neoplasm;</p> <p>(i)</p> <p><u>(1) cerebrovascular diseases (I60-I69) reported as “due to” a disease of the digestive system (K00-K92),</u></p> <p><u>(2) cerebral infarction due to thrombosis of precerebral arteries (I63.0)</u></p> <p><u>cerebral infarction due to unspecified occlusion of precerebral arteries (I63.2)</u></p> <p><u>cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries (I63.3)</u></p> <p><u>cerebral infarction due to unspecified occlusion of cerebral arteries (I63.5)</u></p> <p><u>cerebral infarction due to cerebral venous thrombosis, nonpyogenic (I63.6)</u></p>	<p><u>(h) 慢性虚血性心疾患 (I20、I25) が、新生物「による」と記載された場合；</u></p> <p><u>(i) 脳血管疾患 (I60 - I69) が、消化器系の疾患 (K00 - K92) また心内膜炎 (I05 - I08、I09.1、I33 - I38) 「による」と記載された場合。ただし、I65 - I66の脳塞栓症および頭蓋内出血 (I60 - I62) については除く；</u></p> <p><u>(1) 脳血管疾患 (I60 - I69) が、消化器系の疾患 (K00 - K92) 「による」と記載された場合</u></p> <p><u>(2) 脳実質外動脈の血栓症による脳梗塞 (I63.0)</u></p> <p><u>脳実質外動脈の詳細不明の閉塞による脳梗塞 (I63.2)</u></p> <p><u>脳動脈の血栓症による脳梗塞 (I63.3)</u></p> <p><u>脳動脈の詳細不明の閉塞による脳梗塞 (I63.5)</u></p> <p><u>脳静脈血栓症による脳梗塞、非化膿性 (I63.6)</u></p>	<p><u>(g) 慢性虚血性心疾患 (I20、I25) が、新生物「による」と記載された場合；</u></p> <p><u>(h) 脳血管疾患 (I60 - I69) が、消化器系の疾患 (K00 - K92) また心内膜炎 (I05 - I08、I09.1、I33 - I38) 「による」と記載された場合。ただし、I65 - I66の脳塞栓症および頭蓋内出血 (I60 - I62) については除く；</u></p>	<p>(g)を(h)に繰り下げ</p> <p>(h)を(i)に繰り下げ 内容を削除</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>other cerebral infarction (I63.8)</u></p> <p><u>cerebral infarction, unspecified (I63.9)</u></p> <p><u>stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64)</u></p> <p><u>other cerebrovascular diseases (I67)</u></p> <p><u>sequelae of stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I69.4)</u></p> <p><u>sequelae of other and unspecified cerebrovascular diseases (I69.8)</u></p> <p><u>reported as “due to” endocarditis (I05-I08, I09.1, I33-I38),</u></p> <p><u>(3) occlusion and stenosis of precerebral arteries, not resulting in cerebral infarction (I65), except embolism</u></p> <p><u>occlusion and stenosis of cerebral arteries, not resulting in cerebral infarction (I66), except embolism</u></p>	<p><u>その他の脳梗塞 (I63.8)</u></p> <p><u>脳梗塞、詳細不明 (I63.9)</u></p> <p><u>脳血管発作、脳出血または脳梗塞と明示されないもの (I64)</u></p> <p><u>その他の脳血管疾患 (I67)</u></p> <p><u>脳血管発作の続発・後遺症、出血または梗塞と明示されないもの (I69.4)</u></p> <p><u>その他および詳細不明の脳血管疾患の続発・後遺症 (I69.8)</u></p> <p><u>心内膜炎「による」と記載された場合 (I05 - I08、I09.1、I33 - I38)</u></p> <p><u>(3) 脳実質外動脈の閉塞および狭窄、脳梗塞に至らなかったもの (I65)。ただし、塞栓症を除く。</u></p> <p><u>脳動脈の閉塞ならびに狭窄、脳梗塞に至らなかったもの (I65)。ただし、塞栓症を除く。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>sequelae of cerebral infarction (I69.3), except embolism</u></p> <p><u>reported as “due to” endocarditis (I05-I08, I09.1, I33-I38);</u></p> <p>(j) any condition described as arteriosclerotic [atherosclerotic] reported as “due to” any neoplasm;</p> <p>(k) influenza (J10-J11) reported as “due to” any other disease;</p> <p>(l) a congenital anomaly (Q00-Q99) reported as “due to” any other disease of the individual, except for:</p> <p><u>· a congenital anomaly reported as “due to” a chromosome abnormality or a congenital malformation syndrome,</u></p> <p><u>· pulmonary hypoplasia reported as “due to” a congenital anomaly;</u></p>	<p><u>脳梗塞の続発・後遺症 (I69.3)。</u><u>ただし、塞栓症を除く。</u></p> <p><u>心内膜炎「による」と記載された場合 (I05 - I08、I09.1、I33 - I38)</u></p> <p>(j) 動脈硬化症 [アテローム<じゅく<粥>>状硬化症]と記載された病態が、新生物「による」と記載された場合；</p> <p>(k) インフルエンザ (J10 - J11) が、その他の疾病「による」と記載された場合；</p> <p>(l) 先天奇形、変形および染色体異常 (Q00 - Q99) が、未熟を含むその他の疾病「による」と記載された場合。<u>ただし、下記のものは除く；</u></p> <p><u>・ 先天奇形が、染色体異常または先天性奇形症候群「による」と記載された場合</u></p> <p><u>・ 肺低形成が、先天奇形「による」と記載された場合；</u></p>	<p>(i) 動脈硬化症 [アテローム<じゅく<粥>>状硬化症]と記載された病態が、新生物「による」と記載された場合；</p> <p>(j) インフルエンザ (J10 - J11) が、その他の疾病「による」と記載された場合；</p> <p>(k) 先天奇形、変形および染色体異常 (Q00 - Q100) が、未熟を含むその他の疾病「による」と記載された場合。<u>ただし、下記のものは除く；</u></p>	<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>(i)を(j)に繰り下げ</p> <p>(j)を(k)に繰り下げ</p> <p>(k)を(l)に繰り下げ 例示内容の修正</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>(m) a condition of stated date of onset “X” reported as “due to” a condition of stated date of onset “Y”, when “X” predates “Y” (but see also Example 5 in section 4.1.6);</p> <p>(n) accidents (V01-X59) reported as due to any other cause outside this chapter <u>except</u>:</p> <p>(1) <u>any accident (V01-X59) reported as due to epilepsy (G40-G41),</u></p> <p>(2) <u>a fall (W00-W19) due to a disorder of bone density (M80-M85),</u></p> <p>(3) <u>a fall (W00-W19) due to a (pathological) fracture caused by a disorder of bone density,</u></p> <p>(4) <u>asphyxia reported as due to aspiration of mucus, blood (W80) or vomitus (W78) as a result of disease conditions,</u></p> <p>(5) <u>aspiration of food (liquid or solid) of any kind (W79) reported as due to a disease which affects the ability to swallow;</u></p>	<p><u>(m) 発病日が「X」であると記載された疾病が、「X」が「Y」よりも前の日であるときに、発病日が「Y」である疾病「による」と記載された場合（ただし、4.1.6の例5を参照のこと）；</u></p> <p><u>(n) 事故（V01 - X59）であると記載されたものが、この章以外のその他の原因「による」と記載されていた場合。ただし、<u>下記のもの</u>は除く；</u></p> <p><u>(1) 事故（V01 - X59）が、てんかん（G40 - G41）によると記載された場合</u></p> <p><u>(2) 転倒・転落（W00 - W19）が、骨の密度および構造の障害（M80 - M85）による場合</u></p> <p><u>(3) 転倒・転落（W00 - W19）が、骨の密度および構造の障害（M80 - M85）による（病的）骨折による場合</u></p> <p><u>(4) 窒息が、病態の結果として粘液、血液（W80）または吐物（W78）の誤嚥によると記載された場合</u></p> <p><u>(5) 何らかの食物（液体あるいは固形物）の誤嚥（W79）が、嚥下機能に影響をおよぼす疾病によると記載された場合；</u></p>	<p>(1) 発病日が「X」であると記載された疾病が、「X」が「Y」よりも前の日であるときに、発病日が「Y」である疾病「による」と記載された場合（ただし、4.1.6の例5を参照のこと）；</p> <p>(m) 事故（V01 - X59）であると記載されたものが、この章以外のその他の原因「による」と記載されていた場合。ただし、てんかん（G40-G41）は除く；</p>	<p>(l)を(m)に繰り下げ</p> <p>(m)を(n)に繰り下げ 例示内容の修正</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p> <p>参照コード及び項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>(o) suicide (X60-X84) reported as “due to” any other cause.</p> <p>The above list does not cover all “highly improbable” sequences, but in other cases, the General Principle should be followed unless otherwise indicated.</p>	<p>(o) 自殺 (X60 - X84) が、その他の原因「による」と記載された場合。</p> <p>上記のリストは「因果関係がほとんどない」一連のすべてを示すものではないが、他に指示されている場合でなければ、その他の症例では一般原則を適用すべきである。</p>	<p>上記のリストは「因果関係がほとんどない」ケースのすべてを示すものではないが、他に指示されている場合でなければ、その他のケースでは一般原則を適用すべきである。</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>日本語表記の修正提案</p>
11	<p>4.2.6 Operations</p> <p>If an operation appears on the certificate as the cause of death without mention of the condition for which it was performed or of the findings at operation, and the alphabetical index does not provide a specific code for the operation, code to the residual category for the organ or site indicated by the name of the operation (e.g. code “nephrectomy” to N28.9). If the operation does not indicate an organ or site, e.g. “laparotomy”, code to “Other ill-defined and unspecified causes or mortality” (R99), unless there is a mention of a therapeutic misadventure classifiable to Y60-Y84 or a postoperative complication. <u>If there is mention of a misadventure at the time of the procedure, code to Y60-Y69. If there is a mention of an abnormal reaction of the patient, without mention of misadventure at the time of the procedure, code to Y83-Y84.</u></p>	<p>4.2.6 手術</p> <p>ある手術が、手術が行われた病態の記載または手術時の所見の記載がなく、死因として死亡診断書に記載され、索引表がその手術に対して特定のコードを指定していないならば、手術名により示される臓器または部位についての残余の分類項目にコードする（たとえば、「腎切除術」はN28.9にコードする）。もし、手術名が臓器または部位を示していないならば（たとえば「開腹術」）、またY60 - Y84に分類される医療過誤の記載または術後合併症の記載もなければ、「その他の診断名不明確および原因不明の死亡」（R99）にコードする。もし、<u>手技中の医療過誤と記載があれば、Y60 - Y69にコードする。もし、手技中の医療過誤という記載がなく、患者の異常な反応と記載があれば、Y83 - Y84にコードする。</u></p>	<p>4.2.6 手術</p> <p>ある手術が、手術が行われた病態の記載または手術時の所見の記載がなく、死因として死亡診断書に記載され、索引表がその手術に対して特定のコードを指定していないならば、手術名により示される臓器または部位についての残余の分類項目にコードする（たとえば、「腎切除術」はN28.9にコードする）。もし、手術名が臓器または部位を示していないならば（たとえば「開腹術」）、またY60 - Y84に分類される医療過誤の記載または術後合併症の記載もなければ、「その他の診断名不明確および原因不明の死亡」（R99）にコードする。</p>	<p>例示内容の修正</p>
12	<p>4.2.9 Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities</p> <p>If the interval between onset...on the medical certificate.</p>	<p>4.2.9 先天奇形、変形および染色体異常</p> <p>もし、発病と死亡との期間および.....あらゆる疾病は先天性のものであると考えてよい。</p>	<p>4.2.9 先天奇形、変形および染色体異常</p> <p>もし、発病と死亡との期間および.....あらゆる疾病は先天性のものであると考えてよい。</p>	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>On neonatal or infant death certificates, where lung or pulmonary hypoplasia is given with any mention of immaturity, prematurity, short gestation or low birth weight, code to pulmonary immaturity (P28.0) and not to Q33.6.</u></p>	<p><u>新生児または乳児の死亡診断書に、未熟、早熟、短い妊娠期間あるいは低出生体重などの記載を伴う肺低形成とあれば、未熟肺（P28.0）とコードし、Q33.6とはコードしない。</u></p>		<p>例示の追加</p>
13	<p>4.2.11 Poisoning by drugs, medicaments and biological substances</p> <p>When combinations of medicinal agents classified differently are involved, proceed as follows: <u>if one component of the combination is specified as the cause of death, code to that component; if no component is specified as the cause of death, code to the category provided for the combination, e.g. mixed antiepileptics (T42.5).</u> Otherwise, if the components are classified to the same three character category, code to the appropriate subcategory for “Other”; if not, code to T50.9.</p> <p><u>A) Selection of the underlying cause of death</u></p> <p><u>i) If one component of the combination is specified as the cause of death, code to that component.</u></p> <p><u>Ex.: I(a) Poisoning by amphetamine</u></p> <p><u>II Toxic levels of heroin and flunitrazepam</u></p>	<p>4.2.11 薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒</p> <p>異なる分類項目に分類される医薬品が組み合わされている場合は、下記のように処理する：もし、その組み合わせの一つの成分が、死因として明示されたならば、その成分にコードする；もし成分が死因として明示されていないならば、その組み合わせに対する分類項目にコードする、たとえば、抗てんかん薬の合剤（T42.5）。また、もし、成分が同一の3桁分類項目に分類される場合は、「その他」に対する適切な4桁細分類項目にコードする；もしそうでなければ、T50.9にコードする。</p> <p><u>A) 原死因の選択</u></p> <p><u>i) もし、その配合剤の一つの成分が、死因として明示されたならば、その成分にコードする。</u></p> <p>例： <u>(a) アンフェタミンによる中毒</u></p> <p><u>ヘロインならびにフルニトラゼパムの中毒</u></p>	<p>4.2.11 薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒</p> <p>異なる分類項目に分類される医薬品が組み合わされている場合は、下記のように処理する：もし、その組み合わせの一つの成分が、死因として明示されたならば、その成分にコードする；もし成分が死因として明示されていないならば、その組み合わせに対する分類項目にコードする、たとえば、抗てんかん薬の合剤（T42.5）。また、もし、成分が同一の3桁分類項目に分類される場合は、「その他」に対する適切な4桁細分類項目にコードする；もしそうでなければ、T50.9にコードする。</p>	<p>例示内容の修正</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>Code to accidental poisoning by amphetamine (X41). By placing contributing causes of death in Part II, the certifier has identified amphetamine as the most important substance in bringing about the death.</u></p> <p>Ex.: I(a) Poisoning by alcohol</p> <p><u>II Toxic levels of heroin and flunitrazepam</u></p> <p><u>Code to accidental poisoning by alcohol (X45). By placing alcohol poisoning alone in Part I and reporting the other substances as contributing causes of death in Part II, the certifier has identified alcohol as the most important substance in bringing about the death.</u></p> <p>Ex.: I(a) Poisoning by heroin</p> <p><u>II Toxic levels of alcohol and flunitrazepam</u></p>	<p><u>レベルアンフェタミンによる不慮の中毒 (X41) にコードする。欄でアンフェタミン中毒のみと位置付け、欄で記載することによって、死亡証明者はアンフェタミンが死を引き起こした最重要物質と判断する。</u></p> <p>例： (a) アルコールによる中毒</p> <p><u>ヘロインならびにフルニトラゼパムの中毒レベル</u></p> <p><u>アルコールによる不慮の中毒 (X45) にコードする。欄でアルコール中毒のみと位置付け、欄で他の物質は死因の一因となりうると記載することによって、死亡証明者はアルコールが死を引き起こした最重要物質と判断する。</u></p> <p>例： (a) ヘロインによる中毒</p> <p><u>アルコールならびにフルニトラゼパムの中毒レベル</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>Code to accidental poisoning by heroin (X42). By placing heroin poisoning alone in Part I and reporting the other substances as contributing causes of death, the certifier has identified heroin as the most important substance in bringing about the death.</u></p> <p><u>ii) When no component is specified as the main cause of death, clarification should be sought from the certifier.</u></p> <p><u>iii) When no such clarification can be obtained, code combinations of alcohol with a drug to the drug. For other multi-drug deaths, code to the appropriate category for “Other”.</u></p> <p><u>B) Identifying the most dangerous drug</u></p> <p><u>To provide useful statistics on multiple drug deaths, it is of utmost importance that the most dangerous drug is identifiable in addition to the underlying cause (see also Nature of injury, pp 86-87). When selecting the code for the most dangerous drug, apply the following instructions.</u></p>	<p><u>ヘロインによる不慮の中毒 (X42) にコードする。欄でヘロイン中毒のみと位置付け、他の物質は死因の一因となりうると記載することによって、死亡証明者はヘロインが死を引き起こした最重要物質と判断する。</u></p> <p><u>ii) 主たる死因の成分が明示されていない場合は、死亡証明者から説明を求めるべきである。</u></p> <p><u>iii) そのような説明が得られない場合、アルコールと他の薬物との配合剤をコードする。その他の多くの薬剤が死因の場合、「その他」のコードを当てる。</u></p> <p><u>B) 最も危険な薬物の鑑定</u></p> <p><u>多くの薬物による死亡の有用な統計を提出するためには、基礎原因に加え、最も危険な薬物が鑑定できるということが最も重要なことである (p86 - p87 損傷の性質を参照)。最も危険な薬物のコードを選択する場合、次の要領に従うこと。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>If one component of the combination is specified as the cause of death, code to that component. If no single component is indicated as the cause of death, code combinations of alcohol with a drug to the drug. When the classification provides a specific category for a combination of drugs, e.g. mixed antiepileptics (T42.5), code to that category. If no appropriate combination category is available, select the main injury code in the following order of priority:</p> <p>1. Opioids (T40.0-T40.2)</p> <p><u>Combinations including opioids classifiable to more than one fourth character subcategory in T40.0-T40.2: Code to T40.2</u></p> <p>2. Cocaine (T40.5)</p> <p>3. Psychostimulants with abuse potential (T43.6)</p> <p><u>Includes: Amphetamine and derivates</u></p> <p>4. Synthetic narcotics and other and unspecified narcotics (T40.3-T40.4, T40.6)</p> <p><u>Combinations including synthetic narcotics classifiable to more than one fourth-character subcategory in T40.3-T40.4: Code to T40.4</u></p>	<p><u>もし、その配合剤の一つの成分が、死因として明示されたならば、その成分にコードする。もし単一成分が死因として特定されていないならば、アルコールと他の薬物との配合剤をその薬物にコードする。分類中に、たとえば、抗てんかん薬の合剤（T42.5）など、薬物の配合剤に対して、特定の分類項目が規定されている場合は、その項目にコードする。もし、適切な配合剤分類項目がない場合は、下記の優先順位に従って主たる損傷コードを選択する。</u></p> <p><u>1 . オピオイド（ T40.0 - T40.2 ）</u></p> <p><u>T40.0 - T40.2の複数の4桁細分類項目に分類可能なオピオイドを含む配合剤：T40.2にコードする。</u></p> <p><u>2 . コカイン（ T40.5 ）</u></p> <p><u>3 . 乱用される可能性のある興奮剤（ T43.6 ）</u></p> <p><u>包含：アンフェタミンならびにその誘導體</u></p> <p><u>4 . 合成麻薬ならびにその他の詳細不明の麻薬（ T40.3 - T40.4、 T40.6 ）</u></p> <p><u>T40.3 - T40.4の複数の4桁細分類項目に分類可能な合成麻薬を含む配合剤：T40.4にコードする。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>Combinations including synthetic narcotics classifiable to more than one fourth-character subcategory in T40.3-T40.4 with other and unspecified narcotics classifiable to T40.6: Code to T40.6</u></p> <p>5. <u>Antidepressants (T43.0-T43.2)</u></p> <p><u>Combinations including antidepressants classifiable to more than one fourthcharacter subcategory in T43.0-T43.2: Code to T43.2</u></p> <p>6. <u>Non-opioid analgesics (T39.-)</u></p> <p><u>Combinations including non-opioid analgesics classifiable to more than one fourth-character subcategory in T39.0-T39.4: Code to T39.8</u></p> <p>7. <u>Drugs and substances not listed above</u></p> <p><u>If the death certificate reports more than one such drug, code to the first mentioned</u></p>	<p><u>T40.3 - T40.4の複数の4桁細分類項目に分類可能な合成麻薬、およびT40.6に分類可能なその他の詳細不明な麻薬を含む配合剤：T40.6にコードする。</u></p> <p><u>5 . 抗うつ薬 (T43.0 - T43.2)</u></p> <p><u>T43.0 - T43.2の複数の4桁細分類項目に分類可能な抗うつ薬を含む配合剤：T43.2にコードする。</u></p> <p><u>6 . 非オピオイド系鎮痛薬 (T39. -)</u></p> <p><u>T39.0 - T39.4の複数の4桁細分類項目に分類可能な非オピオイド系鎮痛薬を含む配合剤：T39.8にコードする。</u></p> <p><u>7 . 上記以外の薬物および製剤</u></p> <p><u>もし、死亡診断書に複数のこのような薬剤が記載されている場合は、最初に記載されたものをコードする。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
14	<p><u>4.2.14 Human Immunodeficiency Virus (HIV)</u></p> <p><u>When a blood transfusion is given as treatment for any condition (e.g. a haematological disorder) and an infected blood supply results in a HIV infection, code the HIV as the underlying cause and not the treated condition.</u></p> <p><u>Example 1: I (a) Kaposi's sarcoma 1 year</u></p> <p><u>(b) HIV 3 years</u></p> <p><u>(c) Blood transfusion 5 years</u></p> <p><u>(d) Haemophilia since birth</u></p> <p><u>Code to HIV.</u></p> <p><u>Example 2: I (a) Pneumocystis carinii 6 months</u></p> <p><u>(b) HIV 5 years</u></p>	<p><u>4.2.14 ヒト免疫不全ウイルス (HIV)</u></p> <p><u>何らかの病態（たとえば血液疾患）に対し、治療として輸血された場合および感染した血液が供給されHIVに感染した場合、治療の対象とされた病態ではなく、HIVを原死因としてコードする。</u></p> <p><u>例1： (a) カポジ肉腫 1年</u></p> <p><u>(b) HIV 3年</u></p> <p><u>(c) 輸血 5年</u></p> <p><u>(d) 血友病 出生後</u></p> <p><u>HIVにコードする。</u></p> <p><u>例2： (a) ニューモシスチス・カリニ 6ヶ月</u></p> <p><u>(b) HIV 5年</u></p>		<p>参照コード及び項目の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>(c) Ruptured spleen 7 years</u></p> <p><u>(d) Assault – fist fight 7 years</u></p> <p><u>Code to HIV.</u></p>	<p><u>(c) 脾破裂 7年</u></p> <p><u>(d) 暴行 - 素手の殴り合い 7年</u></p> <p><u>HIVにコードする。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>
15	<p>4.4.4 Chapter-specific notes</p> <p><i>Chapter VIII: Diseases of the ear and mastoid process</i></p> <p><u>H90-H91 Hearing loss</u></p> <p>These codes are not to be used...</p>	<p>4.4.4 章ごとの注釈</p> <p>第VIII章：耳および乳様突起の疾患</p> <p><u>H90 - H91 難聴</u></p> <p>これらのコードは・・・使用しない。</p>	<p>第VIII章：耳および乳様突起の疾患</p> <p>これらのコードは・・・使用しない。</p>	<p>参照コード及び項目の追加</p>
16	<p><u>Recommendations</u></p> <p><u>1. Responsibility for medical certification of cause of death (see section 5.2)</u></p>	<p><u>勧告：</u></p> <p><u>1. 死亡診断書の作成に対する責務（5.2参照）</u></p>		<p>勧告文追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>The medical certification of the cause of death is normally the responsibility of the attending physician. In the case of deaths certified by coroners or other legal authorities, the medical evidence supplied to the certifier should be stated on the certificate in addition to any legal findings.</u></p> <p>2. <u>Form of medical certificate of cause of death (see sections 5.2, 4.1.3, and 4.3.1)</u></p> <p><u>The medical certificate of cause of death should be in line with the international recommendation (see section 4.1.3). Collection of perinatal mortality statistics should be consistent with the recommendations presented in section 4.3.1.</u></p> <p>3. <u>Confidentiality of medical information (see section 5.2)</u></p> <p><u>Administrative procedures should ensure the confidentiality of data from the death certificate or other medical records.</u></p> <p>4. <u>Selection of the cause for mortality tabulation (see section 4.1.1)</u></p>	<p><u>死亡診断書の作成は、通常、死に立ち会った医師の責務である。検視官またはその他の司法当局者によって記載された死亡例では、医学的所見は、法的根拠を伴って、死亡診断書に記載されなければならない。</u></p> <p><u>2. 死亡診断書の様式（5.2、4.1.3、4.3.1参照）</u></p> <p><u>死亡診断書は、国際的勧告に従ったものでなければならない。（4.1.3参照）</u> <u>周産期死亡統計の収集は、4.3.1に示された勧告に合致していなければならない。</u></p> <p><u>3. 医学情報の守秘義務（5.2参照）</u></p> <p><u>行政手続においては、死亡診断書またはその他の診療録からのデータの守秘義務を守らなければならない。</u></p> <p><u>4. 死亡表製表のための原因の選択（4.1.1参照）</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>The causes of death to be entered on the medical certificate of cause of death are all diseases, morbid conditions or injuries resulting in or contributing to death and the circumstances of the accident or violence resulting in injuries. When only one cause of death is recorded, this cause is selected for tabulation. When more than one cause of death is recorded, selection should be made in accordance with the rules and guidelines given in the ICD.</u></p> <p>5. <u>Use of the International Classification of Diseases (see sections 2.1, 2.2, and 3.3)</u></p> <p><u>The purpose of the ICD is to permit the systematic recording, analysis, interpretation and comparison of mortality and morbidity data collected in different countries or areas and at different times. The “core” classification of ICD-10 is the three-character code, which is the mandatory level of coding for international reporting to the WHO mortality database and for general international comparisons. The four-character subcategories, while not mandatory for reporting at the international level, are recommended for many purposes and form an integral part of the ICD, as do the special tabulation lists.</u></p>	<p><u>死亡診断書上に記載される死亡原因<死因>は、死亡を引き起こしたか、その一因となったすべての疾病、病態または損傷、およびこれらの損傷を引き起こした事故または暴力の状況である。死因が一つだけ記載された場合には、この原因が製表に使用される。複数の死因が記載された場合は、ICDに示されたルールとガイドラインに従って、選択しなければならない。</u></p> <p><u>5. 国際疾病分類の使用（2.1、2.2、3.3参照）</u></p> <p><u>ICDの目的は、異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録・分析、解釈および比較を行うことである。ICD-10の「コア」分類は3桁コードであり、これはWHOの死亡データベースへの国際報告および一般的な国際比較のためのコーディングの必須レベルである。4桁細分類項目は、国際レベルでの報告には必須ではないが、特定製表用リストにみられるように、さまざまな目的の使用に適し、ICDの欠くことのできない部分を構成している。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>Mortality and morbidity statistics should be coded according to the tabular list of inclusions and the alphabetical index. Fourth-character subcategories, when published, should be those of the ICD. Any additions or variations should be indicated in published statistical tables.</u></p> <p>6. <u>Perinatal mortality statistics (see sections 5.7.2 and 5.7.3)</u></p> <p><u>It is recommended that all fetuses and infants weighing at least 500 g at birth, whether alive or dead, should be included in national statistics. When information on birth weight is unavailable, the corresponding criteria for gestational age (22 completed weeks) or body length (25 cm crown-heel) should be used. The criteria for deciding whether an event has taken place within the perinatal period should be applied in the order: (1) birth weight, (2) gestational age, (3) crown-heel length. The inclusion of fetuses and infants weighing between 500 g and 1000 g in national statistics is recommended both because of its inherent value and because it improves the coverage of reporting at 1000 g and over.</u></p>	<p><u>死亡と疾病統計は、内容例示集と索引表によってコード化されなければならない。発行される時には、4桁細分類項目はICDの方法になっていなければならない。どんな追加、変更もすでに刊行された統計の製表に従わなければならない。</u></p> <p><u>6 . 周産期死亡統計 (5.7.2、5.7.3参照)</u></p> <p><u>出産体重が少なくとも500グラム以上の胎児または新生児は、生死にかかわらず、国内の統計の中を含めるべきことが勧告されている。出産体重の情報が不明の場合は、妊娠期間（妊娠満22週）または身長（頭 踵25センチメートル）を、これに対応する基準として使用すべきである。周産期内に起きた事象かどうか決定するための基準は、下記の順に適用する：(1)出生体重、(2)妊娠期間、(3)頭 踵長。国内の統計に、500グラムと1000グラムとの間の体重の胎児および乳児を含めることは、本来的に価値があり、また、1000グラム以上の胎児および乳児についての報告率が向上する、という理由で勧告される。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>In statistics for international comparison, inclusion of the extremely low-birth-weight group disrupts the validity of comparisons and is not recommended. Countries should also present statistics in which both the numerator and the denominator of all ratios and rates are restricted to fetuses and infants weighing 1000 g or more (weight-specific ratios and rates); where information on birth weight is not available, the corresponding gestational age (28 completed weeks) or body length (35 cm crown-heel) should be used.</u></p> <p>7. <u>Maternal mortality statistics (see sections 5.8.2 and 5.8.3)</u></p> <p><u>Published maternal mortality rates should always specify the numerator, which can be given as: the number of recorded direct obstetric deaths, or the number of recorded obstetric deaths (direct plus indirect). For the purpose of international reporting of maternal mortality, only those maternal deaths occurring before the end of the 42-day reference period should be included in the calculation of the various ratios and rates, although the recording of later deaths is useful for national analytical purposes.</u></p>	<p><u>国際比較のための統計では、超低出産体重 (extremely low-birth-weight) のグループを含めることは、比較の有効性を損なうので勧められない。各国はまた、比および率の分子と分母との両方が、体重1000グラム以上の胎児および乳児に限られている統計（体重別の比および率）を作成すべきである；出産体重についての情報がない場合には、該当する妊娠期間（満28週）または身長（頭 踵35センチメートル）を使用しなければならない。</u></p> <p><u>7. 妊産婦＜母体＞死亡統計（5.8.2、5.8.3参照）</u></p> <p><u>妊産婦＜母体＞死亡率の公表には、分子を常に明示しなければならない。それは下記のように示される。：記録された直接産科的死亡数、または、記録された産科的死亡数（直接および間接の合計）妊産婦＜母体＞死亡の国際的報告の目的のためには、その後の死亡の記録が国内の分析の目的に有用であったとしても、関連期間の42日の終了以前に発生した妊産婦＜母体＞死亡のみを種々の比および率の算出に含めるべきである。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>8. <u>Statistical tables (see sections 5.6.1 and 5.7.4)</u></p> <p><u>The degree of detail in cross-classification by cause, sex, age, and geographical area will depend both on the purpose and range of the statistics and on the practical limits to their tabulation. Standard ways of presenting statistics are described in sections 5.6.1 and 5.7.4 to promote international compatibility.</u></p> <p>9. <u>Tabulation of causes of death (see sections 5.6.2 and 5.6.4)</u></p> <p><u>Statistics of causes of death for a defined area should be in accordance with recommendations in section 5.6.1. Deaths should preferably be classified by sex and age group as in recommendations in section 5.6.1. For statistics of perinatal mortality, full-scale multiple-cause analysis of all conditions reported will be of greatest benefit. Where such analysis is impracticable, analysis of the main disease or condition in the fetus or infant and of the main maternal condition affecting the fetus or infant with cross-tabulation of groups of these two conditions should be regarded as the minimum. Where it is necessary to select only one condition, the main disease or condition in the fetus or infant should be selected.</u></p>	<p><u>8 . 統計表 (5.6.1、5.7.4参照)</u></p> <p><u>統計の目的および範囲ならびにそれらの製表についての実際の制約の両方にもとづいて、原因、性、年齢および地理的領域によるクロス<(交差)>分類がどの程度詳しくなるかが制約される。国際間の適合性を促進するため、統計を作成する標準的な方法が5.6.1および5.7.4に示されている。</u></p> <p><u>9 . 死因の製表 (5.6.2、5.6.4参照)</u></p> <p><u>限定された地域についての死因の統計は、5.6.1にある勧告に従うべきである。死亡は、この5.6.1の勧告にある性および年齢群によって分類することが望ましい。周産期死亡の統計のためには、報告されたすべての病態の全体的な複合原因の解析がもっとも有用である。このような分析が不可能な場合は、胎児または新生児に影響を及ぼした主な母体の病態に、これら両病態のグループのクロス<(交差)>製表を使用した分析が、最小限必要なものとみなされるべきである。ただし、一つの病態のみの選択が必要な場合は、胎児または新生児の主な疾患または病態が選ばれるべきである。</u></p>		<p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p> <p>例示の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
17	<u>7 Appendices</u> <u>7.1 List of conditions unlikely to cause death</u> <u>Appendix 7.1</u> <u>List of conditions unlikely to cause death</u> <u>Code Category or subcategory</u> <u>A31.1 Cutaneous mycobacterial infection</u> <u>A42.8 Other forms of cutaneous actinomycosis</u> <u>A60.0 Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract</u> <u>A71.0 – A71.9 Trachoma</u> <u>A74.0 Chlamydial conjunctivitis</u> <u>B00.2 Herpesviral gingivostomatitis</u> <u>B00.5 Herpesviral ocular disease</u> <u>B00.8 Herpesviral whitlow</u> <u>B07 Viral warts</u> <u>B08.1 Molluscum contagiosum</u> <u>B08.8 Foot and mouth disease</u>	<u>10 付録（日本語版では番号修正）</u> <u>10.1 死亡を引き起こす可能性の低い病態のリスト</u> <u>付録 10.1</u> <u>死亡を引き起こす可能性の低い病態のリスト</u> <u>コード 分類項目または細分類項目</u> <u>A31.1 皮膚マイコバクテリア感染症</u> <u>A42.8 その他の型の皮膚放線菌症<アクチノミセス症></u> <u>A60.0 性器および尿路性器のヘルペスウイルス感染症</u> <u>A71.0 - A71.9 トラコーマ</u> <u>A74.0 クラミジア結膜炎</u> <u>B00.2 ヘルペスウイルス（性）歯肉口内炎</u> <u>B00.5 ヘルペスウイルス（性）眼疾患</u> <u>B00.8 ヘルペスウイルス（性）ひょう<瘰>痘</u> <u>B07 ウイルス（性）いぼ<疣><疣贅></u> <u>B08.1 伝染性軟属腫</u> <u>B08.8 口蹄疫</u>		付録の追加 参照コード及び項目の追加 参照コード及び項目の追加 例示の追加 例示の追加 参照コード及び項目の追加 参照コード及び項目の追加 参照コード及び項目の追加 参照コード及び項目の追加 参照コード及び項目の追加 参照コード及び項目の追加 参照コード及び項目の追加 参照コード及び項目の追加 参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>B30.0 – B30.9 Viral conjunctivitis</u>	<u>B30.0 - B30.9 ウイルス（性）結膜炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>B35.0 – B35.9 Dermatophytosis</u>	<u>B35.0 - B35.9 皮膚糸状菌症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>B36.0 – B36.9 Other superficial mycoses</u>	<u>B36.0 - B36.9 その他の表在性真菌症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>B85.0 – B85.4 Pediculosis and phthiriasis</u>	<u>B85.0 - B85.4 シラミ症およびケジラミ症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F45.3 – F45.9 Somatoform disorders</u>	<u>F45.3 - F45.9 身体表現性障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F50.1, F50.3 – F50.9 Eating disorders</u>	<u>F50.1、F50.3 - F50.9 摂食障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F51.0 – F51.9 Nonorganic sleep disorders</u>	<u>F51.0 - F51.9 非器質性睡眠障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F52.0 – F52.9 Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease</u>	<u>F52.0 - F52.9 性機能不全、器質性障害または疾病によらないもの</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F60.0 – F60.9 Specific personality disorders</u>	<u>F60.0 - F60.9 特定の人格障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F61 Mixed and other personality disorders</u>	<u>F61 混合性およびその他の人格障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F62.0 – F62.9 Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease</u>	<u>F62.0 - F62.9 持続的人格変化、脳損傷および脳疾患によらないもの</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F63.0 – F63.9 Habit and impulse disorders</u>	<u>F63.0 - F63.9 習慣および衝動の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F64.0 – F64.9 Gender identity disorders</u>	<u>F64.0 - F64.9 性同一性障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F65.0 – F65.9 Disorders of sexual preference</u>	<u>F65.0 - F65.9 性嗜好の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F66.0 – F66.9 Psychological and behavior disorders associated with sexual development and orientation</u>	<u>F66.0 - F66.9 性発達および方向づけに関連する心理および行動の障害</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>F68.0 – F68.9 Other disorders of adult personality and behavior</u>	<u>F68.0 - F68.9 その他の成人の人格および行動の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F69 Unspecified disorder of adult personality and behavior</u>	<u>F69 詳細不明の成人の人格および行動の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F95.0 – F95.9 Tic disorders</u>	<u>F95.0 - F95.9 チック障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>F98.0 – F98.9 Other behavioural and emotional disorders with an onset usually occurring in childhood and adolescence</u>	<u>F98.0 - F98.9 小児<児童>期および青年期に通常発症するその他の行動および情緒の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>G43.0 – G43.2, G43.8 – G43.9 Migraine, except complicated migraine (G43.3)</u>	<u>G43.0 - G43.2, G43.8 - G43.9 片頭痛、「合併症を伴う片頭痛(G43.3)」を除く</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>G44.0 – G44.2 Other headache syndromes</u>	<u>G44.0 - G44.2 その他の頭痛症候群</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>G45.0 – G45.9 Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes</u>	<u>G45.0 - G45.9 一過性脳虚血発作および関連症候群</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>G50.0 – G50.9 Disorders of trigeminal nerve</u>	<u>G50.0 - G50.9 三叉神経障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>G51.0 – G51.9 Facial nerve disorders</u>	<u>G51.0 - G51.9 顔面神経障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>G54.0 – G54.9 Nerve root and plexus disorders</u>	<u>G54.0 - G54.9 神経根および神経そう<叢>の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>G56.0 – G56.9 Mononeuropathies of upper limb</u>	<u>G56.0 - G56.9 上肢の単ニューロパチ<シ>ー</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>G57.0 – G57.9 Mononeuropathies of lower limb</u>	<u>G57.0 - G57.9 下肢の単ニューロパチ<シ>ー</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>G58.7 Mononeuritis multiplex</u>	<u>G58.7 多発性単神経炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H00.0 – H00.1 Hordeolum and chalazion</u>	<u>H00.0 - H00.1 麦粒腫およびさん<霰>粒腫</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>H01.0 – H01.9 Other inflammation of eyelid</u>	<u>H01.0 - H01.9 眼瞼のその他の炎症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H02.0 – H02.9 Other disorders of eyelid</u>	<u>H02.0 - H02.9 眼瞼のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H04.0 – H04.9 Disorders of lacrimal system</u>	<u>H04.0 - H04.9 涙器の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H10.0 – H10.9 Conjunctivitis</u>	<u>H10.0 - H10.9 結膜炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H11.0 – H11.9 Other disorders of conjunctiva</u>	<u>H11.0 - H11.9 結膜のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H15.0 – H15.9 Disorders of sclera</u>	<u>H15.0 - H15.9 強膜の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H16.0 – H16.9 Keratitis</u>	<u>H16.0 - H16.9 角膜炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H17.0 – H17.9 Corneal scars and opacities</u>	<u>H17.0 - H17.9 角膜瘢痕および混濁</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H18.0 – H18.9 Other disorders of cornea</u>	<u>H18.0 - H18.9 角膜のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H20.0 – H20.9 Iridocyclitis</u>	<u>H20.0 - H20.9 虹彩毛様体炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H21.0 – H21.9 Other disorders of iris and ciliary body</u>	<u>H21.0 - H21.9 虹彩および毛様体のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H25.0 – H25.9 Senile cataract</u>	<u>H25.0 - H25.9 老人性白内障</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H26.0 – H26.9 Other cataract</u>	<u>H26.0 - H26.9 その他の白内障</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H27.0 – H27.9 Other disorders of lens</u>	<u>H27.0 - H27.9 水晶体のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H30.0 – H30.9 Chorioretinal inflammation</u>	<u>H30.0 - H30.9 網脈絡膜の炎症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H31.0 – H31.9 Other disorders of choroid</u>	<u>H31.0 - H31.9 脈絡膜のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H33.0 – H33.5 Retinal detachments and breaks</u>	<u>H33.0 - H33.9 網膜剥離および裂孔</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>H34.0 – H34.9 Retinal vascular occlusions</u>	<u>H34.0 - H34.9 網膜血管閉塞症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H35.0 – H35.9 Other retinal disorders</u>	<u>H35.0 - H35.9 その他の網膜障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H40.0 – H40.9 Glaucoma</u>	<u>H40.0 - H40.9 緑内障</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H43.0 – H43.9 Disorders of vitreous body</u>	<u>H43.0 - H43.9 硝子体の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H46 Optic neuritis</u>	<u>H46 視神経炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H47.0 – H47.7 Other disorders of optic (2nd) nerve and visual pathways</u>	<u>H47.0 - H47.7 視神経 [第2脳神経] および視 (覚) 路のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H49.0 – H49.9 Paralytic strabismus</u>	<u>H49.0 - H49.9 麻痺性斜視</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H50.0 – H50.9 Other strabismus</u>	<u>H50.0 - H50.9 その他の斜視</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H51.0 – H51.9 Other disorders of binocular movement</u>	<u>H51.0 - H51.9 両眼運動のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H52.0 – H52.7 Disorders of refraction and accomodation</u>	<u>H52.0 - H52.7 屈折および調節の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H53.0 – H53.9 Visual disturbances</u>	<u>H53.0 - H53.9 視覚障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H54.0 – H54.7 Blindness and low vision</u>	<u>H54.0 - H54.7 盲 < 失明 > および低視力</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H55 Nystagmus and other irregular eye movements</u>	<u>H55 眼振およびその他の不規則眼球運動</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H57.0 – H57.9 Other disorders of eye and adnexa</u>	<u>H57.0 - H57.9 眼および付属器のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H60.0 – H60.9 Otitis externa</u>	<u>H60.0 - H60.9 外耳炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H61.0 – H61.9 Other disorders of external ear</u>	<u>H61.0 - H61.9 その他の外耳障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H80.0 – H80.9 Otosclerosis</u>	<u>H80.0 - H80.9 耳硬化症</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>H83.3 – H83.9 Other diseases of inner ear</u>	<u>H83.3 - H83.9 その他の内耳疾患</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H90.0 – H90.8 Conductive and sensorineural hearing loss</u>	<u>H90.0 - H90.8 伝音および感音難聴</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H91.0 – H91.9 Other hearing loss</u>	<u>H91.0 - H91.9 その他の難聴</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H92.0 – H92.2 Otagia and effusion of ear</u>	<u>H92.0 - H92.2 耳痛および耳内貯留</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>H93.0 – H93.9 Other disorders of ear, not elsewhere classified</u>	<u>H93.0 - H93.9 耳のその他の障害、他に分類されないもの</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>J00 Acute nasopharyngitis (common cold)</u>	<u>J00 急性鼻咽頭炎〔かぜ〕</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>J06.0 – J06.9 Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites</u>	<u>J06.0 - J06.9 多部位および部位不明の急性上気道感染症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>J30.0 – J30.4 Vasomotor and allergic rhinitis</u>	<u>J30.0 - J30.4 血管運動性鼻炎およびアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー></u>		参照コード及び項目の追加
	<u>J33.0 – J33.9 Nasal polyp</u>	<u>J33.0 - J33.9 鼻ポリープ</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>J34.2 Deviated nasal septum</u>	<u>J34.2 鼻中隔彎曲症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>J35.0 – J35.9 Chronic disease of tonsils and adenoids</u>	<u>J35.0 - J35.9 扁桃およびアデノイドの慢性疾患</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K00.0 – K00.9 Disorders of tooth development and eruption</u>	<u>K00.0 - K00.9 歯の発育および萌出の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K01.0 – K01.1 Embedded and impacted teeth</u>	<u>K01.0 - K01.1 埋伏歯</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K02.0 – K02.9 Dental caries</u>	<u>K02.0 - K02.9 う<齲>蝕</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>K03.0 – K03.9 Other diseases of hard tissues of teeth</u>	<u>K03.0 - K03.9 歯の硬組織のその他の疾患</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K04.0 – K04.9 Diseases of pulp and periapical tissues</u>	<u>K04.0 - K04.9 歯髄および根尖歯周組織の疾患</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K05.0 – K05.6 Gingivitis and periodontal diseases</u>	<u>K05.0 - K05.6 歯肉炎および歯周疾患</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K06.0 – K06.9 Other disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge</u>	<u>K06.0 - K06.9 歯肉および無歯顎堤のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K07.0 – K07.9 Dentofacial anomalies (including malocclusion)</u>	<u>K07.0 - K07.9 歯顎顔面（先天）異常〔不正咬合を含む〕</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K08.0 – K08.9 Other disorders of teeth and supporting structures</u>	<u>K08.0 - K08.9 歯および歯の支持組織のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K09.0 – K09.9 Cyst of oral region, not elsewhere classified</u>	<u>K09.0 - K09.9 口腔部のう〈囊〉胞、他に分類されないもの</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K10.0 – K10.9 Other diseases of jaws</u>	<u>K10.0 - K10.9 顎骨のその他の疾患</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K11.0 – K11.9 Diseases of the salivary glands</u>	<u>K11.0 - K11.9 唾液腺疾患</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>K14.0 – K14.9 Diseases of tongue</u>	<u>K14.0 - K14.9 舌の疾患</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L01.0 – L01.1 Impetigo (for infants over 1 year of age)</u>	<u>L01.0 - L01.1 膿か〈痂〉疹（1歳以上の幼児）</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L03.0 Cellulitis of finger and toe</u>	<u>L03.0 手指および趾〈足ゆび〉の蜂巣炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L04.0 – L04.9 Acute lymphadenitis</u>	<u>L04.0 - L04.9 急性リンパ節炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L05.0 – L05.9 Pilonidal cyst</u>	<u>L05.0 - L05.9 毛巣のう〈囊〉胞</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>L08.0 – L08.8 Other local infections of skin and subcutaneous tissue</u>	<u>L08.0 - L08.8 皮膚および皮下組織のその他の局所感染症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L20.0 – L20.9 Atopic dermatitis</u>	<u>L20.0 - L20.9 アトピー性皮膚炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L21.0 – L21.9 Seborrhoeic dermatitis</u>	<u>L21.0 - L21.9 脂漏性皮膚炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L22 Diaper (napkin) dermatitis</u>	<u>L22 おむつ皮膚炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L23.0 – L23.9 Allergic contact dermatitis</u>	<u>L23.0 - L23.9 アレルギー性接触皮膚炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L24.0 – L24.9 Irritant contact dermatitis</u>	<u>L24.0 - L24.9 刺激物質（性）接触皮膚炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L25.0 – L25.9 Unspecified contact dermatitis</u>	<u>L25.0 - L25.9 詳細不明の接触性皮膚炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L28.0 – L28.2 Lichen simplex chronicus and prurigo</u>	<u>L28.0 - L28.2 慢性単純性苔せん<癬>および痒疹</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L29.0 – L29.9 Pruritus</u>	<u>L29.0 - L29.9 そう<瘙>痒症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L30.0 – L30.9 Other dermatitis</u>	<u>L30.0 - L30.9 その他の皮膚炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L41.0 – L41.9 Parapsoriasis</u>	<u>L41.0 - L41.9 類乾せん<癬></u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L42 Pityriasis rosea</u>	<u>L42 バラ色ひこう<粧糠>疹</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L43.0 – L43.9 Lichen planus</u>	<u>L43.0 - L43.9 扁平苔せん<癬></u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L44.0 – L44.9 Other papulosquamous disorders</u>	<u>L44.0 - L44.9 その他の丘疹落せつ<屑><りんせつ><鱗屑>>性障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L55.0 – L55.1, L55.8 – L55.9 Sunburn, except sunburn of third degree (L55.2)</u>	<u>L55.0 - L55.1, L55.8 - L55.9 「第3度の日焼け (L55.2)」を除く、日焼け</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>L56.0 – L56.9 Other acute skin changes due to ultraviolet radiation</u>	<u>L56.0 - L56.9 紫外線によるその他の急性皮膚変化</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L57.0 – L57.9 Skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation</u>	<u>L57.0 - L57.9 非電離放射線の慢性曝露による皮膚変化</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L58.0 – L58.9 Radiodermatitis</u>	<u>L58.0 - L58.9 放射線皮膚炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L59.0 – L59.9 Other disorders of skin and subcutaneous tissue related to radiation</u>	<u>L59.0 - L59.9 皮膚および皮下組織の放射線に関連するその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L60.0 – L60.9 Nail disorders</u>	<u>L60.0 - L60.9 爪の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L63.0 – L63.9 Alopecia areata</u>	<u>L63.0 - L63.9 円形脱毛症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L64.0 – L64.9 Androgenic alopecia</u>	<u>L64.0 - L64.9 男性ホルモン性脱毛症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L65.0 – L65.9 Other nonscarring hair loss</u>	<u>L65.0 - L65.9 その他の非瘢痕性脱毛症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L66.0 – L66.9 Cicatricial alopecia (scarring hair loss)</u>	<u>L66.0 - L66.9 瘢痕性脱毛症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L67.0 – L67.9 Hair colour and hair shaft abnormalities</u>	<u>L67.0 - L67.9 毛髪色および毛幹の異常</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L68.0 – L68.9 Hypertrichosis</u>	<u>L68.0 - L68.9 多毛症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L70.0 – L70.9 Acne</u>	<u>L70.0 - L70.9 痤瘡<アクネ></u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L72.0 – L72.9 Follicular cysts of skin and subcutaneous tissue</u>	<u>L72.0 - L72.9 皮膚および皮下組織の毛包のう<囊>胞</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>L73.0 – L73.9 Other follicular disorders</u>	<u>L73.0 - L73.9 その他の毛包のう < 囊 > 障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L74.0 – L74.9 Eccrine sweat disorders</u>	<u>L74.0 - L74.9 エクリン汗腺の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L75.0 – L75.9 Aprocrine sweat disorders</u>	<u>L75.0 - L75.9 アポクリン汗腺の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L80 Vitiligo</u>	<u>L80 白斑</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L81.0 – L81.9 Other disorders of pigmentation</u>	<u>L81.0 - L81.9 その他の色素（沈着）異常症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L83 Acanthosis nigricans</u>	<u>L83 黒色表皮腫</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L84 Corns and callosities</u>	<u>L84 うおのめ < 鶏眼 > およびべんち < 胼胝 ></u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L85.0 – L85.9 Other epidermal thickening</u>	<u>L85.0 - L85.9 その他の表皮肥厚</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L87.0 – L87.9 Transepidermal elimination disorders</u>	<u>L87.0 - L87.9 経表皮排除疾患</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L90.0 – L90.9 Atrophic disorders of skin</u>	<u>L90.0 - L90.9 皮膚の萎縮性障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L91.0 – L91.9 Hypertrophic disorders of skin</u>	<u>L91.0 - L91.9 皮膚の肥厚性障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L92.0 – L92.9 Granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue</u>	<u>L92.0 - L92.9 皮膚および皮下組織の肉芽腫性障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L94.0 – L94.9 Other localized connective tissue disorders</u>	<u>L94.0 - L94.9 その他の限局性結合組織障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>L98.0 – L98.3, L98.5-L95.9 Other disorders of skin and subcutaneous tissue, not elsewhere classified</u>	<u>L98.0 - L98.3, L98.5 - L98.9 皮膚および皮下組織のその他の障害、他に分類されないもの</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>M20.0 – M20.6 Acquired deformities of fingers and toes</u>	<u>M20.0 - M20.6 指および趾<足ゆび>の後天性変形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M21.0 – M21.9 Other acquired deformities of limbs</u>	<u>M21.0 - M21.9 (四)肢のその他の後天性変形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M22.0 – M22.9 Disorders of patella</u>	<u>M22.0 - M22.9 膝蓋骨の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M23.0 – M23.9 Internal derangement of knee</u>	<u>M23.0 - M23.9 膝内障</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M24.0 – M24.9 Other specific joint derangements</u>	<u>M24.0 - M24.9 その他の明示された関節内障</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M25.0 – M25.9 Other joint disorders, not elsewhere classified</u>	<u>M25.0 - M25.9 その他の関節障害、他に分類されないもの</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M35.3 Polymyalgia rheumatica</u>	<u>M35.3 リウマチ性多発筋痛症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M40.0 – M40.5 Kyphosis and lordosis</u>	<u>M40.0 - M40.5 (脊柱)後弯(症)および(脊柱)前弯(症)</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M43.6 Torticollis, unspecified</u>	<u>M43.6 斜頸、詳細不明</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M43.8 – M43.9 Other and deforming dorsopathies</u>	<u>M43.8 - M43.9 その他の変形性脊柱障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M48.0 Spinal stenosis in cervical region</u>	<u>M48.0 頸部における脊柱管狭窄(症)</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M53.0 – M53.9 Other dorsopathies, not elsewhere classified</u>	<u>M53.0 - M53.9 その他の脊柱障害、他に分類されないもの</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M54.0 – M54.9 Dorsalgia</u>	<u>M54.0 - M54.9 背部痛</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M60.0 – M60.9 Myositis</u>	<u>M60.0 - M60.9 筋炎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M65.0 – M65.9 Synovitis and tenosynovitis</u>	<u>M65.0 - M65.9 滑膜炎および腱鞘炎</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>M66.0 – M66.5 Spontaneous rupture of synovium and tendon</u>	<u>M66.0 - M66.5 滑膜および腱の特発性断裂</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M67.0 – M67.9 Other disorders of synovium and tendon</u>	<u>M67.0 - M67.9 滑膜および腱のその他の障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M70.0 – M70.9 Soft tissue disorders related to use, overuse and pressure</u>	<u>M70.0 - M70.9 使用、過使用および圧迫に関連する軟部組織障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M71.0 – M71.9 Other bursopathies</u>	<u>M71.0 - M71.9 その他の滑液包障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M75.0 – M75.9 Shoulder lesions</u>	<u>M75.0 - M75.9 肩の傷害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M76.0 – M76.9 Enthesopathies of lower limb, excluding foot</u>	<u>M76.0 - M76.9 下肢の腱（靭帯）付着部症、足を除く</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M77.0 – M77.9 Other enthesopathies</u>	<u>M77.0 - M77.9 その他の腱（靭帯）付着部症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M79.0 – M79.9 Other soft tissue disorders, not elsewhere classified</u>	<u>M79.0 - M79.9 その他の軟部組織障害、他に分類されないもの</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M95.0 – M95.9 Other acquired deformities of musculoskeletal system and connective tissue</u>	<u>M95.0 - M95.9 筋骨格系および結合組織のその他の後天性変形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>M99.0 – M99.9 Biomechanical lesions, not elsewhere classified</u>	<u>M99.0 - M99.9 生体力学的傷害、他に分類されないもの</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N39.3 Stress incontinence</u>	<u>N39.3 緊張性<腹圧性>尿失禁</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N46 Male infertility</u>	<u>N46 男性不妊症</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>N47 Redundant prepuce, phimosis, and paraphimosis</u>	<u>N47 過長包皮、包茎およびかん<嵌>頓包茎</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N60.0 – N60.9 Benign mammary dysplasia</u>	<u>N60.0 - N60.9 良性乳房異形成（症）</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N84.0 – N84.9 Polyp of female genital tract</u>	<u>N84.0 - N84.9 女性性器のポリープ</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N85.0 – N85.9 Other noninflammatory disorders of uterus, except cervix</u>	<u>N85.0 - N85.9 子宮のその他の非炎症性障害、子宮頸（部）を除く</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N86 Erosion and ectropion of cervix uteri</u>	<u>N86 子宮頸（部）のびらんおよび外反（症）</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N87.0 – N87.9 Dysplasia of cervix uteri</u>	<u>N87.0 - N87.9 子宮頸（部）の異形成</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N88.0 – N88.9 Other noninflammatory disorders of cervix uteri</u>	<u>N88.0 - N88.9 子宮頸（部）のその他の非炎症性障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N89.0 – N89.9 Other noninflammatory disorders of vagina</u>	<u>N89.0 - N89.9 膣のその他の非炎症性障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N90.0 – N90.9 Other noninflammatory disorders of vulva and perineum</u>	<u>N90.0 - N90.9 外陰および会陰のその他の非炎症性障害</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N91.0 – N91.5 Absent, scanty, and rare menstruation</u>	<u>N91.0 - N91.5 無月経、過少月経および希発月経</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N92.0 – N92.6 Excessive, frequent, and irregular menstruation</u>	<u>N92.0 - N92.6 過多月経、頻発月経および不規則月経</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N93.0 – N93.9 Other abnormal uterine and vaginal bleeding</u>	<u>N93.0 - N93.9 子宮および膣のその他の異常出血</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>N94.0 – N94.9 Pain and other conditions associated with female genital organs and menstrual cycle</u>	<u>N94.0 - N94.9 女性性器および月経周期に関連する疼痛およびその他の病態</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>N96 Habitual aborter</u>	N96 習慣流産		参照コード及び項目の追加
	<u>N97.0 – N97.9 Female infertility</u>	<u>N97.0 - N97.9 女性不妊症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q10.0 – Q10.7 Congenital malformations of eyelid, lacrimal apparatus, and orbit</u>	<u>Q10.0 - Q10.7 眼瞼、涙器および眼窩の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q11.0 – Q11.3 Anophthalmos, microphthalmos and macropthalmos</u>	<u>Q11.0 - Q11.3 無眼球（症）、小眼球（症）および巨大眼球（症）</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q12.0 – Q12.9 Congenital lens malformations</u>	<u>Q12.0 - Q12.9 先天（性）水晶体奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q13.0 – Q13.9 Congenital malformations of anterior segment of eye</u>	<u>Q13.0 - Q13.9 前眼部の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q14.0 – Q14.9 Congenital malformations of posterior segment of eye</u>	<u>Q14.0 - Q14.9 眼球後極部の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q15.0 – Q15.9 Other congenital malformations of eye</u>	<u>Q15.0 - Q15.9 眼のその他の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q16.0 – Q16.9 Congenital malformations of ear causing impairment of hearing</u>	<u>Q16.0 - Q16.9 聴覚障害の原因となる耳の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q17.0 – Q17.9 Other congenital malformations of ear</u>	<u>Q17.0 - Q17.9 耳のその他の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>Q18.0 – Q18.9 Other congenital malformations of face and neck</u>	<u>Q18.0 - Q18.9 顔面および頸部のその他の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q38.1 Tongue tie</u>	<u>Q38.1 舌癒着（症）</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q65.0 – Q65.9 Congenital deformities of hip</u>	<u>Q65.0 - Q65.9 股関節部の先天（性）変形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q66.0 – Q66.9 Congenital deformities of feet</u>	<u>Q66.0 - Q66.9 足の先天（性）変形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q67.0 – Q67.8 Congenital musculoskeletal deformities of head, face, spine and chest</u>	<u>Q67.0 - Q67.8 頭部、顔面、脊柱および胸部の先天（性）筋骨格変形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q68.0 – Q68.8 Other congenital musculoskeletal deformities</u>	<u>Q68.0 - Q68.8 その他の先天（性）筋骨格変形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q69.0 – Q69.9 Polydactyly</u>	<u>Q69.0 - Q69.9 多指＜趾＞（症）</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q70.0 – Q70.9 Syndactyly</u>	<u>Q70.0 - Q70.9 合指＜趾＞（症）</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q71.0 – Q71.9 Reduction defects of upper limb</u>	<u>Q71.0 - Q71.9 上肢の減形成</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q72.0 – Q72.9 Reduction defects of lower limb</u>	<u>Q72.0 - Q72.9 下肢の減形成</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q73.0 – Q73.8 Reduction defects of unspecified limb</u>	<u>Q73.0 - Q73.8 詳細不明の（四）肢の減形成</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q74.0 – Q74.9 Other congenital malformations of limb(s)</u>	<u>Q74.0 - Q74.9 （四）肢のその他の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q80.0 – Q80.3, Q80.8 – Q80.9 Congenital ichthyosis, except Harlequin fetus (Q80.4)</u>	<u>Q80.0 - Q80.3, Q80.8 - Q80.9 先天性魚りんせん＜鱗癬＞、「道化師（様）胎児（Q80.4）」を除く</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex</u>	<u>Q81.0 単純性表皮水疱症</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q81.2 – Q81.9 Other forms of epidermolysis bullosa, except epidermolysis bullosa letalis (Q81.1)</u>	<u>Q81.2 - Q81.9 その他の型の表皮水疱症、「致死型表皮水疱症（Q81.1）」を除く</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q82.0 – Q82.9 Other congenital malformations of skin</u>	<u>Q82.0 - Q82.9 皮膚のその他の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q83.0 – Q83.9 Congenital malformations of breast</u>	<u>Q83.0 - Q83.9 乳房の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>Q84.0 – Q84.9 Other congenital malformations of integument</u>	<u>Q84.0 - Q84.9 外皮のその他の先天奇形</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S00.0 – S00.9 Superficial injury of head</u>	<u>S00.0 - S00.9 頭部の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S05.0, S05.1, S05.8 Superficial injuries (any type) of eye and orbit (any part)</u>	<u>S05.0, S05.1, S05.8 眼球および眼窩（あらゆる部位）の表在損傷（あらゆる種類）</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S10.0 – S10.9 Superficial injury of neck</u>	<u>S10.0 - S10.9 頸部の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S20.0 – S20.8 Superficial injury of thorax</u>	<u>S20.0 - S20.8 胸部＜郭＞の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S30.0 – S30.9 Superficial injury of abdomen, lower back and pelvis</u>	<u>S30.0 - S30.9 腹部、下背部および骨盤部の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S40.0 – S40.9 Superficial injury of shoulder and upper arm</u>	<u>S40.0 - S40.9 肩および上腕の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S50.0 – S50.9 Superficial injury of forearm</u>	<u>S50.0 - S50.9 前腕の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>S60.0 – S60.9 Superficial injury of wrist and hand</u>	<u>S60.0 - S60.9 手首および手の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S70.0 – S70.9 Superficial injury of hip and thigh</u>	<u>S70.0 - S70.9 股関節部および大腿の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S80.0 – S80.9 Superficial injury of lower leg</u>	<u>S80.0 - S80.9 下腿の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>S90.0 – S90.9 Superficial injury of ankle and foot</u>	<u>S90.0 - S90.9 足首および足の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T09.0 Superficial injury of trunk, level unspecified</u>	<u>T09.0 体幹の表在損傷、部位不明</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T11.0 Superficial injury of upper limb, level unspecified</u>	<u>T11.0 上肢の表在損傷、部位不明</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T13.0 Superficial injury of lower limb, level unspecified</u>	<u>T13.0 下肢の表在損傷、部位不明</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T14.0 Superficial injury of unspecified body region</u>	<u>T14.0 部位不明の表在損傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T20.1 Burn of first degree of head and neck</u>	<u>T20.1 頭部および頸部の第1度熱傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T21.1 Burn of first degree of trunk</u>	<u>T21.1 体幹の第1度熱傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T22.1 Burn of first degree of shoulder and upper limb, except wrist and hand</u>	<u>T22.1 肩および上肢の第1度熱傷、手首および手を除く</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T23.1 Burn of first degree of wrist and hand</u>	<u>T23.1 手首および手の第1度熱傷</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T24.1 Burn of first degree of hip and lower limb except ankle and foot</u>	<u>T24.1 股関節部および下肢の第1度熱傷、足首および足を除く</u>		参照コード及び項目の追加
	<u>T25.1 Burn of first degree of ankle and foot</u>	<u>T25.1 足首および足の第1度熱傷</u>		参照コード及び項目の追加