

## 自国の献血血液の血液製剤への使用状況

国名	自国の献血血液の使用 <sup>*1</sup>		確認されている発症数	
	輸血用血液製剤	血漿分画製剤	BSE (ウシ) <sup>*2</sup>	vCJD (ヒト) <sup>*3</sup>
オーストリア	○	○	1	0
ベルギー	○	○	106	0
デンマーク	○	○	10	0
フィンランド	○	○	1	0
フランス	○	○	754	6
ドイツ	○	○	244	0
ギリシャ	○	○	1	0
アイルランド	○	○	1,199	1 <sup>*4</sup>
イタリア	○	○	88	1
ルクセンブルグ	○	○	2	0
オランダ	○	○	56	0
ポルトガル	○	○	725	0
スペイン	○	○	244	0
スウェーデン	○	○	0	0
英国	○	×	182,802	132 <sup>*5</sup>
スイス	○	○	432	0
ノルウェー	○	○	0	0
カナダ	○	○	0	1 <sup>*6</sup>
アメリカ	○	○	0	1 <sup>*7</sup>
オーストラリア	○	○	0	0
ニュージーランド	○	○	0	0
日本	○	○	7	0

\*1 : PPTA (血漿蛋白製剤協会) 資料より作成、\*2 : 国際獣疫事務局資料より作成

\*3 : 健康局疾病対策課調査結果より作成、\*4 : 英国滞在歴あり、\*5 : 中国 (香港) 例含む

\*6 : 英国滞在歴あり、\*7 : 在米英国人