

情報提供について

85製品群		ワークシート		特掲した成分		成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相対すること				その他の 注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能
No	小分類	No	タイトル	適応禁忌	併用禁忌			長期連用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他	患者の背景	重篤な副作用				
								次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいずれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外		トローチの口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、と	用法用量の項	効能の項
					ピロキシカム軟膏	ピロキシカム(外用剤)	インサイドPKクリーム	本剤によるアレルギー既往歴、喘息、妊婦または妊娠の可能性、15歳未満の小児、目の周囲・粘膜等、湿疹・かぶれ・傷口、みずむし・たむし等または化粧している患部					医師の治療を受けている人、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴	発疹・発赤、かゆみ、落屑(皮ふ片の細かい脱落)、光線過敏症(日光が当たった部位に起こる発疹や水ぶくれ等の炎症)	1-2週間使用しても症状がよくならない場合。		目に入らないように注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、症状が重い場合は眼科医の診察を受ける。外用にのみ使用。本剤塗擦後ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わない。1週間あたり50gを超えて使用しない。	0.5%ピロキシカム 1日3~4回適量を患部に塗擦	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、肘の痛み(テニス肘など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、打撲、捻挫
					フェルピナク軟膏	フェルピナク(外用剤)	アベイン軟膏	本剤によるアレルギー既往歴、喘息既往歴、妊婦または妊娠の可能性、15歳未満の小児、目の周囲・粘膜等、湿疹・かぶれ・傷口、化粧している患部					医師の治療を受けている人、本人または家族のアレルギー体質の人、薬によるアレルギー既往歴	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ	1週間位使用しても症状がよくならない場合。		目に入らないように注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診察を受ける。ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わない。外用にのみ使用。	3%フェルピナク 1日2~4回、適量を患部に塗擦	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)

情報提供について

85製品群		ワークシート		特掲した成分		成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相対すること				その他の 注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能		
No	小分類	No	タイトル					適応禁忌	併用禁忌	長期連用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他						
				外用湿疹・皮膚炎用薬																	
				ステロイド抗炎症薬	吉草酸酢酸プレドニゾン	吉草酸酢酸プレドニゾン (外用剤)	リビメックス コーワ軟膏	水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部			長期連用は避ける。	顔面には、広範囲に使用しない。	医師の治療を受けている人、妊婦または妊娠の可能性、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、患部が広範囲の人、湿疹やただれのひどい人		まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外		トローチの口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、とか	用法用量の項	効能の項
					デキサメタゾン	デキサメタゾン (外用剤)	デキサトプ A	水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部			長期連用は避ける。		医師の治療を受けている人、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、患部が広範囲の人、湿疹やただれのひどい人		発疹・発赤、かゆみ、みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感	5-6日間使用しても症状がよくなる場合。		目に入らないように注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受ける。外用にのみ使用。	0.025%デキサメタゾン 1日2~3回、皮ふに適量を塗布または塗擦	湿疹、皮膚炎、じんましん、かぶれ、かゆみ、あせも、ただれ、虫さされ	
					酪酸ヒドロコ ルチゾン	酪酸ヒドロコ ルチゾン (外 用剤)	セロナクリ ム	水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部			長期連用は避ける。				発疹・発赤、かゆみ、みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感	5-6回使用しても症状がよくなる場合。		目に入らないように注意。症状が重い場合には眼科医の診療を受ける。外用にのみ使用。	0.05%酪酸ヒドロコ ルチゾン 1日 数回、患部に適量を塗 布	湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん	

情報提供について

85製品群		ワークシート		特掲した成分		成分名	製品名 (一般医薬品)	してはいけないこと				相談すること				その他の 注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能
No	小分類	No	タイトル	適応禁忌	併用禁忌			長期運用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他	患者の背景	重篤な副作用				
								次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいずれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外		トローチの口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、と	用法用量の項	効能の項
				抗ヒスタミン成分	塩酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン (外用剤)	新レスタミンコーフ軟膏						医師の治療を受けている人、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、湿疹やただれのひどい人		発疹・発赤、かゆみ	5-6回使用しても症状がよくなる場合。	目に入らないよう注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診察を受ける。外用にのみ使用。	2%塩酸ジフェンヒドラミン 1日数回患部に適量を塗布	湿疹、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、しもやけ、虫さされ、じんましん
					ジフェンヒドラミン	ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン (外用剤)	ペナバスタ						医師または歯科医師の治療を受けている人、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、患部が広範囲の人、湿潤やただれがひどい人		発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感	5-6日間使用しても症状の改善がみられない場合。	目に入らないよう注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診察を受ける。外用にのみ使用。	4%ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン 1日数回、適量を患部に塗布またはすり込む	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん
				かゆみ・虫さされ用薬	抗ヒスタミン成分	塩酸イソチベンジル	塩酸イソチベンジル (外用剤)	アンドアントールクール					医師の治療を受けている人、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、湿潤やただれのひどい人		発疹・発赤、かゆみ、はれ	5-6回使用しても症状がよくなる場合。	目に入らないよう注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診察を受ける。外用のみに使用し、内服しない。	0.75%酢酸イソチベンジル 1日数回適量を患部に塗布	湿疹、かぶれ、皮膚炎、あせも、じんましん、虫さされ、かゆみ、ただれ、しもやけ

情報提供について

85製品群		ワークシート		特掲した成分		成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相談すること				その他の 注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能
No	小分類	No	タイトル	抗白癬菌成分	塩酸アモロルフィン			塩酸アモロルフィン(外用剤)	ダマリンエース	適応禁忌	併用禁忌	長期連用	その他	患者の背景	重篤な副作用				
58	みずむし・たむし用薬	38	みずむし・たむし用薬	抗白癬菌成分	塩酸アモロルフィン	塩酸アモロルフィン(外用剤)	ダマリンエース	次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいずれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外	トローチの口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、と	用法用量の項	効能の項	
								本剤による過敏症既往歴、目や目の周囲・粘膜・陰のう・外陰部等、湿疹、湿潤・ただれ・亀裂や外傷のひどい患部					医師または歯科医師の治療を受けている人、乳幼児、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、患部が顔面または広範囲の人、患部が化膿している人、「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人、妊婦または妊娠の可能性		発疹・発赤、かゆみ、ただれ、はれ、刺激感、疼痛、ただれ	2週間位使用してもよくなる場合。		0.5%塩酸アモロルフィン 1日1回 適量を患部に塗布	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
					塩酸ネチコナゾール	塩酸ネチコナゾール(外用剤)	アトラントエースクリーム		本剤による過敏症既往歴、目や目の周囲・粘膜・陰のう・外陰部等、湿疹、湿潤・ただれ・亀裂や外傷のひどい患部				医師の治療を受けている人、妊婦または妊娠の可能性、乳幼児、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、患部が顔面または広範囲の人、患部が化膿している人、「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人		発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、落屑(皮ふ片の細かい脱落)、湿潤、ただれ、乾燥・つっぱり感	2週間位使用しても症状がよくなる場合や本剤の使用により症状が悪化した場合。	目に入らないように注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受ける。外用にのみ使用。	1%塩酸ネチコナゾール 1日1回、適量を患部に塗布	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

情報提供について

85製品群		ワークシート		特掲した成分		成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相談すること				その他の 注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能
No	小分類	No	タイトル	適応禁忌	併用禁忌			長期運用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他	患者の背景	重篤な副作用				
								次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいずれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外	トロー子の口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、と	用法用量の項	効能の項	
				塩酸ブテナフィン	塩酸ブテナフィン (外用剤)	スコルパダッシュ液		本剤による過敏症既往歴、目や目の周囲・粘膜・陰のう・外陰部等、湿疹・湿疹・ただれ・亀裂や外傷のひどい患部				医師の治療を受けている人、妊婦または妊娠の可能性、乳幼児、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、患部が顔面または広範囲の人、患部が化膿している人、「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人		発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水疱、亀裂	2週間位使用しても症状がよくなる場合、または、本剤の使用により症状が悪化した場合。	患部やその周囲が汚れたまま使用しない。目には入れない。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受ける。外用にのみ使用。	1%塩酸ブテナフィン 1日1回、適量を患部に塗布	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	
				シクロピロクソオラミン	シクロピロクソオラミン (外用剤)	ラマストーン液		目や目の周囲・粘膜・陰のう・外陰部等、湿疹・湿疹・ただれ・亀裂や外傷のひどい患部				医師の治療を受けている人、乳幼児、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、患部が顔面または広範囲の人、患部が化膿している人。「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人		発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、ただれ	2週間位使用しても症状がよくなる場合	患部やその周囲が汚れたまま使用しない。目には入れないように注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受ける。外用にのみ使用。	1%シクロピロクソオラミン 患部を清潔にして1日2~3回、適量を塗布または塗擦	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	

情報提供について

85製品群	ワークシート	特掲した成分	成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相談すること				その他の注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能
					適応禁忌	併用禁忌	長期連用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他				
No	小分類	No	タイトル			次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいずれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外	トローチの口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、と	用法用量の項	効能の項
				硝酸スルコナゾール(外用剤)	エキシブクリーム	目や目の周囲・粘膜・陰のう・外陰部等、湿疹、湿潤・ただれ・亀裂や外傷のひどい患部				医師の治療を受けている人、乳幼児、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、患部が顔面または広範囲の人、患部が化膿している人、「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、ただれ、乾燥	2週間位使用しても症状の改善がみられない場合や本剤の使用により症状が悪化した場合(病巣が使用前より広がるなど)	患部やその周囲が汚れたままご使用しない。目に入らないよう注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受ける。外用にのみ使用。	1%硝酸スルコナゾール1日2~3回、適量を患部に塗布	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	
59	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	39	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	角質軟化・保湿尿素	尿素(外用剤)	ケラチナミンコーワ20%尿素配合クリーム	目のまわり・粘膜等、引っかかり感等のきずくち・亀裂部位、かさぶたの様に皮ふがはがれているところ、炎症部位			医師の治療を受けている人、本人または家族のアレルギー体質、薬や化粧品等によるアレルギー既往歴	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態	2週間使用しても症状がよくなる場合。	目に入らないよう注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受ける。外用にのみ使用。化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみで使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しない。	20%尿素1日数回適量を患部に塗布	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌	

情報提供について

85製品群	ワークシート	特掲した成分	成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相談すること				その他の注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能	
					適応禁忌	併用禁忌	長期連用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他					
No	小分類	No	タイトル			次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいづれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外		トローチの口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、と	用法用量の項	効能の項
			※角質軟化成分サリチル酸	サリチル酸 (外用剤)	ウオノメトール	目の周囲・粘膜・やわらかい皮膚面・顔面等、炎症または傷のある患部				乳幼児、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴		発疹・発赤、かゆみ	5-6回使用しても症状がよくなる場合。	患部の周りの皮膚につかないよう注意。いぼに使用する場合は、本剤が有効なのは表面ザラザラした固い角質化したいぼなので、他のいぼは専門医に相談する。	サリチル酸絆創膏(50%)が患部を覆うように貼りつけ、1日毎に交換	うおめ、たご、いぼ、そこまめ	
60	毛髪用薬 (発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	40	毛髪用薬 (発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	発毛促進成分	ミノキシジル	リアップ	女性、未成年者、壮年性脱毛症以外の脱毛症、脱毛が急激であったり髪が斑状に抜けている人、本剤は頭皮のみに使用し内服しない、きず・湿疹あるいは炎症(発赤)等のある頭皮	他の育毛剤及び外用剤の頭皮への使用は避ける		家族・兄弟に壮年性脱毛症の人がいない人、薬や化粧品によるアレルギー既往歴、高齢者、心臓や腎臓に障害のある人、むくみのある人	頭皮の発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ふけ、局所熱感等、頭痛、気が遠くなる、めまい、胸の痛み、心拍が速くなる、原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ		6ヶ月間使うこと。離れでも効果はあるわけではない、やめると徐々に元に戻る。1年使用して効果のない場合。		1%ミノキシジル 1日2回、1回1mL	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防	

情報提供について

85製品群	ワークシート	特掲した成分	成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相談すること				その他の 注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能	
					適応禁忌	併用禁忌	長期運用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他					
No	小分類	No	タイトル			次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいづれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外		用法用量の項	効能の項	
62 63	一般点眼薬 抗菌性点眼薬	41	点眼薬	充血除去成分	塩酸テトラヒドロソリン	塩酸テトラヒドロソリン (点眼剤)	バイシン				医師の治療を受けている人、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、はげしい目の痛みがある人、緑内障	発疹・発赤、かゆみ、目の充血、目のかゆみ、目のはれ	目のかすみが改善されない場合、5-6日間使用しても症状がよくなる場合。		適度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招く。ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しない。点眼用のみ使用。	0.05%塩酸テトラヒドロソリン 1回1~2滴を1日3~4回点眼	結膜充血、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)
65	人工涙液			眼筋調節成分	メチル硫酸ネオステグミン	メチル硫酸ネオステグミン (点眼剤)	ノアール フォーカス			医師の治療を受けている人、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、はげしい目の痛みがある人、緑内障	発疹・発赤、かゆみ、目の充血、目のかゆみ、目のはれ	目のかすみが改善されない場合、2週間位使用しても症状がよくなる場合。		ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しない。点眼用のみ使用。	0.005%メチル硫酸ネオステグミン 1日3~6回、1回1~3滴ずつ点眼	目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目の疲れ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感	
73	口腔咽喉薬 (せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	45	口腔咽喉薬 (せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	抗炎症成分	アズレンスルホン酸ナトリウム	アズレンスルホン酸ナトリウム (口腔用)	ルルスプラッシュ			口内のひどいただれ		口の刺激感	5-6日間使用しても症状がよくなる場合。	目に入らないよう注意。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、眼科医の診療を受ける。	0.02%アズレンスルホン酸ナトリウム 1日数回、適量に水またはぬるま湯で洗い、眼科医の診療を受ける。	のどの炎症によるのどの痛み・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎	



情報提供について

85製品群	ワークシート		特掲した成分	成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相談すること				その他の注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能
						適応禁忌	併用禁忌	長期連用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他				
No	小分類	No	タイトル			次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいずれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外		トローチの口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、と	用法用量の項	効能の項
74	口内炎用薬			塩化リゾチー ム	ホピドンヨ ード(口腔用)	フィニッシュ コーワ	本剤によるアレ ルギー既往歴		長期連用 は避ける。		妊婦または妊娠 の可能性、授乳 中の人、本人ま たは家族のアレ ルギー体質、薬 によるアレ ルギー既往歴、口 中のひどいただ れ、甲状腺機能 障害	ショック(ア ナフィラキ シー)	あれ、しみ る、灼熱感、悪 心、吐気、不 快感	5-6回使用して も症状がよくな らない場合。	息を吸いなが ら使用す ると、液が 気管支や肺 に入ること があるので、ノズル をのどの患 部にむけ て、アーツ と声を出し ながら、 ピュッと2~ 3回直射す る。目に入 らないよう 注意。万一 目に入った 場合にはす ぐに水また はぬるま湯 で洗い、直 ちに眼科医 の診療を受 ける。塗布 にのみ使 用。	0.45%ホピ ドンヨード 1日数回適量 をのどの粘 膜面に噴射 塗布	のどの炎症によ るのどのあれ・ のどのいたみ・ のどのはれ・の どの不快感・声 がれ
				グリチルリチ ン酸二カリウ ム	グリチルリチ ン酸二カリウ ム(口腔用)	パッテル				医師または歯科 医師の治療を受 けている人、本 人または家族の アレルギー体 質、薬によるア レルギー既往歴		発疹・発赤、 かゆみ	5-6日間使用し ても症状がよ くならない場合。	5歳以下の乳 幼児には使 用させない。 錠剤の白色 面を患部粘 膜に付着	1患部に1回 1mgずつを1 日2~4回、 錠剤の白色 面を患部粘 膜に付着	口内炎(アフ タ性)	

情報提供について

85製品群				ワークシート	特掲した成分	成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相対すること				その他の注意	使用方法	用法用量	効能		
								適応禁忌	併用禁忌	長期連用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他		誤用や過量				
No	小分類	No	タイトル					次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいづれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することについて出てくる事項で、左の3項目以外		トローチの口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、とか過量に飲	用法用量の項	効能の項		
77	禁煙補助剤	47	禁煙補助剤	禁煙補助薬	ニコチン	ニコチン（咀嚼剤）	ニコレット	非喫煙者、すでに他のニコチン製剤を使用している人、妊婦または妊娠の可能性、重い心臓病を有する人：1) 3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人 2) 重い狭心症と医師に診断された人 3) 重い不整脈と医師に診断された人、急性期脳血管障害（脳梗塞、脳出血等）と医師に診断された人、本剤の成分による過敏症既往歴、あごの関節に障害がある人		6ヵ月を超えて使用しない。	授乳期間中の人には本剤を使用しない（本剤を使用する場合は授乳をしない）（母乳中に移行し、乳児の脈が速まることが考えられる。）、本剤を使用中あるいは使用直後にはタバコを吸わない。		医師または歯科医師の治療を受けている人、他の薬を使用している人（他の薬の作用に影響を与えることがある）、高齢者及び20歳未満の人、本人または家族のアレルギー体質、薬によるアレルギー既往歴、次の症状のある人：腹痛・胸痛・口内炎・のどの痛み・のどのはれ、医師から次の診断を受けた人：心臓疾患（心筋梗塞、狭心症、不整脈）・脳血管障害（脳梗塞、脳出血等）・パーキンソン病（末梢血管障害）・高血圧・甲状腺機能障害・褐色細胞腫・糖尿病（インスリン製剤を使用している人）・咽喉炎・食道炎・胃・十二指腸潰瘍・肝臓病・腎臓病（症状		口内炎、のどの痛み、はきけ、嘔吐、腹部不快感、胸やけ、食欲不振、下痢、発疹・発赤、かゆみ、頭痛、めまい、思考減退、眠気、どうき、胸部不快感、胸部刺激感、顔面潮紅、顔面浮腫、気分不良／口内・のどの刺激感、舌の荒れ、味の異常感、唾液増加、歯肉炎（ゆっくりかむとこれらの症状は軽くなること（長期・多量使用により本剤が入れ歯などに付着し、脱落・損傷を起こすことがあるの）、しゃっくり、げっぷ		誤って定められた用量を超えて使用したり小児が誤飲した場合には次のような症状があらわれることがあるので、その場合には直ちに医師または薬剤師に相談すること：はきけ・唾液増加・腹痛・下痢・発汗・頭痛・めまい・聴覚障害・全身脱力（急性ニコチン中毒の可能性がある。）、3ヵ月を超えて継続する場合は、医師または薬剤師に相談すること（長期・多量使用によりニコチン依存が本剤に引き継がれる。）		タバコを吸うのを完全に止めて使用する。1回2個以上かまない（ニコチンが過量に吸収され、はきけ、めまい、腹痛などの症状があらわれる）。辛みや刺激感を感じたらかむのを止めてはぼの内側などに寄せて休ませること。本剤はガム製剤であるので飲み込まないこと。また本剤が入れ歯などに付着し、脱落・損傷を起こすことがあるので、入れ歯などの歯科的治療を受けた人は使用に際して注意すること。コーヒーや炭酸飲料などを飲んだ後、しばらくは本剤を使用しない（本剤の十分な効果が得られないことがある）。口内に使用する吸入剤	タバコを吸いたいと思ったとき、1回1個（2mg）をゆっくりと間をおきながら、30～60分間かけてかむ。1日の総使用個数は表を目安とし、通常1日4～12個から始めて適宜増減するが、1日の総使用個数は24個を超えないこと。禁煙になれてきたら（1ヵ月前後）、1週間ごとに1日の使用個数を1～2個ずつ減らし、1日の使用個数が1～2個となった段階で使用をやめる。なお、使用期間は、	禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

情報提供について

85製品群	ワークシート		特掲した成分		成分名	製品名 (一般用医薬品)	してはいけないこと				相談すること				その他の 注意	使用方法 誤用や過量	用法用量	効能
							適応禁忌	併用禁忌	長期運用	その他	患者の背景	重篤な副作用	一般的な副作用	その他				
No	小分類	No	タイトル				次の人は服用しないでください。など	本剤服用中は次のいずれも服用しないでください。など	長期に使用しないでください。	服用後の車の運転。服用中の飲酒など。	次の人は医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。など	まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、直ちに受診など。	服用後、次の症状が現れた場合、相談すること。など	相談することに出てくる事項で、左の3項目以外	トローチの口内で徐々に溶かしてとか、口内が痺れるのですぐに飲み下す、とやみくもに薬剤とは同時に使用しない(口内・のどの刺激感、のどの痛みなどの症状を悪化させることがある)。「使用方法」は別途詳細な記載あり	用法用量の項	効能の項	
85	その他(いずれの薬効群にも属さない製剤)				銅クロロフィルリンナトリウム	サクロフィール錠					医師の治療を受けている人		/軟便		口臭の原因となる病気になる場合には、これらの治療にも心がける。	成人15歳以上1回45～60mg、1日1～3回	口臭の除去、二日酔い	