


厚生労働省発食安第0222001号  
平成 17 年 2 月 22 日

薬事・食品衛生審議会  
会長 井村 伸正 殿

厚生労働大臣 尾辻 秀人




### 諮詢書

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。

記

畜水産食品中に残留する次の動物用医薬品の基準設定について


ピルリマイシン



府食第257号  
平成17年 3月10日

厚生労働大臣  
尾辻 秀久 殿

食品安全委員会  
委員長 寺田 雅略



### 食品健康影響評価の結果の通知について

平成16年12月3日付 厚生労働省発食安第1203002号をもって貴省より当委員会に対し意見を求められたピルリマイシンに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりです。なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。

#### 記

ピルリマイシンの1日摂取許容量を0.008mg/kg体重/日と設定する


## (別添)

### ピルリマイシンの食品健康影響評価について

#### 1. 薬剤の概要

##### (1) 物質名<sup>(1)</sup>

ピルリマイシン塩酸塩水和物(pirlimycin hydrochloride hydrate)



分子式 : C<sub>17</sub>H<sub>31</sub>ClN<sub>2</sub>O<sub>5</sub>S · HCl · H<sub>2</sub>O

分子量 : 465.43

常温における性状 : 白色の結晶性粉末

融点 : 210.5~212.5°C

溶解度 : 70 g/L (pH 4.5)、3 g/L (pH 13)

蒸気圧 : nonvolatile

##### (2) 効能・効果<sup>(2)</sup>

ピルリマイシンは、リンコサミド<sup>a</sup>を含む MLS 抗生物質<sup>b</sup>の一群で、同系統の薬物としてはリンコマイシン、クリンダマイシン等がある。主としてグラム陽性菌に対して有効であり、作用機序は細菌細胞の 70S リボソームの 50S サブユニットに結合してペプチドトランスフェラーゼを阻害することにより、蛋白質合成を阻害するものと考えられている。一般的な乳房炎<sup>c</sup>の病原菌である *Staphylococcus* 属 (*S. aureus*) および *Streptococcus* 属 (*S. agalactiae*、*S. uberis*、*S. dysgalactiae*) 等のグラム陽性菌に対して有効であることから、動物用医薬品としては、乳房炎の治療に用いられている。

##### (3) その他<sup>(2)</sup>

本剤は、国内における承認はないが、米国、ニュージーランド等では泌乳期の乳牛の潜在性<sup>d</sup>および臨床型乳房炎の治療、EU(英国、ドイツ、フランス等)では、泌乳期の乳牛の潜在性乳房炎の治療を目的として使用されている。米国・ニュージーランドにおける用法・用量は、乳牛の 1 分房当たりピルリマイシンとして 50 mg の用量を 24 時間間隔、2 回の乳房内注入投与で、休薬期間は米国では牛 : 9 日、牛乳 : 36 時間、ニュージーランドでは牛 : 10 日、牛乳 : 60 時間である。EU における用法・用量は、乳牛の 1 分房当たりピルリマイシンとして 50 mg の用量を 24 時間間隔、8 回の乳房内注入投与で、休薬期間は牛 : 23 日、牛

<sup>a</sup> リンコサミン(6-amino-6,8-dideoxyoctose)を含む抗生物質の一群。

<sup>b</sup> Macrolide, Lincosamide and Streptogramin の略。これらは構造的に異なるが、すべて 70S リボソームの 50S サブユニットに作用する。

<sup>c</sup> 乳腺の炎症。ほとんどは細菌の感染による。臨床徴候としては、乳腺の疼痛、発熱、腫脹、乳の異常が含まれる。<sup>d</sup>

<sup>d</sup> 乳汁中の細胞数異常、臨床病理学的数値の異常によってのみ認められる乳房炎。<sup>d</sup>

乳：5日である。なお、FDA(1993年)、EMEA(1998年)、JECFA(2004年)においてすでに評価されており、それぞれ10、6、8 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日(2004年)のADIが設定されている。

## 2. 毒性試験の概要

### 2-1. 吸収・分布・代謝・排泄

#### (1) 吸収・排泄

##### 【ラットにおける経口投与試験】<sup>(4)</sup>

Sprague-Dawley系ラット(雌雄各6匹)に<sup>14</sup>C標識ピルリマイシンを経口投与(29mg/kg体重、5日間)し、尿中、糞中への回収率を測定した。

総投与量に対する回収量の比率は、尿中が約5%(雄4.5%、雌6.4%)、糞中が約60%(雄62.8%、雌58.8%)であった。

##### 【ヒトボランティアにおける経口投与試験】

5名の健常ボランティア男性における経口投与(50, 125, 250, 500mg/ヒト)において、50mgの投与では血漿中からピルリマイシンは検出できなかったが、その他の用量におけるT<sub>max</sub>は投与量にかかわらず4時間、C<sub>max</sub>はそれぞれ、0.1, 0.2, 0.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$ であった。投与後24時間までの尿中から2.8~6.9%が、72時間までの糞中から29~34%が回収された。<sup>(5)</sup>

健常男性におけるカプセルあるいは溶液を用いた経口投与(125mg/ヒト；各5名)において、C<sub>max</sub>はカプセルで0.11 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 、溶液で0.18 $\mu\text{g}/\text{mL}$ であった。48時間までの尿中回収率はカプセルで4.4%、溶液で7.3%であった。<sup>(6)</sup>

##### 【泌乳牛における乳房内投与試験】

泌乳牛(12頭)を用いた<sup>14</sup>C標識ピルリマイシンの乳房内投与(1分房当たり200mg×4分房、24時間間隔2回)におけるC<sub>max</sub>、T<sub>max</sub>、T<sub>1/2</sub>、AUCは次の通りであった。血液試料は第1回投与後96時間(第2回投与後72時間)まで17時点で採取された。

乳房内に投与されたピルリマイシンは大部分が投与後12時間以内に排泄され、これらは血中に移行せずに排泄されたものと考えられたが、一部は血液/乳房を介して全身の組織循環に入り、2相性の薬物動態が認められた。T<sub>max</sub>は第1回投与時が9~12時間、第2回投与時が6~12時間、C<sub>max</sub>は第1回投与時が平均0.083 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 、第2回投与時が平均0.131 $\mu\text{g}/\text{mL}$ であった。第2回投与時は第1回投与時の影響があり、約1.5倍であった。T<sub>1/2</sub>( $\alpha$ 相)は平均2.89時間、T<sub>1/2</sub>( $\beta$ 相)は37.6時間であった。血中薬物濃度一時間曲線下面積(AUC<sub>0-120</sub>)は2.269~7.114 $\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$ であった。

最終投与後4, 6, 14及び28日休薬し、その間それぞれ3頭について乳汁を12時間間隔、糞尿を24時間間隔で採取し、乳汁中、尿中及び糞中への回収率が測定された。

総回収率には休薬による明確な差は認められず、平均総回収率は乳汁に約50%、尿中に約10%、糞中に約24%であった。<sup>(7)</sup>

泌乳牛(23頭)に<sup>14</sup>C標識ピルリマイシンを乳房内投与(1分房当たり50mg、24時間間隔2回)し、最終投与後6, 10, 14, 18日までそれぞれ5頭(14日のみ8頭)について乳汁を12時間間隔、糞尿を24時間間隔で採取し、乳汁中、尿中及び糞中への回収率が測定された。

総投与量に対する回収量の比率は、乳汁中が50.7%、尿中が12.7%、糞中が27.6%であった。<sup>(8)</sup>

### 【泌乳牛における静脈投与試験】<sup>(9)</sup>

泌乳牛(3頭)を用いた<sup>14</sup>C標識ピルリマイシンの単回静脈内投与(800 mg/頭)におけるT<sub>1/2</sub>(α相)は0.16～0.27時間、T<sub>1/2</sub>(β相)は10.8～23.1時間であった。

総投与量に対する回収量の比率は、乳汁中が4.3%、尿中が26.5%、糞中が47.0%であった。

## (2) 代謝

### 【ラットにおける体内分布】<sup>(4)</sup>

Sprague-Dawley系ラット(雌雄各6匹)を用いた<sup>14</sup>C標識ピルリマイシンの経口投与(29mg/kg体重、5日間)において、投与終了時(投与終了後2-4時間)の組織中濃度は肝臓で最も高く、ついで腎臓、筋肉、脂肪であった。肝臓中の放射活性に対する化合物の割合は、ピルリマイシンが(雄57%、雌76%)、ピルリマイシンスルホキシドが(雄42%、雌21%)で代謝物の割合は雄でより高かった。

### 【泌乳牛における体内分布】

<sup>14</sup>C標識ピルリマイシン(1分房当たり200 mg×4分房)を24時間間隔で2回、泌乳牛(12頭)に乳房内投与し、第2回投与後4、6、14、28日に各3頭を用いた肝臓、腎臓、筋肉、脂肪中の残留量が総放射活性により測定されている。組織中濃度は調査されたいずれの時点においても肝臓で最も高く、ついで腎臓、脂肪、筋肉の順であったが経時的に減少した。<sup>(7)</sup>

<sup>14</sup>C標識ピルリマイシン(1分房当たり50 mg×4分房)を24時間間隔で2回、泌乳牛(23頭)に乳房内投与し、第2回投与後6、10、14、18日に5頭(14日のみ8頭)を用いて肝臓、腎臓、筋肉、脂肪中の残留量が総放射活性により測定されている。組織中濃度は肝臓で最も高く、ついで腎臓であった。最終投与後18日の時点の筋肉、脂肪中の濃度は0.005μg-eq/gであった。<sup>(8)</sup>

### 【泌乳牛における乳汁、肝臓、尿、糞中の代謝物】

<sup>14</sup>C標識ピルリマイシン(1分房当たり200 mg×4分房)を24時間間隔で2回、泌乳牛(12頭)に乳房内投与し、第2回投与後4、6、14、28日に各3頭を用いて組織を採取した。また、それまでの間乳汁を12時間間隔、糞尿を24時間間隔で採取した。採取された総サンプルの尿、糞、乳汁、肝臓中それぞれの代謝物の平均存在比は次のとおりであった。

尿中では、ピルリマイシン未変化体が80.6%、ピルリマイシンスルホキシドが8.0%、未同定の極性物質1が3.8%、2が6.7%、その他0.4%であった。糞中ではピルリマイシン未変化体が44.6%、ピルリマイシンスルホキシドが1.5%、未同定の極性物質1が32.2%、2が17.8%、その他2.6%であった。肝臓中ではピルリマイシン未変化体が21.9%、ピルリマイシンスルホキシドが76.5%であった。乳汁ではピルリマイシン未変化体が90.0%以上を占めていた。<sup>(10)</sup>

未同定の極性物質について、MS及びNMRを用いて同定が試みられ、これらはピルリマイシン又はピルリマイシンスルホキシドのリボヌクレオチド付加体であると結論されている。著者は、これら極性物質は主として糞中から検出されていることから、消化管中の微生物による代謝によって生成され、尿中からの検出については採取時に混入したものと推測している。<sup>(11)</sup>

## 2-2. 毒性試験

### (1) 急性毒性試験<sup>(12),(13)</sup>

Sprague-Dawley 系ラット(雌; 各 3 四)を用いた試験において、経口投与では 2000 mg/kg 体重までの 2 回の塩酸ピルリマイシンの投与で死亡は認められなかった。腹腔内投与では 300 mg/kg 体重では 2 回の投与で死亡は認められなかつたが、2000 mg/kg 体重では全例が死亡した。これらより、概略の LD<sub>50</sub> 値は経口投与で 5000 mg/kg 体重、腹腔内投与で 500 mg/kg 体重と推定された。

### (2) 亜急性毒性試験

#### 【ラットを用いた 30 日間亜急性毒性試験】<sup>(14)</sup>

5~6 週齢の Sprague-Dawley 系ラット(雌雄各 10 匹/群)を用いた胃挿管による強制経口(0、50、160、500 mg/kg 体重/日)投与における 30 日間の亜急性毒性試験において認められた毒性所見は以下の通りであった。

一般的な臨床症状観察では、特に投与に起因した異常は認められなかつた。また、160 mg 投与群の雌雄各 1 例が死亡したが、この他投与に起因した死亡例は認められなかつた。

体重変化は対照群と概ね同様であったが、雌の 50mg 投与群の 14 日以降、500mg 投与群の 21 日以降では軽度に増加していた。摂餌量も対照群と概ね同様であったが、全ての投与群で雄の 21-28 日、雌の 7-21 日の間、軽度な増加がみられた。

血液学的検査では、雄の全ての投与群で用量依存性はなかつたが白血球数の減少が認められた。500mg 投与群の雄で MCH、雌で単球の増加が認められた。

血液生化学的検査では、雄の全ての投与群で BUN の増加、雌の全ての投与群で ALT の上昇が認められた。雄の 160mg 以上の投与群で無機リン酸の増加、雄の 500mg 投与群で AST、ALT 及びアドレナリンの上昇が認められた。

臓器重量では、500 mg 投与群の雄で副腎重量の軽度な増加が認められた。

剖検及び病理組織学的検査は、500mg 投与群と対照群について実施されたが、500mg で明確な病変が認められた胃については 160mg 投与群についても実施されている。500mg 投与群では雌雄で表層及び深部の粘膜層に限局性の炎症病変が認められた。非腺胃部の病変は、通常腺胃部の近傍で認められ、角質層の境界面に限局した多形核貪食細胞の集合や、時折初期膿疱の形成が認められた。上皮は肥厚し、まれにびらんが認められ、病変部位の境界縁<sup>①</sup>は伸長していた。真皮には単球及び好酸球の浸潤が認められた。腺胃部では主として単球と好酸球の粘膜下織への浸潤であった。また、肝臓の電子顕微鏡検査(各群雌雄 3 例ずつ実施)では、500mg 投与群で肝細胞のミエリン小体<sup>②</sup>の存在およびリソゾームの増加が認められた。

本試験における NOAEL は求められなかつた。

#### 【ラットを用いた 3 ヶ月間亜急性毒性試験】<sup>(15)</sup>

約 5 週齢の Sprague-Dawley 系ラット(雌雄各 20 匹/群)を用いた胃挿管による強制経口(10、30、100、300 mg/kg 体重/日)投与における 91 日間の亜急性毒性試験において認められた毒性所見は以下の通りであった。

一般的な臨床症状観察、体重変化では、特に異常は認められなかつた。また、100 mg 投与群の雄 1 例及

<sup>①</sup> 前胃と腺胃の境界。境界縁は前胃粘膜の隆起であるが、これにより前胃と腺胃は明瞭に区分できる。

<sup>②</sup> リソゾーム内に脂質が蓄積したもの。

び300 mg 投与群の雄2例が失技のため死亡したが、この他投与に起因した死亡例は認められなかった。また、雄として群分けされていた 30 mg 投与群の 1 例が、投与 1 週に雌であることが判明したため、試験から除かれた。

体重変化では、300mg 投与群の雌で一時的な体重の増加が認められたが、この間の増体重に変化は無く、最終体重にも変化は認められなかった。

摂餌量では、300 mg 投与群の雌において対照群と比べて試験期間を通じて、100 mg 投与群の雌においてほとんどの期間で有意な増加が認められたが、体重変化との間に明確な相関関係はなかった。雄の全ての投与群と 30 mg 投与群の雌においても散発的な摂餌量の増加が認められた。

眼検査には投与に起因した異常は認められなかった。

血液学的検査では、30mg 以上投与群の雄で MCH の増加、100mg 以上投与群では MCV の増加が認められた。

血液生化学的検査では、30 mg 以上の投与群の雄で総蛋白質、グロブリンの低下が認められた。アルブミンについては 30 及び 300mg 投与群の雄で低下が認められ、100mg 投与群の雄でも低下が認められたが、統計学的には有意でなかった。総蛋白質量の低下は 100 mg 投与群の雌でも認められた。100mg 以上投与群の雄及び 300mg 投与群の雌で BUN の増加が認められた。ALT の上昇は雄の 300mg 投与群のみで認められ、AST に変化は認められなかった。また、300mg 投与群の雄でカルシウムの減少が認められた。

尿検査では 300mg 投与群の雄で尿量の増加、雌で pH の低下が認められた。

臓器重量では、100 mg 以上の投与群の雄で肝臓の絶対重量の減少、30 mg 以上投与群の雄で肝臓の相対重量の減少が認められた。雌では 300mg 投与群で腎臓の絶対重量の増加が認められた。

剖検および病理組織学的検査では、100mg 投与群の雌 1 匹で乳房腺がんが認められたが、用量相関性はなく、投与に起因するものではないと考えられた。他に異常は認められなかった。

本試験における NOAEL は 10 mg/kg 体重/日であった。

#### 【イヌを用いた 30 日間亜急性毒性試験】<sup>(10)</sup>

13～17カ月齢のビーグル犬(雌雄各 2 匹/群)を用いた強制経口投与(30、100、300 mg/kg 体重/日;半量ずつ 1 日 2 回投与)による 30 日間の亜急性毒性試験において認められた毒性所見は以下の通りであった。なお、投与はゼラチンカプセルを用いて行い、対照群には乳糖 (300 mg/kg 体重) 入りのカプセルを同様に投与した。

一般的な臨床症状観察では、300 mg 投与群の雌で嘔吐、流涎が認められたが、同用量投与群の雄やその他の群では認められなかった。また、嘔吐、流涎が認められた雌の 1 頭は状態が悪化したため、投与 17 日に試験が打ち切られた。

体重変化では、嘔吐、流涎が認められた 300 mg 投与群の雌で体重減少が認められた。

血液学的検査では、300mg 投与群の雄の 1 頭で Ht の低下が認められた。また、雌の投与群の多くで対照群と比較して異染性好中球の分葉核球存在比の低下が認められたが、個々の動物について投与開始前の値と 28 日後の値を比較したところ有意差は認められなかった。

血液生化学的検査では、300 mg 投与群の雌雄で AST の上昇が認められ、雄では ALT の上昇も認められた。17 日目に試験を打ち切った 300 mg 投与群の雌 1 例においては AP の上昇も認められた。

尿検査には特に異常は認められなかった。

臓器重量では、特に投与に起因した異常は認められなかった。

剖検及び病理組織学的検査では、次の所見が報告された。

肝臓の染色切片の観察で 300mg 投与群の肝細胞に小葉中心性水腫性変性が、電子顕微鏡検査で 100mg 以上投与群の肝細胞にミエリン小体が認められた。肝細胞の小葉中心性水腫性変性は 100mg 投与群でも認められたがその程度はわずかであった。300mg 投与群の雌雄各 1 頭で、胆嚢の粘膜細胞の空胞化が認められた。17 日目に試験を打ち切った雌 1 の例では、胃粘膜にうつ血および微細出血が確認された。30 mg 投与群では著変は認められなかった。

本試験における NOAEL は 30 mg/kg 体重/日であった。

#### 【イヌを用いた 3 ヶ月間亜急性毒性試験】<sup>(17)</sup>

4~6 カ月齢のビーグル犬(雌雄各 5 頭/群)を用いた強制経口投与(4、16、40、160 mg/kg 体重/日)による 3 ヶ月間の亜急性毒性試験において認められた毒性所見は以下の通りであった。なお、投与はゼラチンカプセルを用いて行い、対照群には空のカプセルを同様に投与した。

試験期間中、死亡例は認められなかった。

一般的な臨床症状観察では、40mg 以上投与群の雌雄で流涎、嘔吐が認められた。症状の程度は高用量でより顕著であった。16mg の雄でも 1 週目にのみ嘔吐(2/5)が認められたがそれ以後は同様の症状は認められず、偶発的なものと考えられた。160 mg 投与群の雄では元気消失が認められた。

体重変化、飼料摂取量、眼検査、血液学的検査、尿検査では、投与に起因した異常は認められなかった。

血液生化学的検査では、160 mg 投与群の雌雄で AST、ALT の上昇が認められた。

臓器重量では投与に起因した異常は認められなかった。

剖検では 40mg 投与群(1/5)及び 160mg 投与群(3/5)の雄で小型の前立腺が認められた。

病理組織学的検査では、発生頻度に有意差はなかったが 40mg 以上投与群の雌における胃粘膜の慢性炎症およびリンパ組織過形成の病変の度合いは対照群に比べて重度であった。なお、腫瘍の発生は認められなかった。また、肝細胞及び前立腺の障害を示唆する所見は認められなかった。

本試験における NOAEL は 16 mg/kg 体重/日であった。

#### (3) 慢性毒性試験

慢性毒性試験は実施されていない。

#### (4) 繁殖毒性試験及び催奇形性試験

##### 【ラットを用いた 2 世代繁殖試験】<sup>(18)</sup>

Sprague-Dawley 系ラットを用いた胃挿管による強制経口(100、200、400 mg/kg 体重/日)投与による 2 世代繁殖試験が実施されている。被験物質の投与及び交配は次の要領で実施された。

F<sub>0</sub> 世代では、ピルリマイシン水溶液を雄(30 囚)には交配開始前 60 日から交配終了まで、雌(30 囚)には交配 14 日前から分娩後 21 日まで投与した。分娩後、各腹雌雄 4 匹ずつを無作為に選抜し、21 日までほ育させた。分娩後 21 日に各同腹児から雌雄各 1 匹の F<sub>1</sub> 動物を交配のため選抜した。F<sub>1</sub> 動物には各濃度のピルリマイシン水溶液を離乳時から雄には交配終了まで、雌には分娩後 21 日まで投与した。雌は分娩後 21 日まで F<sub>2</sub> 児動物をほ育させた。

一般的な臨床症状観察では、鼻分泌物が F<sub>0</sub> 世代及び F<sub>1</sub> 世代の 400 mg 投与群の雌雄に、泌尿/生殖器周囲の汚れが F<sub>0</sub> 世代の 200 mg 投与群の雌と 400 mg 投与群の雌雄及び F<sub>1</sub> 世代の 400 mg 投与群の雌で認められた。そのほかに流涎が F<sub>0</sub> 世代の全投与群の雌雄と F<sub>1</sub> 世代の 400 mg 投与群の雌雄にみられたが、毒性的影響というより被験物質投与液の味覚刺激によるものであった。また、体重増加抑制が F<sub>0</sub> および F<sub>1</sub> 世

代の 400 mg 投与群の雄で認められた。剖検および病理組織学的検査では、投与に起因する異常は認められなかった。

発情周期に投与の影響は認められなかつた。妊娠期間の軽度な延長が  $F_0$  世代の 400 mg 投与群で認められたが、 $F_1$  世代では対照群とほぼ同じであつた。着床数は  $F_0$  母動物の 400 mg 投与群では対照群と比較して減少が認められたが、 $F_1$  母動物では対照群とほぼ同じであつた。

$F_1$  及び  $F_2$  新生児の雌雄比、死産児数、着床後死亡数、出生後 0 日の出生児体重については、投与群と対照群の間に差はみられなかつた。

$F_1$  及び  $F_2$  出生児の分娩後 1~21 日の生存率（生存児数）、体重に異常は認められなかつた。 $F_1$  または  $F_2$  の出生時の肉眼的検査で外表に異常は認められず、出生後 0 から 4 日に死亡した出生児について実施した骨格検査においても、投与に起因した異常は認められなかつた。

本試験における NOAEL は 100 mg/kg 体重/日であった。

#### 【ラットを用いた催奇形性試験】<sup>(19)</sup>

Sprague-Dawley 系ラット(24 匹/群)を用いた胃挿管による強制経口 (200、400、800mg/kg 体重/日)投与による催奇形性試験において認められた毒性所見は以下の通りであつた。被験物質の投与は、妊娠 6 日から 15 日の間行つた。

母動物に死亡例は認められなかつた。一般的な臨床症状観察では、400 mg 以上の投与群で軟便、泌尿生殖器周囲の汚れ、投与後の流涎が観察された。体重増加抑制が 800mg 投与群で認められた。また、16-20 日の体重増加が 400mg 以上の投与群で抑制された。

着床数のわずかな低値が 400mg 以上の投与群に、生存胎児数のわずかな低値が 800mg 投与群にみられたが、これらは統計学的に有意ではなく、当該試験実施施設での背景データの範囲内であった。また、吸収胚数の增加が 800mg 投与群で見られたが、偶発的に見られた早期全胚吸收の 1 例を計算から除外すると、対照群と差は認められなくなつた。この他、黄体数、死亡胎児数、胎児体重および性比に投与の影響は認められなかつた。また、胎児の外表、内臓および骨格観察においても奇形や変異の発現率に影響は認められなかつた。

以上の結果から、本試験の母動物に対する NOAEL は 200mg/kg 体重/日であり、胎児に対する NOAEL は 800 mg/kg 体重/日以上であった。

#### 【マウスを用いた催奇形性試験】<sup>(20)</sup>

ICR 系マウス(44 匹<sup>b</sup>/群)を用いた胃挿管による強制経口 (100、400、1600 mg/kg 体重/日)投与による催奇形性試験において認められた毒性所見は以下の通りであつた。被験物質の投与は、妊娠 6 日から 15 日の間行つた。

1600 mg 投与群では下痢あるいは軟便が認められ、試験期間中に 1600mg 投与群の 2 例が死亡し、1 例が瀕死となつたため安樂死処分された。これらの例では、剖検で腸管内に液体の充満が認められた。体重変化にはいずれの投与群にも投与の影響は認められなかつた。

生存胎児体重の減少が 1600 mg 投与群で認められた他には黄体数、着床数、生存胎児数、死亡胎児数、早期または後期吸収胚数、性比に投与の影響は認められなかつた。また、胎児の外表、内臓および骨格観察においても奇形や変異の発現率に影響は認められなかつた。

<sup>b</sup> 当初 24 匹/群で開始されたが、受胎率が低く十分な数の胎児が得られなかつたため、20 匹が追加された。

以上の結果から、本試験の母動物及び胎児動物に対する NOAEL は 400mg/kg 体重/日であった。

#### 【ウサギを用いた催奇形性試験】<sup>(21)</sup>

ニュージーランドホワイト種のウサギ(20匹/群)を用いた胃挿管による強制経口 (0.1、1.0、5.0 mg/kg 体重/日)投与による催奇形性試験において認められた毒性所見は以下の通りであった。被験物質の投与は、妊娠 6 日から 20 日の間行った。

5 mg 投与群で高頻度に流産が発生した(13/19)。1mg 以上投与群で糞便量減少、橙色尿、被毛粗剛が、5 mg 投与群ではさらに赤色排泄物、無糞便、淡褐色便、粘液便、軟便あるいは液状便、乾燥便、限局性脱毛、るい瘦、脱水症、流涙、膣周囲の赤色物が認められた。1mg 投与群では体重増加抑制が認められ、5mg 投与群では体重の減少が認められた。摂餌量は 1mg 以上の投与群で減少した。

剖検では投与に関連した影響は認められなかった。

5 mg 投与群では総吸收胚数及び後期吸收胚数の増加、腹あたり胚吸收率の増加、同胎児数及び生存胎児数の減少が認められた。雌雄を合わせた平均胎児重量及び雌胎児重量は統計学的に有意ではないが、背景データと比較して低値を示していた。この他、黄体数、着床数、雄胎児生存率に投与による影響は認められなかった。

骨格変異及び化骨遅延の発現率の上昇が 5mg 投与群でのみ認められた。観察された変化は、胸椎数増加および腰椎数減少を伴う肋骨数過剰の発現率の増加、前肢指節骨骨化数の減少であった。

以上の結果から、本試験における母動物に対する NOAEL は 0.1mg /kg 体重/日、胎児に対する NOAEL は 1 mg/kg 体重/日であった。

#### (5)遺伝毒性試験

変異原性に関する各種の *in vitro* 及び *in vivo* 試験の結果を次表にまとめた。

#### 【変異原性に関する各種試験の結果一覧】

##### *in vitro* 試験

試験	対象	投与量	結果
Ames 試験	<i>S. typhimurium</i> TA1535, TA1537, TA1538, TA98, TA100	250～2000 µg/plate(±S9)	陰性 <sup>(22)</sup>
	<i>S. typhimurium</i> TA97, TA98, TA100, TA102, TA1535	625～5000 µg/plate(±S9)	陰性 <sup>(23)</sup>
	<i>S. typhimurium</i> TA1537, <i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i>	156～5000 µg/plate(±S9) <sup>1</sup>	陰性 <sup>(24)</sup>
前進突然変異試験	CHL(V79/ <i>Hprt</i> ) <sup>(25)</sup>	0.25, 0.50, 1.00 mg/mL <sup>2</sup> (-S9 ; 2h)	陰性
		0.40, 0.80, 1.60 mg/mL <sup>3</sup> (+S9 ; 2hr)	陰性
	CHO(K1-BH4/ <i>Hprt</i> ) <sup>(26)</sup>	50, 100, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 µg/mL <sup>4</sup> (-S9 ; 5+19hr)	陰性
		50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 µg/mL <sup>5</sup> (+S9 ; 5+19hr)	陰性