

## タイムスタディ調査分析結果

### 調査分析方法

#### 1. 集計対象数

本集計では、調査票の精査ができた41施設68病棟について集計を行った（回復期リハ病棟は除く）。

調査対象者のうち、タイムスタディ調査においてケア時間が著しく逸脱した（3標準偏差から外れるもの）ものは集計対象から除き、2,772件を集計の対象とした。

#### 2. 患者1人1日当たりのケア時間の算出方法

##### 個別ケア時間

看護師、准看護師、看護補助者（介護職）の個別ケア時間

24時間タイムスタディ調査票の患者別個別ケア時間を患者毎に再集計して算出。

医師（非常勤医師含む）、リハスタッフ（PT、OT、ST、MSW）、その他職種（薬剤師、栄養士、その他）

7日間タイムスタディ調査票の患者別個別ケア時間を患者毎に再集計し、1日換算するために7で除して算出。

##### 間接ケア時間

24時間タイムスタディ調査票の「食事・休憩等」時間を除くその他の活動時間については、当該病棟の入院患者数で除して、1人1日の間接ケア時間とした。

また、7日間タイムスタディ調査票のその他の活動時間に該当する「運営・管理」、「その他」の時間については、以下の算出式により計算し、24時間タイムスタディ調査票の間接ケア時間に加算した。

##### 7日間タイムスタディ調査票の

患者1人1日の間接ケア時間 =  $a \times \{ b \div ( b + c + d ) \} \div e \div 7$

a : 「運営・管理」 + 「その他」の時間

b : 当該病棟の「個別ケア時間合計」

c : 「対象病棟以外の入院患者」の時間

d : 「外来患者」の時間


e : 当該病棟の入院患者数

## 患者別ケア時間の集計結果

### 1. 患者 1 人 1 日当たり総ケア時間

入院患者 1 人 1 日当たり総ケア時間（間接ケア + 個別ケア）

（分）



備考) 1. 24時間タイムスタディ調査票の「食事・休憩等」時間を除くその他の活動時間を当該病棟の入院患者数で除して間接ケア時間とした。

また、7日間タイムスタディ調査票のその他の活動時間に該当する「運営・管理」、「その他」の時間については、以下の算出式により計算し、上記間接ケア時間に加算した。


7日間タイムスタディ調査票の

$$\text{間接ケア時間} = \frac{a \times b \div (b + c + d) \div e \div 7}$$

- a : 「運営・管理」 + 「その他」の時間
- b : 「個別ケア時間合計」
- c : 「対象病棟以外の入院患者」の時間
- d : 「外来患者」の時間
- e : 当該病棟の患者数

2. 医師、看護師、准看護師、看護補助者（介護職）、リハスタッフ（PT、OT、ST、MSW）、その他職種（薬剤師、栄養士、その他）のケア時間の総和を個別ケア時間とした。


2. 入院患者1人1日当たり職種別個別ケア時間



備考) 1. 医師は、非常勤医師を含む。リハスタッフは、PT、OT、ST、MSWである。  
 その他職種は、薬剤師、栄養士、その他の職種とした。

### 3. 入院患者1人1日当たり職種別重み付け個別ケア時間

#### 入院患者1人1日当たり職種別重み付け個別ケア時間



備考) 1. 各病院の職種別の人件費から、看護師の平均給与を1.0とした給与指数を計算し、個別ケア時間に相対的な給与指数を乗じた重み付け平均ケア時間を算出した。

	相対比
医師	2.94
看護師	1.00
准看護師	0.84
看護補助者	0.59
リハスタッフ	0.84
その他職種	0.93

#### 4. 入浴方法別の入浴時間

### 入浴方法別の入浴時間


単位：分

入浴方法	1回の入浴時間	1週間(7日間)の入浴回数	1日当たり入浴時間
特浴	36.6	2.3	11.8
介助浴	34.4	2.8	13.8
自立	26.9	2.2	8.5
清拭他	0.0	-	0.0

備考) 患者の個別ケア時間のうち入浴時間については、患者の入浴方法に応じて「1日当たり入浴時間」を賦課した。

## 患者属性別ケア時間の分析結果

### 1. ADL ( 1)(全項目版)



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
ADL 0-10	338	100.6	90.6	26.9	289.9	44.5
ADL 11-20	211	130.5	118.2	45.2	315.4	50.6
ADL 21-30	241	144.8	132.8	57.8	369.2	53.6
ADL 31-40	348	158.2	146.9	57.1	384.4	56.7
ADL 41-50	1,339	159.3	150.8	45.8	386.1	52.6
ADL 51-	290	172.2	161.7	40.6	348.8	62.2
合計	2,767	149.9	141.4	26.9	386.1	57.1


#### <カテゴリ>

以下のaからhの各項目について、評価点数を単純合計した。(「自立=0点」から「全面依存=

6点)、「本動作は1回もなかった=8点」)

- a. ベッド上の可動性
- b. 移乗
- c. 病棟(ユニット)の中での移動
- d. 更衣
- e. 個人衛生
- f. 食事
- g. トイレの使用
- h. 入浴

## 2. ADL (V1) ADLを4項目とした場合(健保連版)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
ADL 0-4	411	104.0	94.1	26.9	315.4	46.2
ADL 5-8	226	138.8	128.8	47.4	384.4	54.2
ADL 9-12	296	155.1	140.9	57.1	380.5	57.8
ADL 13-16	501	152.7	144.2	60.8	376.2	50.9
ADL 17-18	1,335	163.7	154.2	40.6	386.1	55.1
合計	2,769	149.9	141.4	26.9	386.1	57.1

### <カテゴリ>

ADL得点は、「a ベッド上の可動性」、「b 移乗」、「f 食事」、「g トイレの使用」の4項目から計算した。各評価点については、「急性期以外の入院医療の支払いに関する調査研究」(平成16年3月健康保組合連合会)の報告書に準拠した。

### 3. ADL ( 1 ) ADLを4項目とした場合(日医版)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
ADL 0-5	470	107.8	96.7	26.9	315.4	48.3
ADL 6-10	200	137.8	130.7	57.8	288.2	49.1
ADL 11-15	260	157.4	142.3	57.1	384.4	59.0
ADL 16-20	460	151.9	142.4	60.8	376.2	51.2
ADL 21-24	1,379	163.9	154.2	40.6	386.1	55.3
合計	2,769	149.9	141.4	26.9	386.1	57.1

#### <カテゴリ>

ADL得点は、「a ベッド上の可動性」、「b 移乗」、「f 食事」、「g トイレの使用」の4項目から計算し、各評価点を単純合計した(「本動作は1回もなかった」は6点に置き換えた)。


「長期療養者に対する新しい支払方式」に関する調査研究(平成15年1月 日本医師会総合政策研究機構)の報告書に準拠した。

#### 4. 要介護（I 5）



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
自立	1	66.2	66.2	66.2	66.2	.
要支援	28	131.4	135.1	37.4	282.7	57.5
要介護1	157	109.6	96.1	39.4	384.1	53.9
要介護2	184	135.2	120.8	45.1	384.4	58.8
要介護3	320	142.9	133.9	47.1	327.4	51.2
要介護4	565	156.4	147.1	45.7	380.5	55.7
要介護5	935	160.0	148.9	44.2	386.1	55.5
合計	2,190	150.5	141.4	37.4	386.1	56.9

## 5 . C P S ( 認知機能尺度 )



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
CPS0	345	122.3	113.4	37.4	369.2	53.6
CPS1	212	138.2	125.7	45.4	325.4	61.4
CPS2	245	140.3	129.7	26.9	384.1	60.7
CPS3	337	145.8	134.7	35.7	384.4	53.8
CPS4	400	153.5	143.7	44.2	386.1	58.1
CPS5	211	158.9	148.1	70.4	380.5	53.6
CPS6	650	161.0	149.2	45.8	364.7	54.4
合計	2,400	147.7	138.2	26.9	386.1	57.5

### < カテゴリ >

C P S の分類方法は、「急性期以外の入院医療の支払いに関する調査研究」(平成 16 年 3 月健康保組合連合会)の報告書に準拠した。

C P S 0 : 障害無し

C P S 1 : 境界的である

C P S 2 : 軽度の障害がある


C P S 3 : 中程度の障害がある

C P S 4 : やや重度の障害がある

C P S 5 : 重度の障害がある

C P S 6 : 最重度の障害がある

## 6. 日常の意思決定を行うための認知能力 ( 3 )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
自立	404	126.7	115.7	37.4	372.8	57.9
限定的な自立	378	137.3	126.6	26.9	384.1	59.9
軽度の障害	268	145.6	132.5	35.7	386.1	58.6
中程度の障害	506	152.4	144.0	44.2	384.4	54.6
重度の障害	855	160.9	149.1	45.8	380.5	54.5
合計	2,411	148.0	138.4	26.9	386.1	57.8

### <カテゴリ>

0. 自立：首尾一貫して理にかなった判断ができる
1. 限定的な自立：新しい事態に直面した時にのみいくらかの困難がある。たとえば、普段は問題ないが、新しい検査を受けるときに指示に従えない、混乱するなど
2. 軽度の障害：特別な状況において、判断力が弱く、合図や見守りが必要である。たとえば、普段は問題ないが、検査時は常に混乱するなど
3. 中程度の障害：普段から判断力が弱く、合図や見守りが必要である
4. 重度の障害：判断できないか、まれにしか判断できない

## 7. せん妄の兆候・混乱した意思・意識 ( 4 )



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,349	147.4	137.9	26.9	386.1	57.6
有	52	174.2	174.8	80.7	325.7	61.1
合計	2,401	147.9	138.4	26.9	386.1	57.8


### < カテゴリ >

有：以下の a から f の 6 項目において「この 7 日間は通常の状態と異なる = 2」に該当した項目が 1 個以上ある場合。

無：上記以外の場合。

- 注意がそらされやすい(たとえば、集中力がない、話がそれる<sub>a</sub>)
- 周囲の環境に関する認識が変化する(たとえば、その場にいない人に話をしたり唇を動かす、自分をどこか別の場所にいると思ひこむ、昼夜の混乱)
- 支離滅裂な会話が時々ある(たとえば、話していることが一貫しない、無意味である、見当違い、話題が飛ぶ、思考が散漫)
- 落ち着きがない(たとえば、皮膚や服、ナプキンなどをいじったり、ひっぱる、居場所をよく変える、身体を動かし続ける、叫び続ける)
- 無気力(たとえば、動作が鈍い、宙を見ている、なかなか奮起しない、身体の動きが少ない)
- 認知能力が 1 日の中で変動する(たとえば、時々良かったり、悪かったり、身体の動きが少ない)

## 8. 意識障害者である ( 1 )



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
NO	2,314	147.2	137.7	26.9	386.1	57.5
YES	454	163.2	158.8	40.6	340.2	52.5
合計	2,768	149.8	141.3	26.9	386.1	57.0


### <カテゴリ>

JCS - 3以上またはGCS 8点以下の状態、無動症の状態。

0. 意識障害者ではない = NO

1. 意識障害者である = YES

9 - 1 . 問題行動 4 項目 ( 徘徊、暴言、暴行、不適切な行為 ): 1 日みられた ( 2 a d )



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,071	146.4	136.8	26.9	386.1	57.3
有	365	158.7	150.8	47.4	384.4	57.8
合計	2,436	148.2	139.0	26.9	386.1	57.5


< カテゴリ >

有：以下の a から d の 4 項目において「1 日みられた」又は「2 日みられた」、「毎日みられた」のいずれかに該当する項目が 1 個以上ある場合。

無：上記以外の場合。

- a. 徘徊
- b. 暴言
- c. 暴行
- d. 社会的に不適切な行為

9 - 2 . 問題行動 4 項目 ( 徘徊、暴言、暴行、不適切な行為 ) : 2 日みられた ( 2 a - d )



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,186	146.4	136.9	26.9	386.1	57.0
有	250	164.7	155.7	47.4	384.4	59.0
合計	2,436	148.2	139.0	26.9	386.1	57.5


< カテゴリ >

有：以下の a から d の 4 項目において「2日みられた」又は「毎日みられた」のいずれかに該当する項目が 1 個以上ある場合。

無：上記以外の場合。

- a. 徘徊
- b. 暴言
- c. 暴行
- d. 社会的に不適切な行為

9 - 3 .問題行動4項目(徘徊、暴言、暴行、不適切な行為): 毎日みられた( 2a-d)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,224	146.6	136.9	26.9	386.1	57.2
有	212	165.4	160.4	47.4	364.7	57.7
合計	2,436	148.2	139.0	26.9	386.1	57.5

< カテゴリ >

有：以下の a から d の 4 項目において「毎日みられた」に該当する項目が 1 個以上ある場合。  
 無：上記以外の場合。

- a. 徘徊
- b. 暴言
- c. 暴行
- d. 社会的に不適切な行為

## 9 - 4 . 問題行動：ケアに対する抵抗（服薬、注射、ADL 介助、食事を拒否）（ 2e）




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
このような行動はなかった	2,175	145.7	136.4	26.9	386.1	56.7
一日見られた	101	165.9	154.0	58.5	364.7	62.1
二日見られた	34	161.4	152.3	73.4	288.2	61.2
毎日見られた	128	172.8	161.7	44.2	384.4	57.6
合計	2,438	148.2	139.0	26.9	386.1	57.4

### < カテゴリ >

過去3日間で「このような行動はなかった = 0点」、「1日みられた = 1点」、「2日みられた = 2点」、「毎日みられた = 3点」に分類して集計している。

9 - 5 . 問題行動 5 項目 ( 徘徊、暴言、暴行、不適切な行為 ): 1 日みられた ( 2 a e )



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	1,951	145.1	135.8	26.9	386.1	56.8
有	483	160.7	151.5	44.2	384.4	58.5
合計	2,434	148.2	139.0	26.9	386.1	57.5

< カテゴリ >


有：以下の a から e の 5 項目において「1日みられた」又は「2日みられた」、「毎日みられた」のいずれかに該当する項目が 1 個以上ある場合。

無：上記以外の場合。

- a. 徘徊
- b. 暴言
- c. 暴行
- d. 社会的に不適切な行為
- e. ケアに対する抵抗

a

9 - 6 . 問題行動 5 項目 ( 徘徊、暴言、暴行、不適切な行為 ): 2 日みられた ( 2 a e )



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,110	145.6	136.3	26.9	386.1	57.0
有	324	165.2	155.9	44.2	384.4	57.9
合計	2,434	148.2	139.0	26.9	386.1	57.5


< カテゴリ >

有：以下の a から e の 5 項目において「2日みられた」又は「毎日みられた」のいずれかに該当する項目が 1 個以上ある場合。

無：上記以外の場合。

- a. 徘徊
- b. 暴言
- c. 暴行
- d. 社会的に不適切な行為
- e. ケアに対する抵抗

9 - 7 . 問題行動 5 項目 ( 徘徊、暴言、暴行、不適切な行為 ): 毎日みられた ( 2 a e )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,159	145.8	136.4	26.9	386.1	56.9
有	275	167.0	161.4	44.2	384.4	58.5
合計	2,434	148.2	139.0	26.9	386.1	57.5

< カテゴリ >

有：以下の a から e の 5 項目において「毎日みられた」に該当する項目が 1 個以上ある場合。  
 無：上記以外の場合。

- a. 徘徊
- b. 暴言
- c. 暴行
- d. 社会的に不適切な行為
- e. ケアに対する抵抗

### 10 - 1 . その他の骨折 ( 1 h )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,686	149.4	140.6	26.9	386.1	56.8
有	86	165.6	157.4	51.2	376.2	64.2
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

#### < カテゴリ >

疾患名にその他の骨折の記載がある患者が否かで集計。

## 10 - 2 . 脳出血 ( 1 m )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,332	149.1	140.4	26.9	386.1	57.4
有	440	154.3	145.1	45.7	354.7	55.3
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

### < カテゴリ >

疾患名に脳出血の記載がある患者が否かで集計。

### 10 - 3 . 片側不全麻痺 / 片麻痺 ( 10 )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,345	149.4	140.5	26.9	386.1	57.7
有	427	152.5	144.4	47.1	336.2	53.6
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

#### < カテゴリ >

疾患名に片側不全麻痺 / 片麻痺の記載がある患者か否かで集計。

#### 10 - 4 . パーキンソン病関連疾患 ( 1 q )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,618	148.6	139.9	26.9	386.1	56.3
有	154	172.3	165.7	45.7	384.4	65.2
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

#### < カテゴリ >

疾患名にパーキンソン病関連疾患の記載がある患者か否かで集計。

10-4-1. パーキンソン病関連疾患 ( 1 q )( A D L ( 健保連版 ) スコア 17・18 のみ )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	1,247	162.9	153.1	40.6	386.1	54.5
有	88	176.1	167.4	45.7	342.2	62.6
合計	1,335	163.7	154.2	40.6	386.1	55.1

< カテゴリ >

A D L 得点 ( 健保連版 ) が 17-18 点の患者で、且つ、疾患名にパーキンソン病関連疾患の記載がある患者か否かで集計。

## 10 - 5 . その他の神経難病 ( 1 s )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,730	149.6	141.0	26.9	386.1	56.9
有	42	168.9	153.7	73.2	384.1	67.8
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

### < カテゴリ >

疾患名にその他の神経難病の記載がある患者か否かで集計。

## 10 - 6 . 脊髄損傷 ( 1 u )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,733	149.8	140.8	26.9	384.4	57.1
有	39	159.0	152.4	83.2	386.1	54.3
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

### < カテゴリ >

疾患名に脊髄損傷の記載がある患者か否かで集計。

11-1. 胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置 ( 1c )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,334	148.5	140.2	26.9	384.4	57.1
有	438	157.6	145.6	56.8	386.1	56.4
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

< カテゴリ >

過去7日間に胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置が実施されたか否かで集計。

11-1-1. 胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置 ( 1c )(ADL(健保連版) スコア17・18のみ)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	942	166.1	156.9	40.6	384.1	54.8
有	393	158.0	145.7	58.5	386.1	55.7
合計	1,335	163.7	154.2	40.6	386.1	55.1

< カテゴリ >

ADL得点(健保連版)が17-18点の患者で、且つ、過去7日間に胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置が実施されたか否かで集計。

## 11 - 2 . 酸素療法 ( 1 e )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,587	147.3	139.2	26.9	384.4	54.6
有	185	187.0	184.1	40.6	386.1	76.2
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

### < カテゴリ >

過去7日間に酸素療法が実施されたか否かで集計。

11-2-1. 酸素療法 ( 1 e )( A D L ( 健保連版 ) スコア 17・18 のみ )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	1,193	159.7	151.5	58.5	384.1	50.7
有	142	197.6	191.4	40.6	386.1	75.8
合計	1,335	163.7	154.2	40.6	386.1	55.1

< カテゴリ >

A D L 得点 ( 健保連版 ) が 17-18 点の患者で、且つ、過去 7 日間に酸素療法が実施されたか否かで集計。

### 11 - 3 . 吸引 ( 1日8回以上)( 1g )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,431	146.2	136.9	26.9	386.1	56.1
有	341	176.5	167.9	37.4	384.1	57.1
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

#### < カテゴリ >

過去7日間に吸引(1日8回以上)が実施されたか否かで集計。

11-3-1. 吸引(1日8回以上)( 1g)(ADL(健保連版)スコア17・18のみ)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	1,007	159.1	149.4	44.2	386.1	53.8
有	328	178.0	168.7	40.6	384.1	56.9
合計	1,335	163.7	154.2	40.6	386.1	55.1

< カテゴリ >

ADL得点(健保連版)が17-18点の患者で、且つ、過去7日間に吸引(1日8回以上)が実施されたか否かで集計。

#### 11-4. 吸引(1日1~7回)( 1h)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,412	147.6	138.8	26.9	384.4	56.8
有	360	165.3	154.9	57.2	386.1	56.8
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

#### < カテゴリ >

過去7日間に吸引(1日1~7回)が実施されたか否かで集計。

11-4-1. 吸引(1日1~7回)(1h)(ADL(健保連版)スコア17・18のみ)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	1,011	163.9	154.5	40.6	384.1	55.2
有	324	163.2	152.5	58.5	386.1	55.0
合計	1,335	163.7	154.2	40.6	386.1	55.1

< カテゴリ >

ADL得点(健保連版)が17-18点の患者で、且つ、過去7日間に吸引(1日1~7回)が実施されたか否かで集計。

11 - 5 . 気管切開口・気管内挿管のケア ( 1 i )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,601	148.5	139.1	26.9	386.1	56.7
有	171	171.3	160.5	37.4	340.7	59.6
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

< カテゴリ >

過去7日間に気管切開口・気管内挿管のケアが実施されたか否かで集計。

11-5-1. 気管切開口・気管内挿管のケア ( 1 i )( A D L (健保連版)スコア 17・18のみ)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	1,175	162.3	152.9	44.2	386.1	54.6
有	160	174.0	161.7	40.6	340.7	57.8
合計	1,335	163.7	154.2	40.6	386.1	55.1

< カテゴリ >

A D L 得点 (健保連版) が 17-18 点の患者で、且つ、過去 7 日間に気管切開口・気管内挿管のケアが実施されたか否かで集計。

## 11-6. レスピレーター ( 1k )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,758	149.8	141.1	26.9	386.1	56.9
有	14	172.9	188.7	37.4	334.1	92.8
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

### < カテゴリ >

過去7日間にレスピレーターの使用があったか否かで集計。

11-6-1. レスピレーター( 1k )(ADL(健保連版)スコア17・18のみ)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	1,323	163.5	153.8	44.2	386.1	54.8
有	12	193.6	197.3	40.6	334.1	83.0
合計	1,335	163.7	154.2	40.6	386.1	55.1

< カテゴリ >

ADL得点(健保連版)が17-18点の患者で、且つ、過去7日間にレスピレーターの使用があったか否かで集計。

## 12. 2度以上の褥瘡の有無 ( 2 a )




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,587	148.4	139.8	26.9	386.1	56.5
有	185	170.6	157.5	40.6	338.2	62.1
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

### < カテゴリ >

過去3日間で褥瘡が第2度以上であるか否かで集計。

12 - 1 . 2度以上の褥瘡の有無 ( 2 a )( A D L (健保連版)スコア17・18のみ)




カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	1,190	162.5	153.1	44.2	386.1	54.2
有	145	173.5	160.7	40.6	338.2	61.6
合計	1,335	163.7	154.2	40.6	386.1	55.1

< カテゴリ >

A D L 得点 (健保連版) が 17-18 点の患者で、且つ、過去 3 日間で褥瘡が第 2 度以上であるか否かで集計。

### 13. 中心静脈栄養 ( 2 a )



カテゴリ	度数(件)	平均値(分)	中央値(分)	最小値(分)	最大値(分)	標準偏差
無	2,715	149.3	140.8	26.9	386.1	56.4
有	57	176.7	164.7	40.6	342.2	80.1
合計	2,772	149.9	141.3	26.9	386.1	57.1

#### < カテゴリ >

過去3日間で栄養摂取の方法として中心静脈栄養が使用されたか否かで集計。