

結 論

目的に示した以下の2項目について、解析した結果をまとめる。

- 1) 手術数と手術成績の関連の有無を調べる。
- 2) 施設間に存在する手術成績のバラツキを調べる。

今回の解析では個々の患者重症度などの調整を行っていない。そのため、得られた結果は証拠として弱く、また結果の解釈も慎重に行われるべきであることを最初に注意する。

一つ目の検討では、相関係数や変動係数の観点からは、手術数と成績に相関はなく、成績は大きくばらついていることがわかった。(結果1)

ロジスティック回帰分析では手術数と死亡率の関連性が示唆された。(結果3)

しかしながら、この結果は「手術数が多いから成績が良い」もしくは「成績が良いから手術数が多い」という因果の方向性までを判断するものではない。また、有意性は解析対象施設の数にも依存するため、p 値によって結論付けるのではなく、推定された相関係数やオッズ比の大きさ、重大さを臨床的に吟味すべきである。

二つ目の検討では、死亡率は施設間でばらついており、手術成績は病変枝数と手術数では説明しきれないことが示された。(結果4)【添付資料 remark 5】

よって、手術数が少なくても成績の良い施設が多く存在することが検証された。(結果2)
また本結果は、考慮すべき説明因子の探索と追加の必要性を示している。

相関係数

病変枝数: 1枝

要約統計量						
	標本数	平均値	標準偏差	合計	最小値	最大値
手術数	556	3.11511	3.95211	1732	0	34
死亡率	392	0.01435	0.09233	5.6239	0	1
在院死亡率	392	0.01621	0.09428	6.3541	0	1

1段目) Pearson の相関係数			
2段目) 帰無仮説 $\rho=0$ に対する $\text{Prob} > r $			
3段目) 標本数 (N)			
	手術数	死亡率	在院死亡率
手術数	1	-0.07421	-0.06749
	556	0.1425	0.1824
死亡数	-0.07421	1	0.68249
	0.1425	<.0001	392
在院死亡数	-0.06749	0.68249	1
	0.1824	<.0001	392
	392	392	392

病変枝数: 2枝

要約統計量						
	標本数	平均値	標準偏差	合計	最小値	最大値
手術数	556	6.98561	7.22955	3884	0	47
死亡率	446	0.00764	0.04191	3.4089	0	0.5
在院死亡率	446	0.01092	0.05323	4.8711	0	0.75

1段目) Pearson の相関係数			
2段目) 帰無仮説 $\rho=0$ に対する $\text{Prob} > r $			
3段目) 標本数 (N)			
	手術数	死亡率	在院死亡率
手術数	1	-0.00519	-0.00846
	556	0.9129	0.8585
死亡数	-0.00519	1	0.88363
	0.9129	<.0001	446
在院死亡数	-0.00846	0.88363	1
	0.8585	<.0001	446
	446	446	446

病変枝数：3枝

要約統計量						
	標本数	平均値	標準偏差	合計	最小値	最大値
手術数	556	13.9928	16.53432	7780	0	120
死亡率	466	0.0148	0.05384	6.8976	0	0.5
在院死亡率	466	0.01941	0.05941	9.0439	0	0.5

1段目) Pearson の相関係数 2段目) 帰無仮説 Rho=0 に対する Prob > r 3段目) 標本数 (N)			
	手術数	死亡率	在院死亡率
手術数	1	-0.06947	-0.06043
		0.1343	0.1928
死亡数	556	466	466
		1	0.87772
在院死亡数	-0.06947		<.0001
	0.1343	466	466
手術数	466	466	1
		0.87772	
死亡数	-0.06043	<.0001	
	0.1928	466	466
在院死亡数	466	466	466

病変枝数：LMT

要約統計量						
	標本数	平均値	標準偏差	合計	最小値	最大値
手術数	556	7.18705	10.06506	3996	0	92
死亡率	403	0.01498	0.08011	6.0359	0	1
在院死亡率	403	0.01977	0.08588	7.9654	0	1

1段目) Pearson の相関係数 2段目) 帰無仮説 Rho=0 に対する Prob > r 3段目) 標本数 (N)			
	手術数	死亡率	在院死亡率
手術数	1	-0.03466	-0.03269
		0.4878	0.5129
死亡数	556	403	403
		1	0.87323
在院死亡数	-0.03466		<.0001
	0.4878	403	403
手術数	403	403	1
		0.87323	
死亡数	-0.03269	<.0001	
	0.5129	403	403
在院死亡数	403	403	403

病変枝数：川崎病

要約統計量						
変数	標本数	平均値	標準偏差	合計	最小値	最大値
手術数	556	0.04676	0.29034	26	0	3
死亡率	18	0	0	0	0	0
在院死亡率	18	0	0	0	0	0

1段目) Pearson の相関係数 2段目) 帰無仮説 Rho=0 に対する Prob > r 3段目) 標本数 (N)			
	手術数	死亡率	在院死亡率
手術数	1	.	.
	556	18	18
死亡率	.	.	.
	18	18	18
在院死亡率	.	.	.
	18	18	18

総数

要約統計量						
変数	標本数	平均値	標準偏差	合計	最小値	最大値
手術数	556	31.3273	32.23692	17418	0	244
死亡率	481	0.01257	0.03175	6.0477	0	0.375
在院死亡率	481	0.0169	0.03833	8.1303	0	0.5

Pearson の相関係数 帰無仮説 Rho=0 に対する Prob > r 標本数 (N)			
	手術数	死亡率	在院死亡率
手術数	1	0.08611	0.07713
	556	0.0592	0.0911
死亡率	-0.08611	1	0.84661
	481	0.0592	<.0001
在院死亡率	-0.07713	0.84661	1
	481	0.0911	<.0001
		481	481

外科系学会社会保険委員会連合（外保連）

手術委員会委員長

山口俊晴先生

平成17年5月19日

日本胸部外科学会理事長

小林 紘一

日本呼吸器外科学会副会長

日本胸部外科学会理事・診療問題委員

長田博昭

前略

かねてご依頼頂いて居りました、

「呼吸器外科領域に於ける施設基準（手術症例数とアウトカム）の調査結果」
に関し、以下にご報告を申し上げます。

目的：

既に所有の、信頼の置けるデータを解析し、診療施設の手術症例数とその成績との間の
関係を抽出、いわゆる「施設基準」に根拠が伺えるか否かを検討する。

対象と方法：

次の二つのデータを対象とした。

- 1 日本胸部外科学会の学術委員会の「年次調査」の原発性肺癌に関するデータ
2000年度～2003年度までの4年分
540施設（例年全国の約94-95%の回答率）
肺癌の手術年平均例数 18,055例
術式別の手術例数とその周術期死亡数とが施設毎に記載されている。
- 2 日本呼吸器外科学会の「肺癌の生存率に関する平成8年度学術委員会調査」
1989年度の認定126施設の内91施設（72.2%）からの手術例3,643例
施設毎に全例の術後5年間の観察経過が記載されている。

これらはいずれもリスク調整のためのデータとして集められてはいない。前者から4年
間の周術期死亡率（30日死亡率、在院死亡率）を算出、後者から実測5年生存率を算出、
施設毎の粗データに対して変動調整を行った上で、Poisson 回帰モデル、又は Logistic 回

帰モデルによる解析を行い、施設毎の手術症例数と死亡率・5年生存率の間の相関を検討した。

結果：

1 手術症例数と周術期死亡率との関係

変動調整平均周術期死亡率は

30日死亡	0.44%
在院死亡	0.95%
周術期合計死亡	1.51%

となり、それぞれの Pearson の相関係数に対する検定で p 値は 5% 以上となり、手術症例数との間に有意な相関を見なかった。

術式別にこれを見た処、

	肺葉切除術	全摘除術
30日死亡	0.42%	1.46%
在院死亡	0.91%	3.79%
総周術期死亡	1.45%	4.82%

となり、何れに於いても有意な相関はなかった。しかし症例数を階層化して比較すると

	オッズ比	p 値
24例以下	1.830	<0.0001
25~49以下	1.334	0.2895
50~99以下	1.311	0.4405
100以上	1.000	—

となって、100例以上の肺癌手術症例を行っている施設に対して24例以下に留まる施設の死亡率は有意に高いと判定された。これは肺葉切除、全摘除術に分けても同様の結果となった。

2 手術症例数と術後5年生存率との関係

この調査に基いた全国 of 患者数を分母とする overall の5年生存率は47.2%と既に報告されている。(日本呼吸器外科学会雑誌)

各施設の手術症例数と生存率との相関を、変動調整標準化死亡比で検定すると

Pearson の相関係数は-0.1076

無帰仮説：相関係数=0 に対する p 値は 0.333

となり、有意な相関はなかった。

手術症例数の階層別に見ると、

	標準死亡比 のハザード比	p 値
19 例以下	1.5589	0.0482
20～29 以下	1.2556	0.3206
30～49 以下	1.3268	0.1944
50～79 以下	1.2607	0.2886
80 以上	1.000	—

となり、19 例以下の施設の術後死亡率が 80 例以上の施設のそれに比べて有意に高く、従って生存率は有意に低いと判定されたが、中間の症例数の施設では 80 例以上の施設に比べ、有意差はなかった。但し、術式別に分けて比較すると、肺葉切除では施設間有意差はなく、全摘除術に於いてのみ 19 例以下と 80 例以上との間に有意差があり、後者によって生存率の押し下げがあるものと思われた。

しかし、80 例以上の施設の数少なく、それらに於ける肺癌病期 I 期の比率は比較的高く、術後の患者 follow-up の比率も高いのに対し、それ以下の施設ではその I 期比率の低い処が少なくなく、術後 follow-up から脱落する患者が多くなる傾向にあった。脱落例は死亡と扱われる。従って 80 例以上の施設の成績は相対的に良い（生存率が高い）傾向を示す可能性があり、これを基準に症例数の少ない施設の成績を比較することの妥当性は明らかではなかった。

3 比較・考察

近年、肺癌手術に於ける周術期死亡率は 3.3%(Ginsberg et al, 1983)とされ、近年でも米国の教科書 (Pearson, Cooper: Thoracic Surgery, 2002) では全摘除術で 6-7%、肺葉切除では 2%以下とされ、同教科書で日本の好成績が特記され、全摘で 3.2%、肺葉切除で 1.2%(Wada 1998)と引用されている。New York 州に於ける調査として最も近く公表された肺葉切除の周術期死亡率は 1.86%(Hannan et al: Surgery 2002)である。今回計上した肺癌手術に於ける周術期合計死亡率は上記の如く 1.51%で、肺葉切除、全摘除共世界の標準を十分にクリアーしている。その上、施設症例数との有意相関はなく、僅かに上位数の施設に対して再下位症例数群 (25 例未満) のみが統計上有意に高くなった。

又、肺切除後の肺癌患者5年生存率に関しても、本邦の成績が世界のトップレベルにある事は周知の処であるが、それ自体も更に向上を示している。今回データ条件から解析対象としたやや古い1989年度症例に関する実測5年生存率ですら overall での十分比肩する成績であったが、施設間に症例数に対して有意相関はなかった。但し死亡率に関すると同様に20例未満の施設は80例以上の施設に比べると優位に生存率が低かった。

4 結論：

リスク調整を施さないデータに変動調整を施したものに基き、本邦での肺癌手術の成績を個々の施設の手術数に対して比較検討した処、周術期死亡率及び術後5年生存率について、いずれも全体での有意な相関はなかった。症例数を階層化して症例数の最も多い施設群に対して最も少ない施設群の成績を比較した処、症例数の少ない群で死亡率は高く5年生存率は低くなったが、基準とした症例数の多い群ではI期症例の比率が比較的高く、術後の患者追跡も完全であるため、その成績が高くである傾向が伺え、少数例の施設の成績が「劣る」のか否かは、今後症例の完全なリスク調整を行ったデータを基に分析しない限り即断はできない。

以上

外保連手術委員会

山口委員長先生御机下

謹啓。

2004 年度に行った施設基準アンケート結果（施設基準とアウトカムに関する調査）について報告させていただきます。

日本整形外科学会認定研修施設約 2300 施設にアンケートを送付し、ほぼ 50% の 1151 施設より回答を得ました。

施設基準となっている術式のうち、統計的比較が可能と思われる手術件数の術式は治療成績の比較（術後に改善と術後に不変もしくは悪化で比較）、件数の少ない術式は、手術件数のみ（施設基準の手術件数を行っている施設とみたくない施設数で記載）を提示しております。

人工関節（膝関節）置換術、膝前十字靭帯断裂形成術、観血的関節受動術は施設基準を満たす施設と満たさない施設で治療成績に統計的有意差はみられませんでした。人工関節（股関節）置換術では、施設基準を満たす施設が $P < 0,001$ で、有意差をもって治療成績に差がでました。

件数の少ない術式については、年間手術件数が施設基準で定められた件数以上を行っていた施設の比率は 5.0~23.1%でした。（なお、悪性骨腫瘍手術、脊椎骨盤悪性腫瘍については、原発性腫瘍のみではなく、癌の骨転移が含まれている可能性があります）。

以上、報告申し上げます。

どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

敬具

日本整形外科学会（東邦大学整形外科）

土谷一晃

施設基準に関する調査

回答件数=1,151

人工関節置換術（膝関節）

実施医療機関数=956

両者間に統計的有意差はなかった

	50件以上		49件以下	
医療機関数	88		868	
手術例数（件）	7,120		12,481	
改善（例／全症例に対する％）	7,038	98.8%	12,321	98.7%
不変・悪化（例／全症例に対する％）	82	1.2%	160	1.3%

人工関節置換術（股関節）

実施医療機関数=901

改善の平均値は差はないが、カイ2乗検定で、50例以上の施設が $p < 0.001$ で有意差をもって改善率がよいという結果であった。

	50件以上		49件以下	
医療機関数	85		816	
手術例数（件）	7,578		9,386	
改善（例／全症例に対する％）	7,558	99.7%	9,227	98.3%
不変・悪化（例／全症例に対する％）	20	0.3%	159	1.7%

膝前十字靭帯断裂形成術（鏡視下手術を含む）

実施医療機関数＝589

両者間に統計的有意差はなかった

	10件以上		9件以下	
医療機関数	181		408	
手術例数（件）	5,272		1,304	
改善（例／全症例に対する％）	5,172	98.1%	1,289	98.8%
不変・悪化（例／全症例に対する％）	100	1.9%	15	1.2%

観血的関節授動術（部位問わずtotalの件数）

実施医療機関数＝514

両者間に統計的有意差はなかった

	10件以上		9件以下	
医療機関数	57		457	
手術例数（件）	1,049		1,159	
改善（例／全症例に対する％）	981	93.5%	1,070	92.3%
不変・悪化（例／全症例に対する％）	68	6.5%	89	7.7%

その他術式の年間手術件数（合計）

回答件数＝1,151

内反足手術	指移植術	母指化手術	悪性骨腫瘍手術	脊椎骨盤悪性腫瘍
545	211	92	959	708