

<添付文書の例>

第18回厚生科学審議会

医薬品販売制度改革検討部会

参考

平成17年9月29日

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

慢性便秘の方にも

〈便秘薬〉

胃でとけずに腸で効く便秘薬

◆は、有効成分が胃でとけずに腸で効くよう、5層コートをほどこした便秘薬です。慢性便秘にも効果をあらわし、残便感のないスッキリとした効きめです。

◆おやすみ前に服用すれば翌朝(個人差はありますが、目安として6~11時間後)には効果があらわれます。

使用上の注意

(X) してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の薬下薬(下剤)
- 大量に服用しないこと

(+) 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 次の症状のある人。
はげしい腹痛、恶心・嘔吐
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、恶心・嘔吐
 - 1週間位服用しても症状がよくならない場合。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

慢性便秘、常習性便秘

通常、大人は1日1回2錠を就寝前または、排便期待数時間前に、かまことに服用してください。

[注意]

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- なるべく空腹時に服用してください。
- 制酸剤[†]や牛乳をのんでから1時間以内の服用はさけてください。(本剤は制酸剤や牛乳によって胃内で溶解し、期待された効果を発揮できないことがあります)
†制酸剤：多くの胃薬に含まれている成分で、胃酸を中和する働きをもつ。




制酸剤や牛乳をのんでから1時間以内の服用はさけてください

- 錠剤をかんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。(本剤は有効成分がその能力を十分に発揮し、大腸内で作用するよう特殊なコーティングをほどこしています)

(5)錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をご覧ください。四

2錠中

成 分

分 量

はたらき

ビサコジル
(2-(4,4'-ジアセトキシジフェニルメチル)ピリジン)


10mg

大腸を直接刺激し、低下している腸のぜん動運動を高めます。

添加物：白糖、タルク、アラビアゴム、ヒマシ油、メタクリル酸共重合体S、メタクリル酸共重合体L、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、グリセリン、酸化チタン、乳糖、赤色3号、カルナウバロウ、サラシミツロウ、マクロゴール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。




便秘解消のポイント

〈まずは、生活習慣の見直しからはじめましょう〉


(1)規則正しい排便習慣

1日1回決まった時間(朝食後が最適)にトイレに行きましょう。
便意は我慢しないことが大切です。



(2)食生活の改善

1日3度の規則正しい食生活と食物繊維を多く含んだ食品(野菜類、豆類、芋類、海藻等)を毎日とること、水分を多めにとることも大切です。



(3)適度な運動

運動不足は便秘の大敵。
適度な運動をして腹筋をきたえたり、おなかをマッサージすることも大切です。



の上手な使い方

- (1)便秘の症状には個人差がありますが、おやすみ前に服用すれば翌朝(目安として6~11時間後)には効果があらわれます。
- (2)服用後、便通の改善がみられたら、服用間隔を少しづつばして、正常な排便習慣を取り戻しましょう。

便秘薬はお湯(ぬるま湯)に行ったらちから

腸で動くソフトな便秘薬

は、有効成分が大腸だけにはたらく便秘薬です。胃や小腸に対する刺激がほとんどなくおなかにソフトで、おやすみ前に服用すれば、翌朝ここちよいお通じをうながします。

[効能・効果]
便秘、便祕に伴う肌あれや腹部膨満などの諸症状を緩和します。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

■ ■ ■ おくすり119番室

■ ■ ■ 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

KY3D1

商品の特長**1. インドメタシン配合で優れた鎮痛消炎効果**

腰や関節などのしつこい痛みの元に直接作用する「インドメタシン」がジワリと浸透し、優れた鎮痛消炎効果を発揮します。

2. 保湿チャック付き

中袋には、保管に便利な保湿チャックがついて、シップ剤の乾燥を防ぎます。

▲【使用上の注意】 **してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)****1. 次の人は使用しないでください**

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) せんそくを起こしたことがある人
- (3) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している部位

3. 長期運用しないでください **相談すること****1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください**

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 本人又は家族がアレルギー体质の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】 プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発赤・発赤・かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3) 連続して2週間以上使用しないでください。

【成分・分量】 基体100g中インドメタシン……0.5g

添加物としてカオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、カルボキシメチルセルロースNa、D-ソルビトール、グリセリン、エデト酸Na、N-メチル-2-ピロリドン、ケイ酸アルミニウムMg、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、β-メントール、水を含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のチャックを閉めるか又は開口部をおりまけて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

【包装】 10cm×14cm …… 12枚入、24枚入

■本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の当社「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元:

お客様相談室:

受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

製造元:

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

せき・たんに……

〈鎮咳去痰薬〉

は、いろいろな原因で起こる“せき”をしりめ“たん”的れをよくします。また、さわやかなレモンティーの風味の液剤ですから、苦しい“せき”しつこい“たん”的れの時にも服用しやすくなっています。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起りやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください。
この医薬品又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
2. この医薬品を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
3. 眼用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります)
4. 過量服用・長期連用しないでください。
(倦怠感や虚脱感などがあらわれることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の入
 - (4) 乳児（乳児において、この医薬品に含まれる塩化リゾチームを初めて服用した時に、ショック（アナフィラキシー）があらわれたとの報告があります）
 - (5) 高齢者
 - (6) 本人又は家族がアレルギー体质の人
 - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、腎内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、ただちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹 発赤、かゆみ
消化器	恶心 嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合はただちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにしんましん、浮腫、胸苦しさとともに、顔色が蒼白くなり手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便秘、口のかわき

[効能・効果]

せき、たん

[用法・用量]

年齢により次の量を服用してください。

年 齡	1 回 量	1 日 服 用 回 数	
成 人 (15歳以上)	10.0mL		
11歳以上 15歳未満	6.5mL		
8歳以上 11歳未満	5.0mL		
5歳以上 8歳未満	3.3mL		
3歳以上 5歳未満	2.5mL		
1歳以上 3歳未満	2.0mL		
3ヵ月以上 1歳未満	1.0mL		
3ヵ月未満			服用しないでください。

症状により約4時間の
間隔をおいて1日6回
まで服用することができます。

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

[成分・分量]

〔 〕は淡褐色透明の液剤で、成人1日量(60mL)中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成 分	分 量	は た ら き
リン酸コデイン	50mg	せきを起こす中枢に作用し、せきをおさえるすぐれた効果があります。
d ₆ -塩酸メチルエフェドリン	75mg	気管支を拡張する作用と気管支のけいれんをおさえる作用により、せきをしめます。
塩化リソチーム	60mg(力錠)	のどにからまるたんを溶解して、出しやすくします。
マレイン酸クロルフェニラミン	12mg	抗ヒスタミン剤の一つで、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。
無水カフェイン	60mg	頭痛、不快感をやわらげ、またねむけをおさえます。
セネガ流エキス	1500mg	気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうすくし、出しやすくします。

* 添加物として、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、カラメル、香料、エタノール、pH調整剤を含有します。

(成分分量に関する注意)

この医薬品の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

[保管及び取扱い上の注意]


(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。


(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4) 使用期限（外箱及び容器に記載）のすぎた製品は服用しないでください。



[包装]

〔 〕 : 100mL



シールをはがすと計量カップがあります。
開封の際、お捨てにならないようご注意
ください。

※※

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

電 話 〔 〕

受付時間 月～木 9:15～17:30、金 9:15～16:00 (祝祭日を除く)

※※ 販売元

製造元

登録商標
3608PNZ