

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)
(平成17年4月1日~平成17年8月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
解熱鎮痛消炎剤	1包(1.6g)中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	急性膵炎	1
解熱鎮痛消炎剤	6錠中イブプロフェン450mg, アリルイソプロピルアセチル尿素180mg, 無水カフェイン240mg	肝機能異常	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		肝機能異常	1
		錯乱状態	1
		代謝性アシドーシス	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アセチルサリチル酸250mg, アセトアミノフェン150mg, 無水カフェイン60mg, アリルイソプロピルアセチル尿素15mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		肝障害	1
		胆汁うっ滞	1
		発熱	1
解熱鎮痛消炎剤	4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンフォチアミン10mg	急性腎不全	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシーショック アナフィラキシー反応 ライ症候群	1 1 1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アスピリン0.5g	スティーブンス・ジョンソン症候群 ろろ	1 1
精神神経用剤	10錠中チョウトウ末・サンソウニン・テンナンショウ末・シンイ末・インヨウカク末・サイシン末各30mg, ニンジン末475mg, プロムワレリル尿素600mg, カフェイン300mg, ルチン50mg, グリセロリン酸カルシウム300mg	アナフィラキシー反応	1
総合感冒剤	1包(0.663g)中イソプロピルアンチピリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン37.5mg	ネフローゼ症候群	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害 薬疹 薬物依存	1 1 1
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝機能異常	1
総合感冒剤	3包(1包1200mg)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド(ビタミンB1)24mg, リボフラビン(ビタミンB2)12mg, カンゾウ末800mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	多形紅斑	1
総合感冒剤	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ	アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
総合感冒剤	4錠中アセトアミノフェン200mg, dl-塩酸メチルエフェドリン16mg, マレイン酸クロルフェニラミン2mg, 無水カフェイン24mg, 硝酸チアミン6mg, リボフラビン2.8mg, アスコルビン酸120mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	6錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロバミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	感覚減退	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, ヨウ化イソプロバミド6mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	喉頭浮腫	1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害 急性肝炎	2 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
		失神	1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシシ4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	意識レベルの低下	1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ペラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	肝障害	1
総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝機能異常	1
総合感冒剤	3錠中イブプロフェン150mg, 塩酸プロムヘキシシ4mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	意識レベルの低下 発熱	1 1
総合感冒剤	6錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	肝機能異常	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペビジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン25mg, リボフラビン12mg	薬疹	1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	薬疹	1
総合感冒剤	6カプセル中メキタジン4mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン18mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg	呼吸困難	1
総合感冒剤	2カプセル中イブプロフェン150mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 無水カフェイン25mg, グアヤコールスルホン酸カリウム80mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	急性腎不全	1
総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペビジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン50mg, ゴオウ末3mg	腹膜炎	1
総合感冒剤	3カプセル中ゴオウ3mg, アセトアミノフェン800mg, ヒベンズ酸チペビジン40mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, チアミンジスルフィド10mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン100mg, リボフラビン3m	回腸潰瘍	1
眼科用剤	1mL中ブラプロフェン0.5mg	薬疹	1
眼科用剤	10mL中塩酸テトラヒドロゾリン5mg	血圧低下	1
眼科用剤	100mL中クロモグリク酸ナトリウム1g, マレイン酸クロルフェニラミン0.015g	蕁麻疹	1
耳鼻科用剤	2錠中塩酸プソイドエフェドリン120mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン4mg, トラネキサム酸420mg, ペラドンナ総アルカロイド0.4mg, 無水カフェイン100mg	肝機能異常	1
耳鼻科用剤	6錠中d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸フェニレフリン30mg, ペラドンナ総アルカロイド0.6mg, 無水カフェイン150mg	結膜充血 多形紅斑 発熱	1 1 1
耳鼻科用剤	2カプセル中塩酸プソイドエフェドリン60mg, マレイン酸カルビノキサミン6mg, ペラドンナ総アルカロイド0.2mg, 塩化リゾチーム15mg(力価), 無水カフェイン50mg	喉頭浮腫	1
耳鼻科用剤	2カプセル中塩酸プソイドエフェドリン70mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, 無水カフェイン100mg, サイシン乾燥エキス30mg(原生薬 サイシン約300mgに相当), ペラドンナ総アルカロイド0.4mg	眼瞼浮腫 接触性皮膚炎	1 1
耳鼻科用剤	3カプセル中塩酸ジフェニルピラリン12mg, ペラドンナ総アルカロイド0.4mg, グリチルリチン酸ニカリウム60mg, カフェイン75mg	眼の異常感	1
		低血圧	1
		頻脈	1
		多形紅斑	1
		発熱	1
		薬疹	1
		下痢	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
耳鼻科用剤	100mL中塩酸ナファゾリン50mg, マレイン酸クロルフェニラミン500mg, 塩化ベンザルコニウム10mg	そう痒症 口内炎 紅斑	1 1 2
その他の感覚器 官用薬	6カプセル中d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸フェニレフリン27mg, ペラドンナ総アルカロイド0.4mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), 無水カフェイン150mg	肝機能異常	1
鎮咳去たん剤	1包(1g)中塩酸メキシフェナミン50mg, ノスカピン20mg, カンゾウエキス末66mg(カンゾウ330mg), グアヤコールスルホン酸カリウム90mg, 無水カフェイン50mg, マレイン酸カルビノキサミン4mg	肝障害	1
鎮咳去たん剤	2カプセル中塩酸ブロムヘキシシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン10mg, ノスカピン20mg, dl-塩酸メチルエフェドリン25mg, マレイン酸カルビノキサミン4mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
鎮咳去たん剤	6カプセル中L-カルボシステイン750mg, 塩酸ブロムヘキシシン12mg	角膜炎 結膜炎 多形紅斑 虹彩炎	1 1 1 1
鎮咳去たん剤	6カプセル中臭化水素酸デキストロメトルファン60mg, ノスカピン60mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, 無水カフェイン90mg	発疹 発熱	1 1
鎮咳去たん剤	30mL中塩酸ブロムヘキシシン12mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, マレイン酸カルビノキサミン12mg	アナフィラキシーショック 倦怠感	1 1
消化性潰瘍用剤	2錠中塩酸ラニチジン63mg, ケイ酸アルミン酸マグネシウム250mg, 酸化マグネシウム100mg, 水酸化アルミナ・マグネシウム200mg	唾液腺炎	1
健胃消化剤	4包(12g)中ガジュツ末10000mg, 真昆布末400mg	アナフィラキシー反応	1
健胃消化剤	3g中ガジュツ末2.5g, 真昆布末100mg, ウコン末33mg, ショウキョウ末16mg, 結晶セルロース351mg	肝障害	1
健胃消化剤	1包(3g)中ガジュツ末2.5g, 真昆布末0.1g, ウコン末33mg, ショウキョウ末16mg, 結晶セルロース351mg	アナフィラキシー反応 そう痒症 下痢 肝機能異常 血尿 呼吸困難 耳鳴 心拍数増加 動悸 発疹 味覚異常 蕁麻疹	9 1 1 9 1 4 1 1 1 1 3 1 1
制酸剤	1包(1.3g)中ソファルコン100mg, ケイ酸アルミン酸マグネシウム300mg, 炭酸水素ナトリウム200mg, ロートエキス3倍散30mg(ロートエキス10mg)	肝障害	1
制酸剤	3包(3.69g)中銅クロロフィリンカリウム90mg, 水酸化マグネシウム1.05g, 無水リン酸水素カルシウム1.65g, ロートエキス3倍散90mg	黄疸 湿疹	1 1
下剤, 浣腸剤	1錠中ピサコジル5mg	下痢 腸管機能障害 腸管虚血	1 1 1
複合胃腸剤	1.4g中タカチアスターゼN1 25mg, タカチアスターゼA 150mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥物)320mg, 炭酸水素ナトリウム300mg, 沈降炭酸カルシウム225mg, オウレン末15mg, オウバク末35mg, ケイヒ末74.5mg, ウイキョウ末20mg, チョウジ末10mg, ショウキョウ末24.5mg, l-メントール2mg, カンゾウ末118mg	アナフィラキシーショック	1
複合胃腸剤	1包(1.2g)中安中散700mg(ケイヒ200mg, エンゴサク・ポレイ各150mg, ウイキョウ75mg, シュクシャ・カンゾウ各50mg, リョウキョウ25mg), 芍薬甘草湯エキス末140mg(シャクヤク・カンゾウ各280mg)	高マグネシウム血症 急性腎不全 血尿 腎不全 尿閉	1 1 1 1 1
その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	2瓶(60mL)中生薬エキスH 11mL(ジオウ5g, ブクリョウ・タクシャ・サンシュユ・ボタンピ・サンヤク各3g, ケイヒ・ホウブシ各1g)	肺炎	1
外皮用殺菌消毒剤	0.3m2中ヨードホルム1.1g	治療薬毒性	2
化膿性疾患用剤	1g中バシトラシン250単位, 硫酸フラジオマイシン3.5mg(力価), 酢酸ヒドロコルチゾン2.5mg	アナフィラキシーショック	1
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	100mL中l-メントール5g, dl-カンフル2g, サリチル酸メチル2g, サリチル酸グリコール1g, ユーカリ油0.5g, グリチルレチン酸0.1g	急性全身性発疹性膿疱症	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	100mL中サリメント2. 5g, l-メントール3g, マレイン酸クロルフェニラミン100mg, ニコチン酸ベンジル10mg, ノニル酸ワニルアミド12mg	肝機能異常 接触性皮膚炎 蜂巣炎	1 1 1
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	1g中吉草酸酢酸プレドニゾン1. 5mg, クロタミトン50mg, 酢酸トコフェロール5mg, イソプロピルメチルフェノール1mg	接触性皮膚炎	1
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	100g中l-メントール7.78g, サリチル酸グリコール5.56g, ノニル酸ワニルアミド0.01g(1枚6×8cm ²)	多形紅斑	1
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	100g中サリチル酸メチル6. 29g, l-メントール5. 71g, 酢酸トコフェロール2g, dl-カンフル1. 24g(1枚6. 5×4. 2cm ²)	皮膚潰瘍	1
その他の歯科口腔用薬	100mL中ヨウ素0. 5g	湿疹	1
ビタミンB1剤	4カプセル中コンドロイチン硫酸ナトリウム900mg, ベンフォチアミン100mg, 酪酸リボフラビン12mg, 塩酸ピリドキシン50mg, ガンマ-オリザノール10mg, 加工ダイサン末60mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
その他の滋養強壮薬	1本(100mL)中アミノエチルスルホン酸1g, ゴオウ抽出液M 0. 05mL(ゴオウ0. 5mg), イノシトール50mg, ニコチン酸アミド20mg, 硝酸チアミン5mg, リン酸リボフラビンナトリウム5mg, 塩酸ピリドキシン5mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
総合代謝性製剤	肝臓水分解物600mg, カンゾウ乾燥エキス100mg(原生薬換算量500mg)、胆汁エキス末50mg(原生薬換算量665mg)、リボフラビン12mg、塩酸ピリドキシン12mg、酢酸トコフェロール60mg	エナメル質異常	1
総合代謝性製剤	500mL中リバーコンセントレイト(肝臓エキス)12. 5g, 塩化カルニチン2. 5g, ニンジンエキス2. 5g, アミノエチルスルホン酸25g, 塩酸チアミン0. 5g, リン酸リボフラビンナトリウム0. 3g, ニコチン酸アミド2. 5g, シアノコバラミン250μg	肝機能異常	1
抗ヒスタミン剤	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン12mg, dl-塩酸メチルエフェドリン36mg, 茵ちん蒿湯乾燥エキス160mg(原生薬1. 6g)	アナフィラキシーショック	1
抗ヒスタミン剤	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン3. 9mg, グリチルリチン酸二カリウム51mg, グルコン酸カルシウム570mg	発疹	1
漢方製剤	12錠中酸棗仁湯(サンソウニントウ)エキス1500mg〔原生薬換算量 サンソウニン7500mg、ブクリョウ3750mg、チモ2250mg、カンゾウ750mg、センキュウ〕	嘔吐 嚥下性肺炎	1 1
その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	3包(4. 5g)中痛散湯水製乾燥エキス0. 5g(マオウ0. 7g, キョウニン・カンゾウ各0. 5g, ヨクイニン1. 3g, ボウイ2g, 動物胆0. 1g), マオウ0. 6g, ヨクイニン末1. 4g, カンゾウ末0. 4g, ボウイ末1. 6g	肝障害 肺炎	1 1
その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	1包(20g)中マオウ3g, キョウニン・カンゾウ各2g, ヨクイニン5g, カンボウ18g	薬疹	1
殺虫剤	1mL中フェントリン4mg	アナフィラキシー反応	1
他に分類されない治療を主目的としない医薬	1個中ニコチン2mg	斜視	1