

リン酸オセルタミビルについて

一般名：リン酸オセルタミビル

販売名：タミフルカプセル 75 タミフルドライシロップ 3%

製造販売業者：中外製薬株式会社

効能・効果：タミフルカプセル 75

A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症及びその予防
タミフルドライシロップ 3%

A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症

用法・用量：

○タミフルカプセル 75

①治療に用いる場合

通常、成人及び体重 37.5kg 以上の小児にはオセルタミビルとして
1 回 75mg を 1 日 2 回、5 日間経口投与する。

②予防に用いる場合

通常、成人及び 13 歳以上の小児にはオセルタミビルとして 1 回 75mg
を 1 日 1 回、7~10 日間経口投与する。

○タミフルドライシロップ 3%

通常、成人にはオセルタミビルとして 1 回 75mg を 1 日 2 回、5 日間、
用時懸濁して経口投与する。

通常、幼小児にはオセルタミビルとして、1 回 2mg/kg（ドライシロップ
剤として 66.7mg/kg）を 1 日 2 回、5 日間、用時懸濁して経口投与する。
ただし、1 回最高用量はオセルタミビルとして 75mg とする。

承認年月日：平成 12 年 12 月 タミフルカプセル 75（治療）

平成 13 年 12 月 タミフルカプセル 75（治療、小児用量追加）

平成 14 年 1 月 タミフルドライシロップ 3%

平成 16 年 7 月 タミフルカプセル 75（予防）

国内供給量：約 860 万人分（平成 16 年度冬のインフルエンザシーズン）