

塩酸アモロルフィン配合
タマリン エース 10g
水虫・たむしに

塩酸アモロルフィン配合
タマリン エース 10g
1日1回
製造・発売元
大正製薬株式会社
東京都豊島区南池田3丁目24番1号
お電話 19番室 電話 03-3985-1800
http://www.taisho.co.jp
製造販売元
杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台2-5

【効能】水虫、いんきんたむし、せにたむし
【用法・用量】1日1回、適量を患部に塗布してください。
【成分】1g中 塩酸アモロルフィン5.575mg
添加物：ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ワセリン、カルボキシビニルポリマー、エト酸Na、フェノキシエタノール、pH調整剤

1. 次の人には使用しないでください。
本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、陰等)、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。(3)潰瘍、ただれ、亀裂や外傷のひびき患部。
3. 使用に際しては、説明文をよくお読みください。
4. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

医薬品
4 987306 034280
166E1
2011.3
400A16KA

使用前に説明書を必ず
読んでください。

《トークール》
TOE-COOL
KYORIN
みずむし・たむしに 10g
1日1回《トークール》TOE-COOL
塩酸アモロルフィン配合
KYORIN

《トークール》
TOE-COOL
KYORIN
みずむし・たむしに 10g
1日1回《トークール》TOE-COOL
塩酸アモロルフィン配合
KYORIN

1. 次の人には使用しないでください。
本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、陰等)、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。(3)潰瘍、ただれ、亀裂や外傷のひびき患部。
3. 使用に際しては、説明文をよくお読みください。
4. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【効能】水虫、いんきんたむし、せにたむし
【用法・用量】1日1回、適量を患部に塗布してください。
【成分】1g中 塩酸アモロルフィン5.575mg
添加物：ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ワセリン、カルボキシビニルポリマー、エト酸Na、フェノキシエタノール、pH調整剤

医薬品
4 987060 005731
FE19
2010.04
090A53KD

使用前に説明書を必ず
お読みください。

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

水虫・たむし治療薬

ダマリンエース <水虫・たむし用薬>

塩酸アモロルフィン配合

◆ダマリンエースは有効成分塩酸アモロルフィンを主成分としたクリーム剤で、白癬菌の細胞膜合成を2つのステップでブロックして白癬菌を殺菌し、治療効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。(過敏症を起こした薬剤を避けて使用することが必要です)

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。(刺激が起きたり、有効成分の吸収が促進されることがあります)
- (2)湿疹。(症状が悪化することがあります)
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。(症状が悪化することがあります)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。(医師から処方されている薬に影響したり、本剤と同じ薬を使用している可能性もあります)
- (2)乳幼児。(本剤の適切な使用ができない場合があります)
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(アレルギー体質の人は本剤の使用により、アレルギー症状を起こす可能性があります)
- (4)薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(何らかの薬や化粧品等でアレルギーを起こした人は、本剤でも起こる可能性があります)
- (5)患部が顔面又は広範囲の人。(本剤が目、口腔、鼻腔に誤って塗布される場合があります。又、広範囲の人は別な要因も考えられます)
- (6)患部が化膿している人。(症状が悪化することがあります)
- (7)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
- (8)妊婦又は妊娠していると思われる人。(薬の使用には慎重を期し、専門医に相談して指示を受ける必要があります)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、疼痛、ただれ

(本剤によるアレルギー症状であるか、本剤の薬理作用が強くあらわれたものであると考えられ、このような場合、同じ薬を続けて使用すると症状がさらに悪化するおそれがあります)

(2)2週間位使用しても症状がよくなる場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合(病巣が使用前より広がる等)。(2週間位使用しても症状の改善がみられないときは、症状が重いか他の疾病によるものと考えべきで、なるべく早く医師又は薬剤師に相談してください)



効 能

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。


[21]

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。



〔注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

成分

1g中

成分

分量

はたらき


塩酸アモロルフィン 5.575mg
(アモロルフィンとして5mg)

白癬菌の細胞膜合成を2つのステップでブロックして白癬菌を殺菌し、治療効果を発揮します。

添加物：ステアリン酸ポリオキシル、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ワセリン、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、フェノキシエタノール、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



水虫治療のポイント

白癬菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いので、薬剤は広めに塗布しましょう。又、次のことに留意してください。

1 根気よく継続治療をする

かゆみがなくなっても、再発を防ぐため1カ月は本剤を使用しましょう。




2 患部を乾燥させる

通気性の悪い靴下やゴム長靴は好ましくありません。むれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。



3 衣類も清潔にする

靴や靴下、スリッパ、浴室のマットも清潔に保ち感染に注意しましょう。



4 患部をよく洗って清潔にする

白癬菌増殖の抑制や二次感染を防ぐため患部をよく洗い清潔に保ちましょう。



本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれる等、何かお気付の点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>



製造販売元

杏林製薬株式会社

東京都千代田区神田駿河台2-5

4250A16KA

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

TOE・COOL

水虫・たむし用薬

みずむし・たむしに

トークール®

トークールは、有効成分塩酸アモロルフィンを主成分としたクリーム剤で、白癬菌の細胞膜合成を2つのステップでブロックして白癬菌を殺菌し、治療効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人(過敏症を起こした薬剤を避けて使用することが必要である)

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、腔等)、陰のう、外陰部等(刺激が起きたり、有効成分の吸収が促進されることがある)

(2) 湿疹(症状が悪化することがある)

(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部(症状が悪化することがある)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人(医師から処方されている薬に影響したり、本剤と同じ薬を使用している可能性もある)

(2) 乳幼児(本剤の適切な使用ができない場合がある)

(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人(アレルギー体質の人は本剤の使用により、アレルギー症状を起こす可能性がある)

(4) 薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人(何らかの薬や化粧品等でアレルギーを起こした人は、本剤でも起こる可能性がある)

(5) 患部が顔面又は広範囲の人(本剤が目、口腔、鼻腔に誤って塗布される場合がある。又、広範囲の人は別な要因も考えられる)

(6) 患部が化膿している人(症状が悪化することがある)


(7) 「湿疹」か「水虫、いんざんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

(8) 妊婦又は妊娠していると思われる人(薬の使用には慎重を期し、専門医に相談して指示を受ける必要がある)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、疼痛、ただれ



(本剤によるアレルギー症状であるか、本剤の薬理作用が強くあらわれたものであると考えられ、このような場合、同じ薬を続けて使用すると症状がさらに悪化するおそれがある)

(2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合(病巣が使用前より広がる等)

(2週間位使用しても症状の改善がみられないときは、症状が重いか他の疾病によるものと考えらるべきで、なるべく早く医師又は薬剤師に相談すること)

効能 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし


用法・用量 1日1回、適量を患部に塗布してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- 1.定められた用法・用量を厳守してください。
- 2.患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- 4.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 5.外用にのみ使用してください。

<チューブの穴の開け方>

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。



成分・分量


トークールは、白色のクリーム剤で、1g中に次の有効成分を含んでいます。

成分	分量	作用
塩酸アモロルフィン	5.575mg (アモロルフィンとして5mg)	白癬菌の細胞膜合成を2つのステップでブロックして白癬菌を殺菌し、治療効果を発揮します。

添加物として、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ワセリン、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、フェノキシエタノール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



水虫治療のポイント

白癬菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いので、薬剤は広めに塗布しましょう。又、次のことに留意してください。

<p>①根気よく継続治療する</p> <p>かゆみがなくなっても、再発を防ぐため、1ヶ月は本剤を使用しましょう。</p>		<p>②患部を乾燥させる</p> <p>通気性の悪い靴下やゴム長靴は好ましくありません。</p> <p>むれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。</p>	
<p>③衣類も清潔にする</p> <p>靴や靴下、スリッパ、浴室のマットも清潔に保ち感染に注意しましょう。</p>		<p>④患部をよく洗って清潔にする</p> <p>白癬菌増殖の抑制や二次感染を防ぐため患部をよく洗い清潔に保ちましょう。</p>	

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。


杏林製薬株式会社 学術部

電話 03(3293)3412

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造・発売元 杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台2-5

1100A53KA

一 般 名	塩酸ネチコナゾール
構 造 式	
医 療 用 製 剤	<p>①アトラント外用液 1% (1 mL 中塩酸ネチコナゾール 10 mg (ネチコナゾール 8.92 mg))</p> <p>②アトラントクリーム 1% (1 g 中塩酸ネチコナゾール 10 mg)</p> <p>③アトラント軟膏 1% (1 g 中塩酸ネチコナゾール 10 mg)</p>
医 療 用 承 認 年 月 日	<p>①平成 5 年 7 月 2 日</p> <p>②平成 5 年 7 月 2 日</p> <p>③平成 10 年 3 月 5 日</p>
医 療 用 効 能 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 白癬：足白癬、体部白癬、腹部白癬 ・ 皮膚カンジダ症：指間びらん症、間擦疹 ・ 癬風
医 療 用 用 法 ・ 用 量	1 日 1 回患部に塗布する。
一 般 用 製 剤	<p>①アトラントエース液 (1 mL 中塩酸ネチコナゾール 10 mg)</p> <p>②アトラントエースクリーム (1 g 中塩酸ネチコナゾール 10 mg)</p> <p>③アトラントエース軟膏 (1 g 中塩酸ネチコナゾール 10 mg)</p> <p>④アトラントエース噴霧液 (1 mL 中塩酸ネチコナゾール 10 mg)</p>
一 般 用 承 認 年 月 日	①平成 14 年 11 月 15 日、②平成 14 年 11 月 15 日、③平成 14 年 11 月 15 日、④平成 17 年 12 月 22 日
一 般 用 効 能 ・ 効 果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
一 般 用 用 法 ・ 用 量	患部を清潔にして 1 日 1 回、適量を患部に塗布 (噴霧) する。
一 般 用 医 薬 品 市 販 後 調 査 結 果 等	<p>アトラントエース液等の市販後調査 (第 1 次：平成 14 年 11 月 15 日～平成 15 年 11 月 14 日、第 2 次：平成 15 年 11 月 15 日～平成 16 年 11 月 14 日、第 3 次：平成 16 年 11 月 15 日～平成 17 年 11 月 14 日)</p> <p>※液及びクリームで調査実施</p> <p>(1) 特別調査：液 693 例中 1 例 (1 件) (副作用発現率 0.14%) クリーム 759 例中 2 例 (2 件) (副作用発現率 0.26%) 湿疹 1 件、接触性皮膚炎 1 件、熱感 1 件</p> <p>いずれも「使用上の注意」から予測できる既知で非重篤な事象であった。</p> <p>(2) 一般調査：20 例 (28 件)</p>

	<p>接触性皮膚炎（かぶれ）7件※、そう痒感（かゆみ）、発赤各5件、腫れ3件、紅斑2件、水疱、発疹、落屑、表皮肥厚、疼痛、湿疹各1件</p> <p>※このうち、1件は誤用の可能性</p> <p>ほとんどが「使用上の注意」から予測できる既知の事象であり、いずれも非重篤な事象であった。</p> <p>特に問題となる副作用の発現はないことから、添付文書改訂等の特段の措置は必要ないと考えられる。</p>
<p>対 応 案</p>	<p>ネチコナゾールとして1g (mL)中8.92mg以下を含有する外用剤（軟膏剤、液剤及び噴霧剤）を指定医薬品から解除する。</p>