


厚生労働省発食安第0525003号

平成 18 年 5 月 25 日

薬事・食品衛生審議会

会長 井村伸正 殿

厚生労働大臣 川崎二郎



諮詢書

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。

記

畜水産食品中に残留する次の動物用医薬品の基準設定について

d-クロプロステノール

平成18年9月12日

薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会長 吉倉 廣 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会長 井上 達

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会報告について

平成18年5月25日付け厚生労働省発食安第0523003号をもって諮問された食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づくd-クロプロステノールに係る食品規格（畜水産食品等に係る動物用医薬品の残留基準）の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。

d-クロプロステノール

1. 概要

(1) 品目名 : d-クロプロステノール
(商品名 : ダルマジン)



(2) 用途 : 牛の発情周期の同調、黄体退行遅延（黄体遺残、黄体囊腫、機能性黄体を有する無発情）に基づく卵巣疾患の治療及び、豚の分娩誘発の目的で用いられるプロスタグランジン F_{2α} の類縁体である。なお、我が国においては、クロプロステノールのラセミ体 (dl-クロプロステノール) を有効成分とする注射剤が、同じ適用方法で承認されている。

(3) 化学名 :

和名 : [1R-/1α(Z),2β(1E,3R*)₃α,5α]-7-{2-[4-(3-クロロフェノキシ)-3-ハイドロキシ-1-ブテニル]-3,5-ジハイドロキシシクロペンチル}-5-ヘプテノイックアシッド

英名 : [1R-/1α(Z),2β(1E,3R*)₃α,5α]-7-{2-[4-(3-Chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl}-5-heptenoic acid

(4) 構造式及び物性



(参考) PGF_{2α}

分子式 : C₂₂H₂₉ClO₆

分子量 : 424.92

常温における性状 : 白色～微黄色の粘調性油またはワックス

融点 : 約44.2～44.7°C

溶解度 : アセトン及びジクロロメタンに可溶

(5) 適用方法及び用量

我が国における用法、用量は以下のとおりである。

牛の発情周期の同調 : 排卵後 5～16 日の黄体期にある牛に対して 2 mL を 1 回筋肉内に注射する。黄体期が確認できない場合には、2 mL を 11 日間隔で 2 回筋肉内に注射する。

牛の黄体退行遅延に基づく卵巣疾患の治療：2 mLを1回筋肉内に注射する。

豚の分娩誘発：1 mLを妊娠末期(112日又は113日)に1回筋肉内に注射する。

休薬期間は、牛で3日、豚で1日及び搾乳牛から搾乳する際は12時間とされている。

(6) 諸外国における使用状況

本剤を主剤とする注射剤で、同一製剤がすでに主としてEUで承認され、牛、豚及び馬を対象に使用されている。用法・用量は牛で2 mL、豚で1 mL、馬で1 mLを筋肉内に注射するとされており、休薬期間は牛、豚で24時間、乳牛で12時間である。

2. 残留試験結果

(1) 分析の概要

① 分析対象の化合物：d-クロプロステノール

② 牛及び豚とも、LC/MS/MS法が、筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、小腸及び血漿において検証されている。同試験法における検出限界は0.1 ppbである。

(2) 組織における残留

① ウシにおける組織中の残留試験

ウシに常用量群は1頭あたりd-クロプロステノールを0.15 mg、2倍量群は0.3 mg投与した。投与後1時間、1日及び2日の各組織におけるd-クロプロステノールの濃度を以下に示す。

試験群	投与後	筋肉	脂肪	肝臓	腎臓	小腸	血漿	(ppb)
常用量	1時間	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1, 0.1, 0.2, 0.5, 0.6(2)	<0.1(2), 0.2(2), 0.3(2)	<0.1(4), 0.1(2)	
	1日	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	2日	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
2倍量	1時間	<0.1	<0.1	<0.1(4), 0.1, 0.2	0.53±0.38	<0.1, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 1.2	<0.1(3), 0.1(2), 0.2	
	1日	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	2日	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

常用量、2倍量共に、投与後1日で検出限界以下になった。

② 搾乳牛における乳汁中の残留試験

搾乳牛に常用量群は1頭あたりd-クロプロステノールを0.15 mg、2倍量群は0.3 mg投与した。投与後12、24時間における乳汁中のd-クロプロステノールの濃度は、常用量、2倍量共に検出限界以下であった。

試験群	投与後	乳汁中
常用量	12時間	<0.1
	24時間	<0.1
2倍量	12時間	<0.1
	24時間	<0.1

③ ブタにおける組織中の残留試験

ブタに常用量群は1頭あたりd-クロプロステノールを0.075 mg、2倍量群は0.15 mg投与した。投与後1時間、1日及び2日の各組織におけるd-クロプロステノールの濃度を以下に示す。

(ppb)

試験群	投与後	筋肉	脂肪	肝臓	腎臓	小腸	血漿
常用量	1時間	<0.1	<0.1	<0.1	0.3±0.23	<0.1, 0.2(2), 0.4(2), 0.5	<0.1(2), 0.2, 0.3(3)
	1日	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	2日	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
2倍量	1時間	<0.1	<0.1(3), 0.1, 0.3(2)	<0.1	0.58±0.15	0.55±0.42	0.43±0.19
	1日	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	2日	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1

常用量、2倍量共に、投与後1日で検出限界以下になった。

3. ADI の評価

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平成18年2月17日付け厚生労働省発食安第0217001号により、食品安全委員会にて意見を求めたd-クロプロステノールに係る食品健康影響評価については、以下のとおり評価されている。

d-クロプロステノールは、各種の遺伝毒性試験から生体において遺伝毒性発がん性を示す可能性は低く、催奇形性試験の結果から、催奇形性はないと認められる。毒性試験において認められた主な影響はプロスタグラジン作用によるものと考えられ、また、臨床用量を投与した対象動物の試験においても、いわゆるプロスタグラジン作用以外の異常な副作用は認められていない。さらに、薬剤の性質から使用機会が限定されており、また、動物体内における代謝・排泄が早く、投与1日後にはppbオーダーでほとんど検出不可能となる。これらのことから、本製剤が適切に使用される限りにおいて、ヒトが食品を通じてd-クロプロステノールを継続的に摂取する可能性は事実上ないものと考えられる。これらのこと考慮すると、d-クロプロステノールを有効成分とする牛及び豚の注射剤（ダルマジン）は、適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。

4. 残留基準の設定

動物用医薬品としての使用実態、食品安全委員会における評価結果及び残留試験結果を踏まえ、当該動物用医薬品については、残留基準を設定しないこととする。

(参考)

これまでの経緯


- 平成18年 2月17日 ・農林水産大臣から厚生労働大臣あてに動物用医薬品の承認及び使用基準の設定について意見聴取
- 平成18年 2月17日 ・厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに食品健康影響評価依頼
- 平成18年 5月11日 ・食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表
- 平成18年 5月25日 ・厚生労働大臣から薬事・食品衛生審議会会长あてに残留基準の設定について諮問
- 平成18年 5月30日 ・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会における審議
- 平成18年 6月22日 ・食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価結果通知

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

- 青木 宙 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授
○井上 達 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長
井上 松久 北里大学医学部微生物学教室教授
大野 泰雄 国立医薬品食品衛生研究所副所長
小沢 理恵子 日本生活協同組合連合会くらしと商品研究室長
加藤 保博 財団法人残留農薬研究所理事
志賀 正和 社団法人農林水産先端技術産業振興センター研究開発部長
下田 実 東京農工大学農学部獣医学科教授
豊田 正武 実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授
中澤 裕之 星葉科大学葉品分析化学教室教授
米谷 民雄 国立医薬品食品衛生研究所食品部長
山添 康 東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授
吉池 信男 独立行政法人国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹


(○：部会長)



府食第531号
平成18年 6月22日

厚生労働大臣
川崎 二郎 殿

食品安全委員会
委員長 寺田 雅昭



食品健康影響評価の結果の通知について

平成18年2月17日付け厚生労働省発食安第0217001号をもって貴省から当委員会に対して求められたd-クロプロステノールに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第23条第2項の規定に基づき通知します。

なお、食品健康影響評価の詳細をまとめたものは別添のとおりです。

記

d-クロプロステノールを有効成分とする牛及び豚の注射剤(ダルマジン)が適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。

動物用医薬品評価書

d-クロプロステノールを有効成分とする牛及び豚の注射剤(ダルマジン)の食品健康影響評価について

2006年6月

食品安全委員会

〈目次〉

	頁
1. d-クロプロステノールについて	3
2. 製剤について	3
3. ダルマジンの安全性に係る知見等について	4
(1)ヒトに対する安全性について	4
(2)残留性について	6
(3)対象動物における安全性試験	7
4. その他の知見について	7
5. 食品健康影響評価について	8
6. 参考文献	9

〈審議の経緯〉

平成18年 2月20日 厚生労働大臣及び農林水産大臣から食品健康影響評価について要請、関係書類の接受
平成18年 2月23日 第132回食品安全委員会（要請事項説明）
平成18年 2月24日 第47回動物用医薬品専門調査会
平成18年 3月29日 第50回動物用医薬品専門調査会
平成18年 4月28日 第52回動物用医薬品専門調査会
平成18年 5月11日 第142回食品安全委員会
平成18年 5月11日 国民からの意見情報の募集
平成18年 5月11日 一 6月9日 動物用医薬品専門調査会座長から食品安全委員会委員長に報告
平成18年 6月21日 第148回食品安全委員会
平成18年 6月22日 同日付で食品安全委員会委員長から農林水産大臣、厚生労働大臣に通知

〈食品安全委員会委員〉

委員長	寺田 雅昭
委員長代理	寺尾 允男
	小泉 直子
	坂本 元子
	中村 靖彦
本間 清一	
見上 彪	

〈食品安全委員会動物用医薬品専門調査会専門委員〉

H17.10.1~

座長	三森 国敏	津田 修治
座長代理	井上 松久	寺本 昭二
	青木 宙	長尾 美奈子
	明石 博臣	中村 政幸
	江馬 真	林 真
	大野 泰雄	藤田 正一
	小川 久美子	吉田 緑
	渋谷 淳	
	嶋田 甚五郎	
	鈴木 勝士	



d-クロプロステノールを有効成分とする牛及び豚の注射剤(ダルマジン)の食品健康影響評価について

食品安全委員会は食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条1項第8号の規定に基づき、農林水産大臣から、d-クロプロステノールを有効成分とする牛及び豚の注射剤(ダルマジン)について、同法第24条1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣からd-クロプロステノールについて、意見を求められた。(平成18年2月17日、関係書類を接受)

本製剤の有効成分はd-クロプロステノールであり、牛の発情周期の同調、黄体退行遅延に基づく卵巣疾患の治療、豚の分娩誘発の目的で用いられる。

1. d-クロプロステノールについて^{(1),(2),(3)}

d-クロプロステノール(d-cloprostetol)



PGF2 α

分子式	: C ₂₂ H ₂₉ ClO ₆
分子量	: 424.92
常温における性状	: 白色～微黄色の粘調性油またはワックス
融点	: 約44.2～44.7°C
溶解度	: アセトン及びジクロロメタンに可溶

プロスタグランジンは子宮収縮性物質として発見され、その後生体内の組織に広く存在し様々な生理作用を有することが明らかにされている。このうちプロスタグランジンF₂ α (PGF2 α)はウシでは子宮内膜上皮細胞等で產生され、卵巣で黄体退行因子として作用する。ブタにおいても同様の効果が認められており、これらの動物においては生理的な黄体退行因子と考えられている。クロプロステノールはPGF2 α の合成類縁体で、通常ラセミ体として合成される。ラセミ体のうち、子宮収縮や黄体退行作用のPGF2 α 様の生理活性を有するのはd-体のみである。PGF2 α 、あるいはクロプロステノールは、後述するようにいずれも投与後速やかに排泄されることから、畜産において黄体を退行させ発情を同期化する目的や子宮収縮作用による分娩誘発の目的で汎用されている。

クロプロステノールを主剤とする動物用医薬品は、すでに国内でラセミ体を用いた製剤が承認され、使用されている。国外では、EU、米国等において広く使用されている。

2. 製剤について⁽⁴⁾

ダルマジンはd-クロプロステノールを主剤とする注射剤で、同一製剤がすでに主としてEUで承認され、牛、豚及び馬を対象に使用されている。用法・用量は牛で2mL、豚で1mL、馬で1mLを筋肉内に注射するとされており、休薬期間は牛、豚で24時間、牛乳で12時間である。防腐剤を含有するが、ヒト用の注射剤にも0.1w/v%程度添加されて使用されており、動物体内における

る代謝、排泄も速やかであることから、ヒト用医薬品と同レベルの防腐剤の動物用製剤への含有が食品を介してヒトに与える影響は無視できるものと考えられる。

なお、国内における使用対象は牛の発情周期の同調、黄体退行遅延に基づく卵巢疾患の治療、豚の分娩誘発であり、用法・用量は牛で 2mL、豚で 1mL を筋肉内に注射するとされており、休薬期間は牛 3 日、豚 1 日、牛乳 12 時間とされている。

3. ダルマジンの安全性に係る知見等について

(1)ヒトに対する安全性について^{(5),(6)}

変異原性については次のような *in vitro* 及び *in vivo* 試験の知見が得られている。

in vitro 試験

試験	対象	用量	結果
Ames 試験	<i>S. typhimurium</i> TA1535, TA1537, TA98, TA100, TA102	313～5000 µg/plate(±S9)	陰性 ¹
染色体異常試験	培養ヒトリンパ球	23.2～4990 µg/mL (-S9; 2hr+22hr)	陰性 ²
		23.2～4990 µg/mL (+S9; 3hr+21hr)	陽性 ³ (2320 µg/mL)

1 plate incorporation、pre-incubation のそれぞれを実施。Pre-incubation の最高濃度で生育阻害が認められた。

2 4990 µg/mL では細胞毒性が認められた。

3 4990 µg/mL では細胞毒性が認められた。

in vivo 試験

試験系	試験対象	用量	結果
小核試験	マウス骨髄	10, 20, 40mg/kg 体重/日 単回腹腔内	陰性 ¹

1 投与群では多染性赤血球に対する成熟赤血球比率の上昇が認められた

上記のように、*in vitro* の試験においては、培養ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験で S9 存在条件下の高用量時で陽性と判定される所見が認められたが、骨髄に対して毒性の認められる用量まで試験されただけで歯類を用いた *in vivo* の小核試験では陰性であった。このため、d-クロプロステノールが生体にとって問題となるような遺伝毒性を示す可能性は低いと考えられる。

また、次の毒性試験の知見が報告されている。

【ラットを用いた亜急性毒性試験】

4 週齢の SD 系ラット(雌雄各 3 匹/群)を用いた筋肉内(0、6、40、300、2000 µg/kg/日)投与における 21 日間の亜急性毒性試験において認められた毒性所見は以下の通りであった。

一般的な臨床症状観察では、2000 µg 投与群の雌雄で呼吸数の増加、眼瞼下垂、軟便が認められた。

体重変化では、300 µg 以上投与群の雄において低値が認められ、摂餌量では 300 µg 以上投与群の雌、2000 µg 投与群の雄で低下が認められた。

眼科的検査では異常は認められなかった。

血液学的検査では、300 µg 以上投与群の雌雄で血小板の減少、雄で活性化トロンボプラスチン時間の短縮、雌で赤血球数、Hb の減少が認められ、2000 µg 投与群の雄でプロトロンビン時間の延長、雌で MCV の増加が認められた。

血液生化学的検査では、40 µg 以上投与群の雄及び 2000 µg 投与群の雌で塩素の高値が認められた。300 µg 以上投与群の雄でナトリウム、2000 µg 投与群の雄でグロブリン、BUN の増加が

認められた。また、300 μg 投与群の雄 1 匹、2000 μg 投与群の 2 匹で ALT、AST の高値が認められた。

尿検査では、40 μg 以上の投与群の雄、300 μg 投与群の雌において pH の低値が認められた。

臓器重量では、300 μg 以上投与群の雄で甲状腺の相対重量の増加、雌で増加傾向が認められた。

剖検では、2000 μg 投与群の雄の 1 例で甲状腺の拡張が認められた。

病理組織学的検査では、40 μg 以上投与群の雌で黄体細胞の空胞化が認められた。また 300 μg 以上投与群の雌雄で甲状腺濾胞細胞の萎縮、雄腎臓で両側性の好塩基性尿細管、2000 μg 投与群の雄の 1 例で肝臓の多巣性及び単細胞壊死が認められた。

また、4 週齢の SD 系ラット(雌雄各 10 匹/群)を用いた強制経口(0、4、20、100、500 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$)投与における 91 日間の亜急性毒性試験において認められた毒性所見は以下の通りであった。

一般的な臨床症状観察では、特に被験物質の投与に伴う異常は認められなかった。

体重変化、摂餌量では 500 μg 投与群の雄で低い傾向が認められた。

眼科的検査では異常は認められなかった。

血液学的検査では、特に被験物質の投与に伴う異常は認められなかった。

血液生化学的検査では、20 μg 投与群の雄及び 100 μg 投与群の雌で AST、ALT、 γ -GTP の高値傾向、100 μg 以上投与群の雄及び 500 μg 投与群の雌では高値が認められた¹。また、100 μg 以上投与群の雄でコリンエステラーゼの高値、500 μg 投与群の雌雄で LDH の高値、雄で AP、総たん白質、Tcho の高値が認められた。

尿検査では、500 μg 投与群の雄において比重の高値が認められた。

臓器重量では、500 μg 投与群の雌で腎臓の相対重量の高値が認められた。

剖検では、500 μg 投与群の雌で肝臓、腎臓(片側)、卵巣の大型化がそれぞれ 1 例で認められた。

病理組織学的検査では、20 μg 以上投与群の雄、500 μg 投与群の雌で肝臓の巣状壊死の発生率增加、20 μg 以上投与群の雌で黄体細胞の空胞化が認められた。剖検で卵巣の大型化が認められた個体では黄体数の増加が認められた。

最も低い用量で認められた影響は 13 週間投与の雌の黄体細胞の空胞化と雄の肝臓の巣状壊死で、NOAEL は 4 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日であった。

【ラットを用いた 1 世代繁殖毒性試験】

SD 系ラット(雌雄各 25 匹/群)を用いた強制経口 (0、2、10、50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日)投与による 1 世代繁殖試験が実施されている。被験物質の投与は、交配前 8 週から雄は交配成立まで、雌は分娩後 21 日の F₁ 児離乳まで行った。

親動物においては、50 μg 投与群の雌で妊娠 20 日から全妊娠期間にわたって摂餌量が低下した。25 例中 7 例で早産が認められ、妊娠期間の短縮と出産率の低下が認められた。性周期、交尾率、受胎率には投与の影響はみられなかった。

児動物においては、50 μg 投与群で早産の影響と考えられるほ育 0 日の生存児数減少、ほ育 4 日生存率の低下、ほ育期間中の体重増加量低下、開眼の遅延が認められた。この他には児動物の臨床観察や感覚反射機能検査に被験物質投与の影響は認められなかった。

本試験における NOAEL は親動物の雄で 50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日、雌で 10 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日、児動物で 10 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日であった。

【ラットを用いた催奇形性試験】

SD 系ラットを用いた強制経口(0、6、30、150 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日²)投与による催奇形性試験において

¹ 雌の γ -GTP については 500 μg 投与群の高値傾向のみ。

² 交配の結果用量順に 23、25、25、21 匹の妊娠が確認されたためこれらを用いて試験が実施された。

認められた毒性所見は以下の通りであった。被験物質の投与は、妊娠 7 日から 17 日の間行い、妊娠 20 日に帝王切開した。

母動物に死亡は認められなかつたが、 $150\mu\text{g}$ 投与群の約半数(11/21)で早産あるいは初期流産が認められた。早産は $30\mu\text{g}$ でも 1 例(1/25)認められた。体重や摂餌量に投与の影響はみられなかつた。

流産及び早産と関連して $150\mu\text{g}$ 投与群で胎児の死亡率の増加が認められた。生存胎児の性比³や体重に投与の影響は認められなかつた。また、 $150\mu\text{g}$ 投与群で骨化遅延が観察されたが、胎児の外表、内臓および骨格観察において奇形や変異の発現率に影響は認められなかつた。

以上の結果から、本試験の母動物に対する NOAEL は $6\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日、胎児に対する NOAEL は $30\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日であった。また、催奇形性は認められなかつた。

【ウサギを用いた催奇形性試験】

日本白色種ウサギ(10~12 匹/群)を用いた強制経口($0, 0.1, 0.5, 2.5\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日)投与による催奇形性試験において認められた毒性所見は以下の通りであった。被験物質の投与は、妊娠 6 日から 18 日の間行い、妊娠 28 日に帝王切開した。

母動物に死亡は認められなかつたが、 $2.5\mu\text{g}$ 投与群の 8 匹に臍出血が認められ、そのうちの 7 匹が流産した。体重や摂餌量に投与の影響はみられなかつた。

胎児の死亡率、性比および体重に被験物質投与の影響は認められず、外表、内臓および骨格観察においても奇形の発現率に影響は認められなかつた。 $2.5\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日で腎孟拡張の発現率の上昇がみられた。

以上の結果から、本試験の母動物に対する NOAEL は $0.5\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日、胎児に対する NOAEL は $0.5\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/日であった。また、催奇形性は認められなかつた。

(2) 残留性について^{(7),(8),(9),(10)}

【ラットにおける分布、排泄試験】

ラットに ^{125}I でヨウ素化した d-クロプロステノールを大腿部に筋肉内投与し、4320 分後まで全血、血漿及び肝臓、腎臓、甲状腺、子宮、卵巣、投与部位及び投与と反対側の大腿筋を採取し、放射活性を測定した。血漿中濃度は投与直後(5 分後)に最大値を示し、その後減少して 12 時間後には検出されなくなった。各臓器への分布は速やかで筋肉や腎臓では投与直後(5 分後)、肝臓、卵巣、子宮では 20 分後に C_{\max} に達した。その後の消失は速やかで、肝臓における $T_{1/2}$ は 5.7 時間であった。

【乳牛における分布、排泄試験】

製剤 2mL^4 を体重約 520kg の乳牛に筋肉注射し、360 分後まで採血して RIA 法で血漿中濃度の推移が検討された。 T_{\max} は約 90 分、その時の C_{\max} は約 $1338\text{pg}/\text{mL}$ であり、 $T_{1/2}$ は 97 分であった。

常用量(2mL^5)あるいは 2 倍量(4mL^6)の製剤をホルスタイン種の雌成牛の大腿部に筋肉内注射し、投与 1 時間、1 日、2 日後に各 3 頭から血漿、背部筋肉、肝臓、腎臓、脂肪、小腸、注射部位筋肉及びその周囲の筋肉を採取し RIA 法で d-クロプロステノールの分布を確認した。1 時間後の被験物質濃度は注射部位において最も高く、次いで注射部位周辺筋肉であった。その他の部位はいずれも 1ppb 未満程度が検出されたのみであった。常用量、2 倍量とも投与 1 日後には全試料が検出限界以下⁷となつた。

同様の条件で別途行われた試験においても分布、消長ともほぼ同様の結果が認められたが、

³ 対照群との比較では有意差が認められたが、これは対照群の性比が低いことに起因するもので、通常の変動の範囲内であった。

⁴ d-クロプロステノール $150\mu\text{g}/\text{頭}$

⁵ d-クロプロステノール $150\mu\text{g}/\text{頭}$

⁶ d-クロプロステノール $300\mu\text{g}/\text{頭}$

⁷ 検出限界 0.1ppb

2倍量投与群の1頭の注射部位で1日後の採取で0.4ppbが検出された。2日後には全て検出限界以下となつたが、さらに確認のため、試験試料の採取を3日後に設定した残留確認試験が実施された。その結果、3日後の注射部位及び周辺の筋肉のいずれからもd-クロプロステノールは検出されなかつた。

乳汁における消長を確認するために、ホルスタイン種の泌乳牛に常用量あるいは2倍量の製剤を臀部筋肉内に注射し、投与12時間後から12時間毎に72時間までの乳汁を採取し、RIA法でd-クロプロステノールの分泌を確認した。常用量、2倍量ともに12あるいは24時間後の試料のいずれからもd-クロプロステノールは検出されなかつた。同様の条件で別途行われた試験においても同様に乳汁からd-クロプロステノールは検出されなかつた。

また、排泄経路は糞から4割前後、尿から5割強であり、乳汁からの排泄は1%に満たないと報告されている。

【雌豚における分布、排泄試験】

製剤1mL⁸を体重約100kgの雌豚に筋肉注射し、480分後まで採血してRIA法で血漿中濃度の推移が検討された。T_{max}は10-120分とばらつきが認められたが平均では約37分で、その時のC_{max}は2216-2266pg/mLであり、T_{1/2}は192分であった。

常用量(1mL⁹)あるいは2倍量(2mL¹⁰)の製剤を雌成豚の大腿部に筋肉内注射し、投与1時間、1日、2日後に各3頭から血漿、背部筋肉、肝臓、腎臓、脂肪、小腸、注射部位筋肉及びその周囲の筋肉を採取しRIA法でd-クロプロステノールの分布を確認した。1時間後の被験物質濃度は注射部位において最も高く、注射部位周辺筋肉にも認められたが、その他の部位はいずれも1ppb未満程度が検出されたのみであった。常用量、2倍量とも投与1日後には全試料が検出限界以下¹¹となつた。同様の条件で別途行われた試験においても分布、消長ともほぼ同様の結果が認められ、投与1日後には常用量、2倍量とも全試料が検出限界以下となつた。

これらより、対象動物においては、休薬期間後にはいずれの部位からもd-クロプロステノールはppbレベルでも検出不可能となり、事実上消失することが確認された。

(3) 対象動物における安全性試験⁽¹¹⁾

【泌乳牛における安全性試験】

泌乳牛(ホルスタイン種系非妊娠雌;3頭/群)を用いた3日間の筋肉内投与(0、2、20mL/頭)による安全性試験においては、投与群で投与2日から全ての個体で発情徴候が認められた他には、一般状態、体重、飼料摂取量、血液学的検査、血液生化学的検査、尿検査、病理学的検査のいずれにも投与に起因すると考えられる異常は認められなかつた。

【豚における安全性試験】

雌豚(3頭/群)を用いた3日間の筋肉内投与(0、1、10mL/頭)による安全性試験においては、投与群で投与開始前から発情徴候を示した1頭を除き全ての個体で投与後5日までに発情徴候が認められた他には、一般状態、体重、飼料摂取量、血液学的検査、血液生化学的検査、尿検査、病理学的検査のいずれにも投与に起因すると考えられる異常は認められなかつた。

4. その他の知見について^{(12),(13),(14),(15)}

プロスタグランジンはアラキドン酸等から動物の組織で合成される生理活性物質で、様々な種類及び生理的活性を有する一群の化合物であり、A～Jの各群に分けられ、さらに側鎖の二重結合の数で1～3に分類されている。PGF2 α はプロスタグランジンの一一種で、血圧上昇、血管収

⁸ d-クロプロステノール 75 μ g/頭

⁹ d-クロプロステノール 75 μ g/頭

¹⁰ d-クロプロステノール 150 μ g/頭

¹¹ 検出限界 0.1ppb

縮、腸管運動亢進、子宮収縮、黄体退行、気管支収縮作用等を有することが知られており、ヒト用の医薬品としても利用されている。d-クロプロステノールはクロプロステノールのラセミ体のうちの一種で PGF₂α の合成類縁体である。

国内では PGF₂α、クロプロステノールのラセミ体がすでに動物用医薬品として使用されており、海外では d-クロプロステノールもすでに使用されている。通常のウシ、ブタ等の食肉中には検出限界である 0.1 ppb 以上のレベルの内因性 PGF₂α が存在しているとされており、薬理作用からこの系統の薬剤の用途は必然的に限定される。さらに排泄が極めて早いことが確認されることから、クロプロステノールについて EMEA では ADI を設定しつつも MRL の設定は不要であるとしている。FDA では ADI、MRL ともに設定していない。JECFA における評価は実施されていない。

5. 食品健康影響評価について

上記の通り、ダルマジンの主剤である d-クロプロステノールは、各種の遺伝毒性試験から生体において遺伝毒性発がん性を示す可能性は低く、催奇形性試験の結果から、催奇形性はないと認められる。毒性試験において認められた主な影響はプロスタグランジン作用によるものと考えられ、また、臨床用量を投与した対象動物の試験においても、いわゆるプロスタグランジン作用以外の異常な副作用は認められていない。

さらに、薬剤の性質から使用機会が限定されており、また、動物体内における代謝・排泄が早く、投与 1 日後には ppb オーダーでほとんど検出不可能となる。これらのことから、本製剤が適切に使用される限りにおいて、ヒトが食品を通じて d-クロプロステノールを継続的に摂取する可能性は事実上ないものと考えられる。

これらのことを考慮すると、d-クロプロステノールを有効成分とする牛及び豚の注射剤(ダルマジン)は、適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。

6. 参考文献

- 1) ダルマジン輸入承認書添付資料:物理的・化学的試験(未公表)
- 2) 新編畜産大辞典; 養賢堂(1996)
- 3) ダルマジン輸入承認書添付資料:開発の経緯及び外国における使用状況(未公表)
- 4) ダルマジン輸入承認申請書(未公表)
- 5) ダルマジン輸入承認書添付資料:吸入毒性等の特殊毒性に関する試験資料(未公表)
- 6) ダルマジン輸入承認書添付資料:亜急性毒性及び慢性毒性に関する試験資料(未公表)
- 7) ダルマジン輸入承認書添付資料:吸収、分布、代謝及び排泄に関する試験資料(未公表)
- 8) ダルマジン輸入承認書添付資料:残留性に関する試験資料(未公表)
- 9) Peter R. Reeves (1978); Distribution, elimination, and residue studies in the cow with synthetic prostaglandin estrumate
J. Agric. Food Chem. 26, No.1, 152-155
- 10) Geoffrey RB et, al(1980); Clearance of the synthetic prostaglandin cloprostenol ("Estrumate") from the milk of cows
J. Agric. Food Chem. 28, No.1, 142-144
- 11) ダルマジン輸入承認書添付資料:安全性に関する試験資料(未公表)
- 12) cloprostenol and R-cloprostenol SUMMARY REPORT(1); EMEA(1997)
- 13) cloprostenol and R-cloprostenol SUMMARY REPORT(1); EMEA(2004)
- 14) FDA ANADA 200-310
- 15) 21CFR § 522.460 Cloprostenol sodium