


ノバルロン (案)

1. 品目名：ノバルロン (Novaluron)

2. 用途：殺虫剤

ジフルベンゾイルウレア系殺虫剤である。鱗翅目、甲虫目、半翅目及び双翅目に属する様々な昆虫の幼虫に対して、活性を示す。アセチルグルコサミンの生成を阻害することにより、作用すると考えられる。

3. 化学名：(RS)-1-[3-クロロ-4-(1,1,2-トリフルオロ-2-トリフルオロメトキシエトキシ)フェニル]-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)ウレア



4. 構造式及び物性

分子式 C₁₇H₉ClF₈N₂O₄

分子量 492.7

水溶解度 0.003mg/l (20°C)

分配係数 logPow=4.3

(メーカー提出資料より)

5. 適用病害虫の範囲及び使用方法

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。

なお、本剤は、平成16年2月5日付け食安発第0205001号「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針について」に基づき、りんご及びなしに設定されている残留基準の変更が要請されている。

(1) 国内における使用方法

作物名	適用病害虫名	使用方法				
		希釗倍数	散布液量 (L/10a)	使用 時期	使用回数*	方法
キャベツ	コナガ	2,000～ 3,000 倍	100～300	収穫 7 日 前まで	3回以内	散布
	アオムシ					
	ヨトウムシ					
なす	コナジラミ類	2,000 倍	100～300	収穫前日 まで	4回以内	散布
	オオタバコガ					
	マメハモグリバエ					
トマト	コナジラミ類	2,000 倍	100～300	収穫 7 日 前まで	2回以内	散布
	オオタバコガ					
てんさい	ヨトウムシ	2,000～ 3,000 倍	100～300	収穫 7 日 前まで	2回以内	

(2) 米国におけるりんご及びなしについての使用方法

7.5%ノバルロン顆粒水和剤

作物名	適用病害虫名	1回あたりの製剤 使用量 (g/10a)	使用時期	使用回数	使用方法
りんご なし	ハモグリガ類	123～370	収穫 14 日 前まで	3回以内	散布
	ナシキジラミ	247～493			
	コドリンガ	179～370 (東部) 280～493 (西部)			
	<i>Choristoneura</i> <i>rosaceana</i>	179～493			
	<i>Pandemis</i> <i>pyrusana</i>				
	<i>Argyrotaenia</i> <i>velutinana</i>	179～370			
	<i>Archips</i> <i>argyrospila</i>				

<i>Platynota flavedana</i>			
<i>Platynota idaeusalis</i> リンゴ シロヒメハマキ	179～370		
ナシメシソクイ	179～370		
カスミカメムシ リンゴ シロヨコバディ	179～493		

使用量：1シーズンあたり 1.435 kg/10a 未満

(有効成分として、1シーズンあたり約 108 g/10a)

6. 作物残留試験結果

(1) 分析の概要

① 分析対象の化合物

ノバルロン

② 分析法の概要

試料を含水アセトニトリルで抽出した後、C18 ミニカラム及び NH2 ミニカラムで精製し、高速液体クロマトグラフ（UV 検出器）を用いて定量する。

定量限界 0.01 ppm。

なお、米国においては、資料を含水メチルアルコールで抽出した後、NH2 ミニカラムで精製し、ガスクロマトグラフ（EC 検出器）を用いて定量する方法を採用している。

定量限界 0.05 ppm

(2) 作物残留試験結果

① キャベツ

キャベツを用いた作物残留試験(2例)において、8.5%乳剤の2,000倍希釈液を3回散布(200L/10a)したところ、散布後7～21日の最大残留量は0.28, 0.32 ppmであった。

② なす

なすを用いた作物残留試験(2例)において、8.5%乳剤の2,000倍希釈液を4回散布(183～210L/10a)したところ、散布後1～7日の最大残留量は0.12, 0.16 ppmであった。

③ トマト

トマトを用いた作物残留試験(2例)において、8.5%乳剤の2,000倍希釈液を4回散布(200～323L/10a)したところ、散布後1～7日の最大残留量は0.16, 0.32 ppmであった。

④ てんさい

てんさいを用いた作物残留試験(2例)において、8.5%乳剤の2,000倍希釈液を2

回散布（300 L/10a）したところ、散布後7～21日の残留量はいずれも0.01ppm未満であった。

注1) 最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、それぞれの試験から得られた残留量。

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）

また、米国において使用条件に適合した作物残留試験が4カ所において実施されており各地におけるノバルロンの平均残留量は0.734ppm、0.774ppm、0.503ppm、0.670ppmであった。

なお、これらの試験結果の概要については、別紙1を参照。

7. ADIの評価

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号及び第2項の規定に基づき、平成17年2月28日付け厚生労働省発食安第0228001号及び平成18年7月1日付け厚生労働省発食安第0718009号により食品安全委員会あて意見を求めたノバルロンに係る食品健康影響評価（案）について、以下のとおり評価されている。

無毒性量：1.1 mg/kg 体重/day

（動物種） ラット

（投与方法） 混餌投与

（試験の種類） 慢性毒性/発がん性併合試験

（期間） 52週間（慢性毒性）/24ヵ月間（発がん性）

安全係数：100

ADI : 0.011 mg/kg 体重/day

8. 諸外国における状況

コーデックス、米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーランドについて調査した結果、米国において、ばれいしょ、りんご等に基準値が設定されており、オーストラリアにおいて綿実等に基準値が設定されている。また、本年国際基準がりんご、なし等に設定された。

9. 基準値案

（1）残留の規制対象

ノバルロン本体

（2）基準値案

別紙2のとおりである。

なお、別添中の「基準値現行」の欄において 0.02ppm の基準値を設定している農産物は、本来、食品衛生法第 11 条第 3 項の規定に基づき、「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」(一律基準) である 0.01ppm で規制するところ、分析法の状況を考慮し、0.01ppm までの分析が困難と考えられたことから 0.02ppm の残留基準を設定したものである。今回、本剤については 0.01ppm までの分析が可能となったことから、0.02ppm の基準を削除し、一律基準 0.01ppm で規制することとした。

(3) 暴露評価

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定される量のノバルロンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算される、1 日当たり摂取する農薬の量（推定摂取量(EDI)）の A D I に対する比は、以下のとおりである。

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全くないとの仮定の下に行った。

	推定摂取量／ADI (%) ^{注)}
国民平均	21.6
幼小児（1～6 歳）	61.8
妊婦	21.9
高齢者（65 歳以上）	21.1

注) 作物残留試験成績がある食品については EDI 試算、それ以外の食品については TMDI 試算を行った。なお、「牛の筋肉」等畜産物については、JMPR において評価がなされていることから、EDI 試算を行うにあたって、同評価に採用されている「管理試験の中央値 (STMR ; Supervised trial median residue)」を用い、国内の食品摂取量に基づき評価を実施した。本剤の評価に当たっては、食肉中の筋肉及び脂肪についてそれぞれの摂取比率を 80%、20% として試算した。また、高齢者における畜産物の摂取量は国民栄養調査結果の特別集計を依頼していなかったことから得られていないため、「国民平均」の値を用いた。

(4) 本剤については、平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号により、食品一般の成分規格 7 に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。

(別紙 1)

我が国におけるノバルロン作物残留試験成績一覧表

農作物	試験圃 場数	試験条件（申請範囲に限る。）				最大残留量 (ppm)
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
キャベツ	2	8.5% 乳剤	2,000 倍散布 200L/10a	3回	7, 14, 21 日	圃場 A:0.28 圃場 B:0.32
なす	2	8.5% 乳剤	2,000 倍散布 200, 300L/10a	4回	1, 3, 7 日	圃場 A:0.12 圃場 B:0.16 (4回、3日)
トマト	2	8.5% 乳剤	2,000 倍散布 250L/10a	4回	1, 3, 7 日	圃場 A:0.16 圃場 B:0.32
てんさい	2	8.5% 乳剤	2,000 倍散布 300L/10a	2回	1, 3, 7 日	圃場 A:<0.01 圃場 B:<0.01

米国におけるノバルロン残留試験成績一覧表

農作物	試験圃 場数	試験条件（申請範囲に限る。）				最大残留量 (ppm)
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
りんご	4	7.5% 顆粒水和剤	89 倍希釈 43.9~45.0L/10a 93 倍希釈 46.8~47.0L/10a 96 倍希釈 48.1~49.9L/10a 98 倍希釈 49.9~50.2L/10a	3回	14 日	0.734ppm 0.774ppm 0.503ppm 0.670ppm

農産物名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	作物残留試験成績 ppm	
米(玄米をいう)		0.02					
小麦		0.02					
大麦		0.02					
ライ麦		0.02					
どうもろこし		0.02					
そば		0.02					
その他の穀類		0.02					
大豆		0.02					
小豆類(いんげん、ささげを含む※)		0.02					
えんどう		0.02					
そらまめ		0.02					
らっかせい		0.02					
その他の豆類		0.02					
ばれいしょ	0.05	0.05		0.01	0.05	アメリカ	<0.01 (14data)
さといも類(やつがしらを含む)	0.05	0.05			0.05	アメリカ	
かんしょ	0.05	0.05			0.05	アメリカ	
やまいも(長いもをいう)	0.05	0.05			0.05	アメリカ	
こんにゃくいも		0.02					
その他のいも類	0.05	0.05			0.05	アメリカ	
てんさい	0.05	0.02	申				<0.01, <0.01
さとうきび		0.02					
だいこん類(ラディッシュを含む)の根		0.02					
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉		0.02					
かぶ類の根		0.02					
かぶ類の葉		0.02					
西洋わさび		0.02					
クレソン		0.02					
はくさい		0.02					
キャベツ	1	1	○		0.50	アメリカ	
芽キャベツ		0.02			0.50	アメリカ	
ケール		0.02			0.50	アメリカ	
こまつな		0.02					
きょうな		0.02					
ちんげんさい		0.02					
カリフラワー		0.02			0.50	アメリカ	
ブロッコリー		0.02			0.50	アメリカ	
その他のあぶらな科野菜		0.02			0.50	アメリカ	
ごぼう		0.02					
サルシフィー		0.02					
アーティチョーク		0.02					
チコリ		0.02					
エンダイブ		0.02					
しゅんぎく		0.02					
レタス(サラダ菜及びちしやを含む)		0.02					
その他のきく科野菜		0.02					
たまねぎ		0.02					
ねぎ(リーキを含む)		0.02					
にんにく		0.02					
にら		0.02					
アスパラガス		0.02					
わけぎ		0.02					
その他のゆり科野菜		0.02					
にんじん		0.02					
パースニップ		0.02					
パセリ		0.02					
セロリ		0.02					
みつば		0.02					
その他のせり科野菜		0.02					
トマト	1	1	○	0.02			0.15, 0.32
ピーマン		0.02					

なす その他のなす科野菜	0.5	0.5 0.02	○				0.12, 0.16
きゅうり(ガーベルを含む) かぼちゃ(スカッシュを含む) しろとうり すいか メロン類果実 まくわうり その他のうり科野菜		0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05					
ほうれん草 たけのこ オクラ しょうが 未成熟えんどう 未成熟いんげん えだまめ		0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02			0.05	アメリカ	
マッシュルーム しいたけ その他のきのこ類	0.05	0.02 0.02 0.02			0.05	アメリカ	
その他の野菜	0.05	0.05			0.05	アメリカ	
みかん なつみかん なつみかんの外果皮 なつみかんの果実全体 レモン オレンジ(ネーブルオレンジを含む) グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実		0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02					
りんご 日本なし 西洋なし マルメロ びわ	3	1	申	3	2.0	アメリカ	0.734, 0.774, 0.503, 0.670
もも ネクタリン あんず(アプリコットを含む) すもも(ブルーンを含む) うめ おうとう(チェリーを含む)		0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02					
いちご ラズベリー ブラックベリー ブルーベリー クランベリー ハックルベリー その他のベリー類果実		0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02					
ぶどう かき		0.02 0.02					
バナナ キウイ パパイヤ アボカド パイナップル グアバ マンゴー ¹ パッションフルーツ なつめやし		0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02					
その他の果実		0.02					
ひまわりの種子 ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード		0.02 0.02 0.02 1 0.02 0.02		0.5			

ぎんなん		0.02				
くり		0.02				
ペカン		0.02				
アーモンド		0.02				
くるみ		0.02				
その他のナッツ類		0.02				
茶		0.02				
コーヒー豆		0.02				
カカオ豆		0.02				
ホップ		0.02				
その他のスパイス	0.05	0.05				
その他のハーブ	0.05	0.05				
牛の筋肉	0.7	0.6	0.7	0.60	アメリカ	
豚の筋肉	0.7	0.01	0.7	0.01	アメリカ	
その他の陸棲哺乳類の筋肉	0.7	0.6	0.7	0.60	アメリカ	
牛の脂肪	10	10	10	11	アメリカ	
豚の脂肪	10	0.05	10	0.05	アメリカ	
その他の陸棲哺乳類の脂肪	10	10	10	11	アメリカ	
牛の肝臓	0.7	1	0.7	1.0	アメリカ	
豚の肝臓	0.7	0.01	0.7	0.01	アメリカ	
その他の陸棲哺乳類の肝臓	0.7	1	0.7	1.0	アメリカ	
牛の腎臓	0.7	1	0.7	1.0	アメリカ	
豚の腎臓	0.7	0.01	0.7	0.01	アメリカ	
その他の陸棲哺乳類の腎臓	0.7	1	0.7	1.0	アメリカ	
牛の食用部分	0.7	0.6	0.7	0.60	アメリカ	
豚の食用部分	0.7	0.01	0.7	0.01	アメリカ	
その他の陸棲哺乳類の食用部分	0.7	0.6	0.7	0.60	アメリカ	
乳	0.4	1	0.4	1.0	アメリカ	
鶏の筋肉	0.01	0.03	0.01	0.03	アメリカ	
その他の家きんの筋肉	0.01	0.03	0.01	0.03	アメリカ	
鶏の脂肪	0.01	0.4	0.01	0.40	アメリカ	
その他の家きんの脂肪	0.01	0.4	0.01	0.4	アメリカ	
鶏の肝臓	0.01	0.04	0.01	0.04	アメリカ	
その他の家きんの肝臓	0.01	0.04	0.01	0.04	アメリカ	
鶏の腎臓	0.01	0.04	0.01	0.04	アメリカ	
その他の家きんの腎臓	0.01	0.04	0.01	0.04	アメリカ	
鶏の食用部分	0.01	0.04	0.01	0.04	アメリカ	
その他の家きんの食用部分	0.01	0.04	0.01	0.04	アメリカ	
鶏の卵	0.01	0.05	0.01	0.05	アメリカ	
その他の家きんの卵	0.01	0.05	0.01	0.05	アメリカ	

※: いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタビア豆、バター豆、ベギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。

(別紙3)

ノバルロン推定摂取量(単位: $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$)

食品群	基準値案 (ppm)	暴露評価に 用いた数値 (ppm)	国民平均		高齢者 (65歳以上) TMDI	妊娠 TMDI	妊娠 推定一日摂取量	幼小児 (1~6歳) TMDI	幼小児 (1~6歳) 推定一日摂取量
			国民平均 TMDI	推定一日摂取量 TMDI					
ばれいしょ さ比利も類(やつがくらを含む)	0.05	0.01	1.8	0.4	1.4	0.3	2.0	0.4	1.1
かんじょ やまいも(長いも)	0.05	•0.05	0.6	0.6	0.9	0.9	0.4	0.4	0.3
その他いも類	0.05	•0.05	0.1	0.1	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9
てんさい キャベツ	0.05	•0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
トマト なす	1	0.3	22.8	6.8	19.9	6.0	22.9	6.9	9.8
その他うり科野菜 しよぶが	0.05	•0.05	24.3	5.8	18.9	4.5	24.5	5.9	16.9
その他の野菜	0.05	•0.05	2.0	0.6	2.9	0.8	1.7	0.5	4.1
りんご 西洋なし	3	0.65	105.9	22.9	106.8	23.1	90.0	19.5	108.6
マルメロ びわ	3	0.65	15.3	3.3	15.3	3.3	15.9	3.4	13.2
綿葉	3	•3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3
その他のスパイズ	0.05	•0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のハーブ	0.05	•0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陸棲哺乳類の肉類	筋肉0.7/ 脂肪10	筋肉0.19/脂 肪4.1	562.0	54.6	562.0	55.5	597.0	58.0	324.0
陸棲哺乳類の内臓	0.7	0.26	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	0.2	0.4
陸棲哺乳類の乳類	0.4	0.2	57.1	28.5	57.1	28.5	73.2	36.6	78.8
家禽の肉類	0.01	0.005	8.1	0.1	8.1	0.1	6.5	0.1	7.4
家禽の卵類	0.01	0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	1.5
計			805.0	126.5	798.4	125.9	838.8	134.1	564.5
ADI比(%)			137.3	21.6	133.9	21.1	137.1	21.9	324.8
									61.8

※:個別の作物残留試験成績がなく、基準値(案)の数値を用いたものは(•)を入れた。

※※:「牛の筋肉」等畜産物については、TMDI計算では「牛・豚・その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉及び脂肪」等の摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗じた。また、高齢者における畜産物の摂取量は国民栄養調査結果の特別集計を依頼していかなかったことから得られていないため、「国民平均」の値を用いた。

TMDI: 理論最大1日摂取量(Theoretical Maximum Daily Intake)

EDI: 推定1日摂取量(Estimate Daily Intake)