


危険因子が重なるほど脳卒中、心疾患を発症する危険が増大する



23

脳・心臓疾患に至る経過

血管障害を起している職員ほとんどがこのような経過を辿っている

A氏 54歳 脳梗塞

	34歳	35歳	36歳	37歳	38歳	39歳	40歳	41歳	42歳	43歳	44歳	45歳	46歳	47歳	48歳	49歳	50歳	51歳	52歳	53歳	54歳
検査結果	BMI25以上(肥満)																				
											高中性脂肪										
											高血圧										
											高尿酸										
											低HDL										
治療											高LDL										
											一過性脳虚血治療										
											左脳梗塞治療										

B氏 57歳 心筋梗塞

	37歳	38歳	39歳	40歳	41歳	42歳	43歳	44歳	45歳	46歳	47歳	48歳	49歳	50歳	51歳	52歳	53歳	54歳	55歳	56歳	57歳
検査結果	BMI25以上(肥満)																				
											高GPT										
											高血圧										
											高中性脂肪										
											低HDL										
心電図											高血糖										
											陰性T波										
											反時計方向回転										
											ST-T異常										
治療											異常Q波										
											陈旧性心筋梗塞治療										

(生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会 尼崎市野口緑氏提出資料より)