

5.2 使用していたマスク・ゴーグルは使用後直ちに外す。その際に汚染した表面に触れないようにし、直ちに手洗いをする。(III A)

6 銳利器材

- 6.1 処置に際しては、安全装置付き器材を使用する。また、安全装置付き器具は教育・研修の実施後に導入する。¹³⁰(II A)
- 6.2 手術時の銳利器材の受け渡しにはハンズフリー技術を用い、手での直接の受け渡しを避けた方が良い。(III B)
- 6.3 注射針はリキャップを行わない。¹³¹(III A)
- 6.4 耐貫通性専用廃棄缶(廃棄容器)は密閉可能で、容易に手が届く場所に設置する。¹³²(III A)
- 6.5 使用後の銳利器材は直ちに専用廃棄容器に廃棄する。¹³³(III A)
- 6.6 廃棄容器をあふれるほどいっぱいにしてはならない。八分目に達した際に容器を交換廃棄する方が良い。¹³³(III B)
- 6.7 廃棄容器を移動させる時や交換する時には蓋をする方が良い。(III B)
- 6.8 職業感染予防策の教育・研修を提供する。¹³⁴(II A)
- 6.9 針刺し・切創事故発生後の対応をマニュアル化する。(IV A)

¹⁰⁴ Mortimer EA Jr, Lipsitz PJ, Wolinsky E, Gonzaga AJ, Rammelkamp CH Jr. Transmission of staphylococci between newborns. Importance of the hands to personnel. Am J Dis Child. 1962;104:289-95.

¹⁰⁵ Larson E. A causal link between handwashing and risk of infection? Examination of the evidence. Infect Control. 1988;9:28-36.

¹⁰⁶ Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, et al. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Infection Control Programme. Lancet. 2000;356:1307-1312.

¹⁰⁷ Ehrenkranz NJ, Alfonso BC. Failure of bland soap handwash to prevent hand transfer of patient bacteria to urethral catheters. Infect Control Hosp Epidemiol. 1991 Nov;12:654-62.

¹⁰⁸ McFarland LV, Mulligan ME, Kwok RY, Stamm WE. Nosocomial acquisition of Clostridium difficile infection. N Engl J Med. 1989 Jan 26;320:204-10.

¹⁰⁹ Casewell M, Phillips I. Hands as route of transmission for Klebsiella species. Br Med J. 1977 Nov 19;2(6098):1315-7.

¹¹⁰ Mortimer EA Jr, Lipsitz PJ, Wolinsky E, Gonzaga AJ, Rammelkamp CH Jr. Transmission of staphylococci between newborns. Importance of the hands to personnel. Am J Dis Child. 1962 Sep;104:289-95.

¹¹¹ Patarakul K, Tan-Khum A, Kanha S, Padungpean D, Jaichaiyapum OO. Cross-sectional survey of hand-hygiene compliance and attitudes of health care workers and visitors in the intensive care units at King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S287-93.

¹¹² Ojajarvi J. Effectiveness of hand washing and disinfection methods in removing transient bacteria after patient nursing. J Hyg (Camb). 1980; 85: 193-203.

¹¹³ McFarland LV, Mulligan ME, Kwok RY, Stamm WE. Nosocomial acquisition of Clostridium difficile infection. N Engl J Med. 1989 Jan 26;320:204-10.

¹¹⁴ Won SP, Chou HC, Hsieh WS, et al. Handwashing program for the prevention of