

	呼吸器	接触		抗生剤中止・培養陰性となるまで
	肺炎球菌性	標準		
	皮膚、創部、熱傷	接触		抗生剤中止・培養陰性となるまで
	たむし(皮膚真菌症、白癬)	標準		
	炭疽症			
	皮膚	標準		
	肺	標準		
	単純ヘルペス			
	脳炎	標準		
	新生児	接触	罹病期間中	
	粘膜皮膚、播種性あるいは原発性、重症	接触	罹病期間中	
	粘膜皮膚、再発性(皮膚、口、性器)	標準		
ち	チフス、風土病性および流行性	標準		
	腸炎、クロストリジウムディフィシル	接触	罹病期間中	
	腸炎ビブリオ(⇒胃腸炎)			
	腸球菌(⇒多剤耐性菌、易学的に重要なバンコマイシン耐性なら)			
	腸チフス(⇒胃腸炎)			
て	手足口病(⇒エンテロウイルス)			
	伝染性紅斑(⇒パルボウイルスB19)			
	伝染性単核症	標準		
	伝染性軟属腫	標準		
	デング熱	標準		
と	トキシックショック症候群(ブドウ球菌性)	標準		
	トキソプラズマ症	標準		
	突発性発疹	標準		
	トラコーマ、急性	標準		
	トリコモナス症	標準		
な	軟性下疳	標準		
に	尿路感染症(腎盂腎炎を含む)	標準		
ね	猫ひっかき病(良性接種性リンパ細網症)	標準		
	熱傷皮膚症候群、ブドウ球菌性(リッター病)	標準		
の	脳炎・脳脊髄膜炎(⇒特殊病原体)			
	脳痲疹	接触	有効な治療開始 後24時間まで	