

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

副作用等の大分類有害事象別・報告年度別一覧
(販売開始^{注)}から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

副作用等の種類 (大分類)	合計	2000年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度
合計	1465	5	100	259	219	232	492	158
血液およびリンパ系障害	69		8	19	8	16	13	5
心臓障害	36		3	4	4	9	14	2
先天性、家族性および遺伝性障害	4				1		1	2
耳および迷路障害	7					1	5	1
眼障害	22		2	3	4	3	9	1
胃腸障害	169	1	14	28	24	35	59	8
全身障害および投与局所様態	109		15	27	8	15	37	7
肝胆道系障害	118		12	23	24	18	34	7
免疫系障害	37		1	6	11	5	12	2
感染症および寄生虫症	19	1	4	3	2	3	3	3
傷害、中毒および処置合併症	8			1		1	3	3
臨床検査	77		7	17	7	22	22	2
代謝および栄養障害	19		2	3	1	4	8	1
筋骨格系および結合組織障害	29		1	8	5	3	10	2
良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む)	1				1			
神経系障害	197		7	29	32	31	70	28
妊娠、産褥および周産期の状態	3				2	1		
精神障害	249	1	3	19	24	16	115	71
腎および尿路障害	55		6	14	12	3	16	4
生殖系および乳房障害	7		1	1	2	1	2	
呼吸器、胸郭および縦隔障害	46	1	3	7	10	11	11	3
皮膚および皮下組織障害	161	1	11	37	34	27	45	6
血管障害	23			10	3	7	3	

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

副作用等の大分類有害事象別・年齢別一覧
(販売開始^{注)}から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

副作用等の種類 (大分類)	合計	0~9歳	10~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	不明
合計	1465	329	255	133	158	115	122	108	125	95	25
血液およびリンパ系障害	69	9	5	5	11	3	6	10	9	10	1
心臓障害	36	7		4	6	5	4	4	4	2	
先天性、家族性および遺伝性障害	4	3		1							
耳および迷路障害	7	2	2					2			1
眼障害	22	3	6	3	2	3	1	1	2	1	
胃腸障害	169	42	20	20	25	12	20	5	9	12	4
全身障害および投与局所様態	109	23	15	10	17	9	14	7	7	3	4
肝胆道系障害	118	11	7	9	19	14	8	22	16	11	1
免疫系障害	37	6	5	8	8	5	3			1	1
感染症および寄生虫症	19	2	1	2	2	2	4	1	2	2	1
傷害、中毒および処置合併症	8	1	5	1					1		
臨床検査	77	5	4	15	6	2	13	7	11	12	2
代謝および栄養障害	19	1	2		1		3	1	6	5	
筋骨格系および結合組織障害	29	8	4		4	4	3	2	2	2	
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	1									1	
神経系障害	197	53	54	12	17	13	14	16	12	4	2
妊娠、産褥および周産期の状態	3				3						
精神障害	249	96	91	8	4	9	9	3	14	14	1
腎および尿路障害	55	7	5	6	9	5	3	2	8	8	2
生殖系および乳房障害	7		1	2	2	2					
呼吸器、胸郭および縦隔障害	46	8	3	7	1	6	3	4	7	6	1
皮膚および皮下組織障害	161	40	19	19	15	21	13	16	13	1	4
血管障害	23	2	6	1	6		1	5	2		

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^注から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

副作用等の種類	合計	0~9歳	10~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	不明
合計	446	149	145	20	21	22	23	19	26	18	3
神経系障害	197	53	54	12	17	13	14	16	12	4	2
ジスキネジー	2		1	1							
てんかん	1		1								
ミオクローヌス	2		1								
意識レベルの低下	52	16	24	1	1	1	3	3	3	1	
意識消失	14		2	1	2	4	1	4			
感覚障害	1							1			
感覚鈍麻	6	2		1	2	1					
眼振	1					1					
顔面神経麻痺	1				1						
記憶障害	1	1									
協調運動異常	1	1									
傾眠	3	1	2								
計算力障害	1		1								
健忘	2		1		1						
構音障害	1	1									
構語障害	1	1									
硬膜下ヒグローム	1	1									
昏睡	1		1								
坐骨神経痛	1	1									
視野欠損	3		1			1	1				
失語症	1	1									
失神	8		3	2			2			1	
書字障害	1	1									
振戦	3			1			1				
全健忘	1										
大発作痙攣	2	1				1					
知覚過敏	1					1					
低血糖昏睡	1										
糖尿病性高浸透圧性昏睡	1							1		1	
糖尿病性昏睡	1								1		
頭痛	4	1				2		1			

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^{注)}から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

頭部不快感	1						1						
認知症	1												
認知不能症	1		1								1		
脳炎	1				1								
脳血栓	1								1				
脳症	1	1											
反射減弱	1												
浮動性めまい	9	5	1			1							
部分発作	1	1											
平衡障害	1												
片頭痛	1	1											
末梢性ニューロパシー	1												
味覚異常	10		1		2	3			3			1	
味覚消失	1												
無表情	1		1										
無嗅覚	1												
嗅覚錯誤	1												
嗜眠	3	1	1										
痙攣	40	15	11		2	1	2	3	3		2		1
精神障害	249	96	91		8	4	9	9	3		14	14	1
うつ病	3						2						
悪夢	6		2									1	
異常行動	77	30	37		1	1	1	1	2		2	2	
感情不安定	1												
気分変動	1					1							
激越	12	7	4					1					
幻覚	44	22	13					1					
幻視	4	3	1								4	4	
幻聴	2		2										
高揚状態	1	1											
錯覚	1		1										
錯乱状態	4	1	3										
自殺企図	3		2		1								
自殺既遂	2												
自殺念慮	1							1		1			

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^注から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

自傷行動	2		1			1				
失見当識	3	2	1							
情動障害	1		1							
神経症	1		1							
精神症状	6	2			1			3		
精神障害	3	1	1		1					
多幸気分	1				1					
退行行動	1		1							
統合失調症	1		1							
表出性言語障害	1	1								
不安	2					1				
不機嫌	1	1							1	
不眠症	1				1					
無感情	2	1	1							
妄想	9	2	4						3	
落ち着きのなさ	10	4	2				2		2	
離人症	1		1							
譫妄	40	18	11		1				3	
躁病	1				1					6
										1

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^{注)}から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

2000年度

副作用等の種類	合計	0~9歳	10~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	不明
合計	1	1									
精神障害	1	1									
激越	1	1									

2001年度

副作用等の種類	合計	0~9歳	10~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	不明
合計	10	2		1	2		1		1	2	1
神経系障害	7	1		1	2		1		1		1
感覚鈍麻	1				1						
振戦	1										1
低血糖昏睡	1								1		
糖尿病性高浸透圧性昏睡	1						1				
浮動性めまい	1	1									
味覚異常	2			1	1						
精神障害	3	1								2	
幻覚	3	1								2	

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^注)から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

2002年度

副作用等の種類	合計	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	不明
合計	48	19	14		2	1	1		10	1	
神経系障害	29	11	9		2	1	1		5		
ジスキネジー	1		1								
意識レベルの低下	3	2					1				
意識消失	1		1								
感覚鈍麻	3	2			1						
協調運動異常	1	1									
構語障害	1	1									
視野欠損	1					1					
失神	2		2								
大発作痙攣	1				1						
糖尿病性昏睡	1								1		
認知不能症	1		1								
反射減弱	1								1		
浮動性めまい	3	2	1								
片頭痛	1	1									
末梢性ニューロパシー	1								1		
味覚異常	1		1								
無表情	1		1								
嗜眠	1								1		
痙攣	4	2	1						1		
精神障害	19	8	5						5	1	
激越	1	1									
幻覚	6	3	1						1	1	
高揚状態	1	1									
無感情	1		1								
妄想	2	1							1		
落ち着きのなさ	2								2		
離人症	1		1								
譫妄	5	2	2						1		

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^注から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

2003年度

副作用等の種類	合計	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	不明
合計	56	20	17	4	5		1	3	4	2	
神経系障害	32	9	11	3	4		1	3		1	
ミオクローヌス	1		1								
意識レベルの低下	9	3	6								
意識消失	1							1			
記憶障害	1	1									
傾眠	1		1								
坐骨神経痛	1	1									
視野欠損	2		1		1						
失神	2		1	1							
書字障害	1	1									
全健忘	1										
知覚過敏	1				1					1	
脳血栓	1							1			
浮動性めまい	1				1						
部分発作	1	1									
味覚異常	2			1	1						
痙攣	6	2	1	1			1	1			
精神障害	24	11	6	1	1				4	1	
異常行動	5	3	2								
気分変動	1			1							
幻覚	3		1						2		
幻視	1	1									
失見当識	1	1									
精神障害	1	1									
統合失調症	1		1								
表出性言語障害	1	1									
不安	1				1						
不機嫌	1	1									
無感情	1	1									
妄想	3		1						2		
譫妄	4	2	1							1	

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^{注)}から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

2004年度

副作用等の種類	合計	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	不明
合計	47	11	14	1	5	4	4	3	1	4	
神経系障害	31	6	7	1	4	4	4	3	1	1	
てんかん	1		1								
ミオクローヌス	1										
意識レベルの低下	6		3	1			1	1			1
意識消失	5		1		1	2	1				
眼振	1					1					
顔面神経麻痺	1				1						
傾眠	1	1									
頭痛	1				1						
認知症	1								1		
浮動性めまい	3	1					2				
味覚異常	2				1					1	
嗜眠	1	1									
痙攣	7	3	2			1		1			
精神障害	16	5	7		1					3	
うつ病	1										1
異常行動	2		2								
幻覚	5	2	3								
幻視	1	1									
幻聴	1		1								
精神障害	1				1						
不安	1										
譫妄	4	2	1							1	

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^{注)}から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

2005年度

副作用等の種類	合計	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	不明
合計	185	69	53	6	4	15	15	9	7	6	1
神経系障害	70	16	17	5	3	7	7	9	4	2	
ジスキネジー	1			1							
意識レベルの低下	23	6	10			1	1	2	3		
意識消失	6			1	1		2	2			
感覚障害	1							1			
感覚鈍麻	1					1					
健忘	2		1		1						
構音障害	1	1									
硬膜下ヒグローム	1	1									
失語症	1	1									
失神	3			1			1			1	
振戦	1						1				
大発作痙攣	1	1									
頭痛	2					1		1			
頭部不快感	1							1			
脳炎	1			1							
脳症	1	1									
浮動性めまい	1	1									
味覚異常	3								2		1
味覚消失	1							1			
無嗅覚	1							1			
嗅覚錯誤	1								1		
痙攣	16	4	6	1		1	2	1	1		

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^注)から平成19年3月20日まで

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

精神障害	115	53	36	1	1	8	8		3	4	1
うつ病	2					2					
悪夢	4						4				
異常行動	36	18	15			1			1	1	
激越	8	3	4			1					
幻覚	19	12	4			1			1	1	
幻視	1	1									
錯乱状態	3	1	2								
自殺既遂	1						1				
自殺念慮	1					1					
失見当識	1	1									
情動障害	1		1								
精神症状	6	2			1			3			
精神障害	1		1								
退行行動	1		1								
妄想	3		3								
落ち着きのなさ	8	4	2			2					
譫妄	18	11	3						1	2	1
躁病	1			1							

リン酸オセルタミビル 中外製薬(株)からの症例報告

「大分類:精神障害、神経系障害」における副作用等の年齢区分別一覧
(販売開始^{注)}から平成19年3月20日まで)

注)タミフルカプセル75:2001年2月
タミフルドライシロップ:2002年7月

2006年度

副作用等の種類	合計	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	不明
合計	99	27	47	8	3	2	1	4	3	3	1
神経系障害	28	10	10	2	2	1		1	1		1
意識レベルの低下	11	5	5		1						
意識消失	1							1			
感覚鈍麻	1			1							
傾眠	1		1								
計算力障害	1		1								
昏睡	1		1								
失神	1					1					
振戦	1			1							
頭痛	1	1									
平衡障害	1								1		
嗜眠	1		1								
痙攣	7	4	1		1						1
精神障害	71	17	37	6	1	1	1	3	2	3	
悪夢	2		2								
異常行動	34	9	18	1	1			2	1	1	
感情不安定	1			1							
激越	2	2									
幻覚	8	4	4								
幻視	1		1								
幻聴	1		1								
錯覚	1		1								
錯乱状態	1		1								
自殺企図	3		2	1							
自殺既遂	1							1			
自傷行動	2		1			1					
失見当識	1		1								
神経症	1		1								
多幸気分	1			1							
不眠症	1			1							
妄想	1	1									
譫妄	9	1	4	1					1	2	