（様式第２（三））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-05000146		第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル			該当なし	
治療歴					関連する過去の医薬品使用歴				
原疾患・合併症・既往歴	治療開始日	治療終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用（発現した場合のみ）
インフルエンザ	05/02/10	継続	インフルエンザ（B型）（原疾患）	外来、職業 [redacted]					
								MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（四））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　評価に関する情報　　4／5

識別番号・報告回数	B-05000146	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル			該当なし	
医薬品を入手した国（承認国）	医薬品販売名（Lot）	一般的名称	医薬品に対して取られた処置	開始日	終了日	投与開始から発現までの時間間隔	投与終了から発現までの時間間隔	再投与による再発の有無	再投与により再発した副作用名
1. 日本（日本）	タミフル	リン酸オセルタミビル	投与中止	05/02/12	05/02/12			無	
2. 日本（日本）	タミフル	リン酸オセルタミビル		05/02/13	05/02/13				
3. 日本	カロナール	アセトアミノフェン		05/02/12	05/02/13				

評価対象となる副作用／有害事象名	評価の情報源	医薬品と副作用／有害事象の因果関係（評価方法）	評価結果	医薬品に関するその他情報
1. 意識消失	REPORTER		関連あるかも/わずかに関連	1. タミフル：
意識消失	COMPANY		関連あるかも/わずかに関連	2. タミフル： 3. カロナール：
2.				
3.				

報告された死因	剖検	剖検による死因	
		MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（五））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　母子に関する情報

識別番号・報告回数	B-05000146	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル		該当なし
関連報告番号			親の年齢	親の身長 cm	親の体重 kg	副作用／有害事象名 意識消失、 意識消失
親の略名	親の性別		最終月経日			
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間			

親の関連する治療歴及び随伴状態				親の関連する過去の医薬品使用歴				
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用（発現した場合のみ）

親の関連する治療歴及び随伴状態（副作用／有害事象を除く）

MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（一））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）

識別番号・報告回数	B-05000160	第2報	関連報告番号		非重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
最新情報入手日	2005年04月21日		第一報入手日	2005年03月09日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が必要なもの 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの その他の医学的に重要な状態		報告された死因（死亡の場合）		
副作用	30日	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・既往歴					
発現国(情報源)	日本（日本）			インフルエンザ					
患者略名	[redacted]	体重 Kg							
性別	女性								新医薬品等の区分 該当なし
年齢	6[redacted]歳		曝露時の妊娠期間						

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量 投与量/回　回数	投与期間 開始日	投与期間 終了日	医薬品使用理由
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	CAP	75mg/2回 1日	05/03/04	05/03/05	インフルエンザ
UNKNOWNDRUG	アセトアミノフェン	O	経口	POR	（不明）			

副作用／有害事象

重要性	副作用／有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用／有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの時間間隔	最終投与からの時間間隔	転帰
重・非	筋痛 （両上肢脱力を伴う筋肉痛）	筋痛		05/03/05				未
重・非	感覚障害 （上半身皮膚知覚異常）	感覚異常		05/03/05				未

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

身長、体重[redacted]
2005/03/04
インフルエンザ確定診断実施せず。発症時の自他覚所見：発熱、関節痛
インフルエンザに対して、本剤150mg/日投与開始（～3/5）。
2005/03/05
両上肢脱力を伴う筋肉痛、上半身皮膚知覚異常発現。（重篤でない軽微でない）

MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（二））
医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）

識別番号・報告回数	B-05000160	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし

担当医等の意見	報告企業等の意見
インフルエンザに伴う末梢神経障害の可能性がある。 （神経内科専門医による精査中）	情報不足により評価困難である。

今後の対応

今後とも同様な副作用症例の収集に努め、的確に評価し対応を行う。

送信者による診断名／症候群及び／又は副作用／有害事象の再分類	第一次情報源により報告された副作用／有害事象
	両上肢脱力を伴う筋肉痛、 上半身皮膚知覚異常

累積報告件数・使用上の注意記載状況等

詳細調査を試みたが担当医の協力が得られないため、本情報をもって完了報告とする。
1. 使用上の注意記載状況
筋痛：記載なし　　PDR, CDS:記載なし
感覚異常：記載なし　　PDR, CDS:記載なし
2. 累積報告件数
筋痛：（国内）7件（今回の報告を含む）　　（外国）報告なし
感覚異常：（国内）1件（今回の報告を含む）　　（外国）2件

引用文献	資料一覧

MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（三））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　検査及び処置の結果

識別番号・報告回数	B-05000160	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし

検査	単位	正常範囲低値	正常範囲高値	不明1									

その他の情報の有無	

診断に関連する検査及び処置の結果
副作用等に関連のある臨床検査値等を入手できなかった。

MedDRA	Version (9.1)

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-05000160	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし

治療歴					関連する過去の医薬品使用歴				
原疾患・合併症・既往歴	治療開始日	治療終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用（発現した場合のみ）
インフルエンザ		継続	原疾患	職業 [redacted]					

MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（四））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　評価に関する情報

識別番号・報告回数	B-05000160	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル			該当なし	
医薬品を入手した国（承認国）	医薬品販売名（Lot）	一般的名称	医薬品に対して取られた処置	開始日	終了日	投与開始から発現までの時間間隔	投与終了から発現までの時間間隔	再投与による再発の有無	再投与により再発した副作用名
1. 日本（日本）	タミフル	リン酸オセルタミビル	投与中止	05/03/04	05/03/05				
2. 日本	UNKNOWNDRUG	アセトアミノフェン	不明						

評価対象となる副作用／有害事象名	評価の情報源	医薬品と副作用／有害事象の因果関係（評価方法）	評価結果	医薬品に関するその他情報
1. 筋痛	REPORTER		関連あるかも/わずかに関連	1. タミフル：
感覚障害	REPORTER		関連あるかも/わずかに関連	2. UNKNOWNDRUG：
筋痛	COMPANY		関連あるかも/わずかに関連	
感覚障害	COMPANY		関連あるかも/わずかに関連	
2.				

報告された死因	剖検	剖検による死因	
		MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（五））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　母子に関する情報　　5／5

識別番号・報告回数	B-05000160	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル		該当なし
関連報告番号			親の年齢	親の身長 cm	親の体重 kg	副作用／有害事象名
親の略名	親の性別		最終月経日			筋痛、 筋痛 感覚異常、 感覚障害
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間			

親の関連する治療歴及び随伴状態				親の関連する過去の医薬品使用歴				
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用（発現した場合のみ）

親の関連する治療歴及び随伴状態（副作用／有害事象を除く）

MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（一））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）

識別番号・報告回数	B-05000322	第1報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
最新情報入手日	2005年03月08日		第一報入手日	2005年03月07日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が必要なもの 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの ◎ その他の医学的に重要な状態		報告された死因（死亡の場合）		
副作用	30日	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・既往歴					
発現国(情報源)	日本（日本）			発作性夜間血色素尿症 インフルエンザ 再生不良性貧血 慢性腎不全 濃厚赤血球輸血					新医薬品等の区分 該当なし
患者略名	[redacted]	体重 Kg							
性別	男性								
年齢	5[redacted]歳		曝露時の妊娠期間						

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量 投与量/回	投与量 回数	投与期間 開始日	投与期間 終了日	医薬品使用理由
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	CAP	75mg/1回	1日	05/03/06	05/03/07	インフルエンザ
ハロテスチン	フルオキシメステロン	0	経口	TAB	4mg/3回	1日	00/11/09		
プレドニン	プレドニゾロン	0	経口	TAB	10mg/1回	1日	01/05/24		
セルベックス	テプレノン	0	経口	POR	50mg/3回	1日	01/05/24		
ユベラＮ	ニコチン酸トコフェロール	0	経口	POR	200mg/3回	1日	01/05/31		
スローケー	塩化カリウム	0	経口	SRT	600mg/2回	1日	03/01/30		
ペルサンチン	ジピリダモール	0	経口	POR	150mg/2回	1日	03/01/30		
ムコソルバン	塩酸アンブロキソール	0	経口	POR	15mg/3回	1日	05/03/04	05/03/07	
メジコン	臭化水素酸デキストロメトルファン	0	経口	POR	15mg/3回	1日	05/03/04	05/03/07	
フロモックス	塩酸セフカペンピボキシル	0	経口	TAB	100mg/3回	1日	05/03/04	05/03/07	
ＰＬ	非ピリン系感冒剤（４）	0	経口	GRA	1g/3回	1日	05/03/04	05/03/07	
ノイトロジン	レノグラスチム（遺伝子組換え）	0	皮下	INJ	100μg/1回	1日	05/03/06	05/03/06	
ロキソニン	ロキソプロフェンナトリウム	0	経口	POR	60mg/1回	1日	05/03/07	05/03/07	

副作用／有害事象

重要性	副作用／有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用／有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの時間間隔	最終投与からの時間間隔	転帰
重・重	痙攣 （全身性痙攣）	全身痙攣		05/03/07	05/03/07			軽

MedDRA　Version (9.1)

（様式第２（一））
医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）

識別番号・報告回数	B-05000322	第1報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

身長、体重不明。
2005/03/01
咳嗽等の感冒様症状出現。
2005/03/03
38℃を越える発熱出現。
2005/03/04
外来受診。ムコソルバン、メジコン、フロモックス、PL処方。ノイトロジン静注し帰宅。
2005/03/06
発熱、倦怠感持続のため救急外来受診。迅速検査にてインフルエンザB（+）。
慢性腎不全（BUN 56、Cre 6.41）に配慮し、本剤75mg/日として3日分処方。
その日に75mg服用。
2005/03/07
朝、7時頃に本剤を含む全ての薬剤を服用し、経過観察のため11時頃来院。
12時頃、トイレに行った直後に全身性の強直性痙攣が出現し、数分間持続。
その後通常状態に戻るも、痙攣の前半部の記憶は定かでない。
その日の検査でBUN 89、Cre 11.12、CRP 29.7等の増悪認めたため、他院搬送。

MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（二））
医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）

識別番号・報告回数	B-05000322	第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし

担当医等の意見	報告企業等の意見
インフルエンザの発症に伴い、予測を上回る腎機能の増悪があったため、本剤の血中濃度がかなり高濃度になった可能性は否定できない。	本剤投与後に発現しており本剤との関連性は否定できないが、インフルエンザの影響も考えられる。

今後の対応
今後とも同様症例の収集に努め評価していく。

送信者による診断名／症候群及び／又は副作用／有害事象の再分類	第一次情報源により報告された副作用／有害事象
	全身性痙攣

累積報告件数・使用上の注意記載状況等
使用上の注意の記載状況 【重大な副作用】精神・神経症状（意識障害、異常行動、譫妄、幻覚、妄想、痙攣等

引用文献	資料一覧

MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（三））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　検査及び処置の結果

識別番号・報告回数	B-05000322	第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし

検査	単位	正常範囲低値	正常範囲高値	05/01/18	05/02/08	05/03/01	05/03/04	05/03/04	05/03/06	05/03/07			
白血球数	/mm^3	4300	8000	1100	1400	900	900	1000	1700	3200			
赤血球数	x10^4/mm^3	450	510	202	199	137	138	140	171	132			
ヘモグロビン	g/dL	12.4	17.2	7.2	7.1	5.3	5.0	5.0	6.2	4.8			
ヘマトクリット	%	38	54	22.9	22.1	16.4	15.7	15.7	18.4	13.0			
PL-C	x10000/μL	18	34	11.2	7.7	7.6	6.9	7.0	6.2	6.8			
C-反応性蛋白	mg/dL	0	0.4	0.1	0.2	<0.1	1.0	1.0	13.1	29.7			
総蛋白（血清）	g/dL	6.5	8.5	6.7	7.0	6.5	6.6	6.8	7.6	7.1			
アルブミン（血清）	g/dL	3.5	5.0				3.7		3.9	3.5			
尿酸(血清)	mg/dL	3.2	7.5							13.0			
尿素窒素(血清)	mg/dL	7	18	31	47	52	46	46	56	89			
血中クレアチニン	mg/dL	0.5	1.1	4.15	4.26	4.72	5.01	5.03	6.41	11.12			
ナトリウム	mEq/L	137	146	140	140	140	139		138	133			
カリウム	mEq/L	3.8	5.1	3.7	3.8	3.8	3.9		3.3	3.9			
クロール	mEq/L	98	108	106	106	107	107		104	98			
総ビリルビン	mg/dL	0.2	1.0	0.8	1.1	1.2	1.4	1.4	1.8	2.5			
直接ビリルビン	mg/dL	0.0	0.2				0.6			0.9			
AST(GOT)	IU	12	40	62	112	176	226	229	287	331			
ALT(GPT)	IU	10	45	46	58	50	91	94	92	81			
アミラーゼ	IU/L	40	200				246			244			
クレアチンキナーゼ	IU/L	30	200	359	1019	1287	1570	1556		3166			
LD	IU	250	500	2086	3441	4390	6360	5493	6690	8140			
SP	mmHg									84			
DP	mmHg									38			
PR	回/分									68			
SpO2	%									98			

その他の情報の有無	

診断に関連する検査及び処置の結果

MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（三））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　検査及び処置の結果

識別番号・報告回数	B-05000322	第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし
診断に関連する検査及び処置の結果					
				MedDRA	Version (9.1)

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-05000322		第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル			該当なし	
治療歴					関連する過去の医薬品使用歴				
原疾患・合併症・既往歴	治療開始日	治療終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用（発現した場合のみ）
発作性夜間血色素尿症		継続	ＰＮＨ（原疾患）	外来、職業 [redacted]	ノイトロジン	05/03/04	05/03/04		
インフルエンザ		継続	Ｂ型インフルエンザウイルス感染（原疾患）						
再生不良性貧血	98	継続	合併症						
慢性腎不全	00	継続	合併症						
濃厚赤血球輸血	71	05/03/04							
								MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（四））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　評価に関する情報

識別番号・報告回数	B-05000322	第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル				該当なし	
医薬品を入手した国（承認国）	医薬品販売名（Lot）	一般的名称	医薬品に対して取られた処置	開始日	終了日	投与開始から発現までの時間間隔	投与終了から発現までの時間間隔	再投与による再発の有無	再投与により再発した副作用名
1. 日本（日本）	タミフル	リン酸オセルタミビル	投与中止	05/03/06	05/03/07				
2. 日本	ハロテスチン	フルオキシメステロン	投与量変更せず	00/11/09					
3. 日本	プレドニン	プレドニゾロン	投与量変更せず	01/05/24					
4. 日本	セルベックス	テプレノン	投与量変更せず	01/05/24					
5. 日本	ユベラＮ	ニコチン酸トコフェロール	投与量変更せず	01/05/31					
6. 日本	スローケー	塩化カリウム	投与量変更せず	03/01/30					
7. 日本	ペルサンチン	ジピリダモール	投与量変更せず	03/01/30					
8. 日本	ムコソルバン	塩酸アンブロキソール		05/03/04	05/03/07				
9. 日本	メジコン	臭化水素酸デキストロメトルファン		05/03/04	05/03/07				
10. 日本	フロモックス	塩酸セフカペンピボキシル		05/03/04	05/03/07				
11. 日本	ＰＬ	非ピリン系感冒剤（４）		05/03/04	05/03/07				
12. 日本（日本）	ノイトロジン	レノグラスチム（遺伝子組換え）		05/03/06	05/03/06				
13. 日本	ロキソニン	ロキソプロフェンナトリウム		05/03/07	05/03/07				

評価対象となる副作用／有害事象名	評価の情報源	医薬品と副作用／有害事象の因果関係（評価方法）	評価結果	医薬品に関するその他情報
1. 痙攣	REPORTER		関連あるかも/わずかに関連	1. タミフル：
痙攣	COMPANY		関連あるかも/わずかに関連	2. ハロテスチン：
2.				3. プレドニン：
3.				4. セルベックス：
4.				5. ユベラＮ：
				6. スローケー：
			MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（四））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　評価に関する情報　4／5

識別番号・報告回数	B-05000322	第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし

評価対象となる副作用／有害事象名	評価の情報源	医薬品と副作用／有害事象の因果関係（評価方法）	評価結果	医薬品に関するその他情報
5.				7. ペルサンチン：
6.				8. ムコソルバン：
7.				9. メジコン：
8.				10. フロモックス：
9.				11. ＰＬ：
10.				12. ノイトロジン：
11.				13. ロキソニン：
12.				
13.				

報告された死因	剖検	剖検による死因	
		MedDRA	Version (9.1)

144

（様式第２（五））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　母子に関する情報

識別番号・報告回数	B-05000322	第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル			該当なし
関連報告番号			親の年齢		親の身長 cm	親の体重 kg	副作用／有害事象名 全身痙攣、痙攣
親の略名		親の性別	最終月経日				
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間				

親の関連する治療歴及び随伴状態				親の関連する過去の医薬品使用歴				
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用（発現した場合のみ）

親の関連する治療歴及び随伴状態（副作用／有害事象を除く）

MedDRA	Version (9.1)

（様式第２（一））
医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）

識別番号・報告回数	B-05000394	第4報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
最新情報入手日	2005年05月11日		第一報入手日	2005年03月24日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が必要なもの 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの ◎ その他の医学的に重要な状態		報告された死因（死亡の場合）		
副作用	15日	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・既往歴					
発現国(情報源)	日本（日本）								
患者略名	[redacted]	体重 Kg		インフルエンザ脳症					
性別	女性								新医薬品等の区分 該当なし
年齢	4[redacted]歳		曝露時の妊娠期間						

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量 投与量/回	投与量 回数	投与期間 開始日	投与期間 終了日	医薬品使用理由
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	CAP	75mg/1回	1日	05/03/15	05/03/15	インフルエンザ
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	CAP	75mg/2回	1日	05/03/16	05/03/18	インフルエンザ
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	CAP	75mg/1回	1日	05/03/19	05/03/19	インフルエンザ

副作用／有害事象

重要性	副作用／有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用／有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの時間間隔	最終投与からの時間間隔	転帰
重・重	意識レベルの低下	意識障害		05/03/19	05/03/26			回
重・重	落ち着きのなさ	不穏		05/03/19	05/03/26			回

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

身長、体重[redacted]
2005/03/15
39℃の発熱あり。前医受診。インフルエンザと診断され本剤を投与される。夕方から内服。（75mg/日）
2005/03/16
（～3/18）自宅で寝ていた。発熱の有無など詳細不明。本剤内服。（150mg/日　～3/18）
2005/03/19夜
自宅内をフラフラ歩く。スリッパを履き間違える。トイレを出てから電気をつける等の異常言動が出現。言葉数も少なくなった。意識障害、不穏状態発現。インフルエンザウイルス罹患後の脳症と判断。
朝、本剤内服にて中止。（75mg/日）
2005/03/20
インフルエンザ確定診断実施。
結果：ウイルス検出されず、サンプル：咽頭粘液、自他覚所見：発熱（39℃）。
入院。意識レベルJCS-3、restless。他神経症状なし。頭部CT上異常所見なし。同日よりステロイドパルス療法（メチルプレドニゾロン 1000mg/日×3日間）施行。症状は翌日より急速に軽快。
2005/03/22午後
ほぼもとの状態に回復する。

MedDRA	Version (8.1)

（様式第２（一））
医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）

識別番号・報告回数	B-05000394	第4報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過									
頭部MRIでも特に異常所見は認めなかった。 2005/03/26 意識障害、不穏状態回復。退院。									
								MedDRA	Version (8.1)

（様式第２（二））
医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）

識別番号・報告回数	B-05000394	第4報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし

担当医等の意見	報告企業等の意見
インフルエンザ罹患後の良性脳症なのか、本剤の副作用なのか判断がつきかねる。 3/22の白血球数増加はステロイドパルス療法を行った影響と思われる。	本剤投与後に発現しているが、原疾患による高熱の影響が大きいと考える。

今後の対応
今後とも同様症例の収集に努め評価していく。

送信者による診断名／症候群及び／又は副作用／有害事象の再分類	第一次情報源により報告された副作用／有害事象

累積報告件数・使用上の注意記載状況等
1.使用上の注意の記載状況 国内、CDS:記載なし 2.累積報告件数 落ち着きのなさ　国内1件（今回の報告を含む）国外報告なし

引用文献	資料一覧

MedDRA	Version (8.1)

（様式第２（三））

医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）　　検査及び処置の結果

識別番号・報告回数	B-05000394	第4報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし

検査	単位	正常範囲低値	正常範囲高値	05/03/20	05/03/22								
白血球数	/mm^3	4100	10000	3300	16450								
好中球数（%）	%	40.0	91.0		82.0								
リンパ球（%）	%	27.0	46.0		8.0								
単球（%）	%	3.0	7.0		2.0								
好酸球数（%）	%	1.0	6.0		0.0								
好塩基球（%）	%	0.0	1.0		0.0								
赤血球数	x10^4/mm^3	420	560	440	419								
ヘモグロビン	g/dL	13	17	10.9	10.1								
ヘマトクリット	%	40	51	34.4	33.2								
血小板数	x10^4/mm^3	15.4	33.0	21.6	22.0								
総蛋白（血清）	g/dL	6.6	8.2		6.6								
総ビリルビン	mg/dL	0.3	1.3	0.4	0.4								
AST(GOT)	IU	10	30	24	21								
ALT(GPT)	IU	6	30	20	19								
AL-P	IU	103	338		220								
LD	IU		234	279	244								
γ-GTP	IU	9	55		11								
ChE	IU	110	250	176									
クレアチンキナーゼ	IU/L	55	175	299	181								
尿素窒素(血清)	mg/dL	7.0	20.0	13.0	14.5								
血中クレアチニン	mg/dL	0.4	1.0	0.6	0.5								
尿酸(血清)	mg/dL	3.0	7.0		2.5								
ナトリウム	mEq/L	136	148	138	138								
カリウム	mEq/L	3.6	5.0	3.9	3.7								
クロール	mEq/L	98	109	104	107								
カルシウム	mg/dL	8.5	10.0	9.3	9.2								
リン	mg/dL	2.8	4.7	3.1									
C-反応性蛋白	mg/dL	0	0.3	0.3	0.1								
UP					-								
UG					-								
潜血					-								
プロトロンビン時間	秒	11.6	12.8		10.6								

MedDRA	Version (8.1)