

51	70歳代/性別不明	2005年	落ち着きのなさ	150mg/4日間	
リン酸オセルタミビル150mg/日内服2日後よりつじつまの合わない話が始まり、その2日後より不穏行動(荷物をまとめ他病棟へと移動)。内服も終了、解熱し、不穏行動消失された。					
52	40歳代/女性	2005年	意識消失	150mg/1日間	
朝食後、リン酸オセルタミビル内服。午前に意識を失って転倒し、近医脳外科に搬送された。MRI正常で1時間後には全く正常になり帰宅。以後、内服せず。					
53	50歳代/女性	2005年	落ち着きのなさ	150mg/2日間	
リン酸オセルタミビル150mg/日内服1日後、体の置き場のないようななんともいえない感じがするとの訴えあり、リン酸オセルタミビルが有効なため経過をみていた。翌日再度、体の置き場のないような感じがするとの訴えあり。熱も37度台となっていたため、リン酸オセルタミビル中止となる。その後、訴えはなかった。					
54	10歳代/男性	2005年	異常行動	140mg/1日間	
リン酸オセルタミビルとアジスロマイシン、カルボシステイン、塩酸シプロヘプタジン、塩化リゾチームを内服。1時間後、玄関のほうへ行って、内ドアを開け、扉の窓をガチャガチャさせた。はじめはトイレだと本人は言い張ったが、祖母が繰り返し違うと言うと、そのうち気づいて、トイレへ行って眠った。このときのことは、本人は憶えていない。夕方、来院。意識は清明。採血で低ナトリウムが判り、点滴した。リン酸オセルタミビルは2回目以降は中止。					
55	10歳代/女性	2006年	恐怖	114mg/2日間	アセトアミノフェン
リン酸オセルタミビル114mg/日を夕刻より服用開始。翌日より「何か恐い」と母親に対して訴えあり。翌々日リン酸オセルタミビル中止。					

56	20歳代/女性	2006年	傾眠	150mg/4日間	
リン酸オセルタミビル75mg1回内服後、眠気がかなりあり1回目服用後からほとんど24時間寝たままだった。以降は前回ほどではないが眠気あり、子供に起こされて何とか起きるという感じだった。4日間飲み切り。					
57	10歳未満/男性	2006年	幻覚 痙攣	48mg/2日間	
リン酸オセルタミビル内服、2時間後に幻覚症状あり(見えない物が見える訴え)。翌日、リン酸オセルタミビル内服後に痙攣(痙攣持続時間は不明)。2回のみ内服して中止。その後症状の訴えはなし。					
58	10歳未満/男性	2006年	激越	120mg/不明	
リン酸オセルタミビル服用(1回目の服用か2回目の服用か不明)。3時間後、解熱。興奮状態でうわごと有り。母親が側にいるのに、「おかあさん」と叫び、ウロウロしている。翌日症状は改善。					
59	40歳代/女性	2006年	不眠症 激越 恶心	150mg/3日間	
リン酸オセルタミビル服用開始。その日のうちに、吐き気出現し、夜には興奮状態で不眠。服用2日目朝には解熱していたが、吐き気、興奮、不眠持続。服用3日目、吐き気、興奮、不眠持続。服用4日目(服用中止日)、吐き気、興奮、不眠持続するためリン酸オセルタミビル服用中止したところ、改善してきた。					
60	10歳未満/男性	2006年	異常行動 下痢	98.5mg/3日間	
リン酸オセルタミビル1回目服用し、昼睡眠を取る。服用1~2時間後、布団から起き上がり、歩き回りながら、1人しゃべり続ける。服用2日目、40度の発熱。異常行動はなし。服用3日目、解熱。投与終了1日目異常行動なし。					

61	10歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビル75mg 1回服用後約30分して突然起床し、興奮して意味不明なことを5~10分間喋った。夜も、やはりリン酸オセルタミビル服用後30分してから同様の異常行動を示した。					
62	10歳未満/男性	2006年	異常行動	96mg/1日間	
リン酸オセルタミビル服用30分後、突然起床して、意味不明なことを叫びながら部屋中を5分くらい走り回った。母親のなだめで落ち着き、臥床した。このとき、発熱(39°C)あり。夕方からはリン酸オセルタミビルを服用させなかった。					
63	80歳代/女性	2006年	幻覚	150mg/2日間	
リン酸オセルタミビル投与開始翌日の夜から翌朝まで幻覚があった。リン酸オセルタミビル中止。その後幻覚は起きていない。					
64	10歳未満/男性	2006年	異常行動	不明/5日間	
リン酸オセルタミビル投与開始1日前の夜に38°Cの発熱。近医受診し、インフルエンザA型の診断でリン酸オセルタミビル投与開始。投与開始2日目に解熱した。服用は継続。投与開始4日目に「包丁をお腹に刺してやる」などと騒ぐようになる。投与開始5日目にリン酸オセルタミビルは飲みきった。暴れていたので親が頭をたたいたらその後頭痛、嘔気を訴えた。その後、腹痛を訴えベットの上でのた打ち回っていると受診。投与終了1日後、症状は一旦おさまった。投与終了1週間後、頭痛、嘔気の訴えが多いため、入院。投与終了10日後、器質的な病変は否定され退院。					
65	10歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビルを朝夕に1カプセルずつ服用。深夜、急に起き上がって服を脱ぎ部屋の中を歩きお茶を飲んだ。母と会話したが、母のことを認識できず、ベランダをこえて外へ出ようとした。40分くらい続いた。39.9°C。朝、ベットでばたばたして話しているが目はグルグル回っていた。40分くらい続いた。					

66	10歳代/女性	2006年	幻聴 幻覚	150mg/3日間	
経過の記載なし					
67	10歳代/男性	2006年	異常行動	120mg/1日間	
意識不明瞭で意味のわからないことをしゃべる。そのとき目はあけていて、本人は覚えていない。30分程度で回復。					
68	10歳代/男性	2006年	幻覚 異常行動	60mg/2日間	
タ、リン酸オセルタミビル服用後、すぐに就眠(体温、アセトアミノフェンにより39.4°Cに低下)。翌朝、「地球が滅びる」幻覚を見て、なすすべもなく外出。大通りに出る前に我に帰かえった。その後、受診。ザナミビル水和物に変更となった。					
69	10歳代/男性	2006年	幻覚	不明/2日間	
夜、リン酸オセルタミビルを服用させ、3日間ほどで状態が安定してきたので、寝かせたところ、急に「何かが追いかけてくる。」と幻覚を訴える。					
70	10歳代/男性	2006年	意識変容状態 傾眠 失見当識 異常行動	150mg/5日間	
服用8日後まで見当識障害あり。					

71	10歳代/男性	2006年	異常感 浮動性めまい	135mg/1日間	
リン酸オセルタミビルを昼1回服用、30分～1時間以内に頭がボーっとする、フラフラすると本人より訴えあり、様子をみる。夜、2回目服用、30分～1時間以内に同様の症状あり。漫画本の字が読めないと訴えあり。翌朝の分から中止。症状もなく回復。					
72	10歳代/男性	2006年	意識変容状態	150mg/5日間	
投与中止1週間後頃、見当識障害あり。					
73	40歳代/女性	2006年	異常行動 健忘	150mg/3日間	
インフルエンザと診断されリン酸オセルタミビル150mg/日にて服用開始した。投与開始2日後に異常行動が出現したため、その翌日夕方より服用を中止した。					
74	10歳代/男性	2006年	意識変容状態 譫妄	150mg/1日間	
検査でインフルエンザB型と診断。夜、せん妄状態となる。せん妄状態にも39°C近いため、リン酸オセルタミビルを1カプセル服用しているが、その後問題は生じていない。					
75	10歳未満/男性	2006年	異常行動	80mg/1日間	
リン酸オセルタミビル内服し、1時間ほど経過した後、突然立ち上がりトイレに行こうとして逆の方向へ歩いて行く、また、夕食後に2回目の内服。その後、目を開いたまま「だめ、だめ、だめ」などのうわごとを言う、数字を口に出し数えたりする、などの異常行動や異常言動あり。					

76	10歳未満/女性	2006年	幻覚	72mg/1日間	
リン酸オセルタミビル2回服用後、副作用出現し、医師に電話。中止指示が出て、それ以降問題なし。					
77	20歳代/女性	2006年	意識変容状態	150mg/2日間	
早朝にリン酸オセルタミビル1カプセル服用後、意識低下。朝、トイレで倒れているのに気付いた。ソファーに行き、その後ソファーの上で再び意識低下。夕方、気付いてその後は特に問題なし。					
78	10歳未満/男性	2006年	意識変容状態 激越 譫妄	99mg/1日間	テオフィリン ペミロラストカリウム アセトアミノフェン
午前に「王様が僕のことを怒鳴る。夢じゃない。何度も聞こえるから起きてきた」、「こっちに来い、と窓の方から聞こえる」とせん妄あり。夜にも、言葉にならないうわ言あり。深夜、睡眠から覚醒。大声で叫んで眼球上転、幻視があった。四肢は振戦、全身性の痙攣なし、発熱なし(37.8°C)。5分程度で自然に改善した。					
79	80歳代/女性	2006年	幻覚	150mg/4日間	
リン酸オセルタミビル150mg/日投与4日目 シーツめくり「電気の線が…」と繰り返す。電気毛布のコントローラーをナースコールと間違えて打ち続ける。数回同様の行為。					
80	10歳未満/男性	2006年	異常行動	61.8mg/2日間	
リン酸オセルタミビル61.8mg/日服用。服用2時間ほど経って、突然起きあがり「〇〇〇どこにあるの」と叫ぶ。2回目を服用。その後、1時間ほど経って、30分おきぐらいに3~4回騒いだ。3回目服用。熱が37°Cぐらいに下がり、前日のような異常行動を起こさなかった。					

81	10歳代/男性	2006年	異常行動 譫妄	150mg/5日間	
目の前がまくらになり、誰かにおそわれる気がして、机の脚にしがみつく。舌が溶けていくと訴える。2階からイスを持ち降りるも全く記憶なし。午前3時突然起き、2階よりかけおり勝手口ドアの開閉を繰り返す。家族の呼びかけで我にかえる。投与開始3日目以降は異常行動なし。					
82	10歳代/男性	2006年	構音障害 健忘	不明/1日間	
朝、熱が40度が出ていたので、アセトアミノフェンとリン酸オセルタミビルを服用したところ、口がきけなくなり、点滴をしたら落ちついたが、その間の記憶が本人にはない。					
83	10歳代/性別不明	2006年	浮動性めまい 異常行動	不明/1日間	
リン酸オセルタミビル内服。服用3時間後より言動がおかしくなり、階段より転落し、上肢痙攣みられた。救急車で受診するも、意識レベル回復し、画像上も異常所見なし。					
84	10歳未満/男性	2006年	悪夢 異常行動	54mg/1日間	塩酸シプロヘプタジン カルボシステイン 塩酸プロカテロール
夕方頃、リン酸オセルタミビルを服用。夜中、急に目を開き、恐い恐いとおびえ始め母親の周りを回りだし、ヘビが来る、カイジュウが来ると何度も繰り返し、フトンの中で15分おきに「来る来る」とあっちへ行ったり、こっちへ來たりと明け方まで繰り返した。翌朝、落ち着いて少しご飯を食べ、リン酸オセルタミビルその他を服用。昼過ぎに寝ていたら突然泣き出し、20~30分泣き続けてその後はケロッとしていた。					
85	10歳代/女性	2006年	異常行動 感情不安定 意識変容状態 異常行動	150mg/1日間	
急な発熱(39°C)あり、リン酸オセルタミビル服用。夜間に副作用と思われる症状出現。2回目のテストでも陰性で、インフルエンザであった可能性も低くリン酸オセルタミビルの影響が考えられた。					

86	10歳未満/男性	2006年	異常行動	104mg/5日間	
体温39.4°C。リン酸オセルタミビル104mg/日服用開始した1日目に「トイレに行く」といって、玄関のドアを開けたり、ベランダに出たりする異常行動が出現。その後もリン酸オセルタミビルを服用継続したが、2日目以後、異常行動はみられなかった。					
87	30歳代/男性	2006年	落ち着きのなさ 譫妄	150mg/1日間	
未明にリン酸オセルタミビルを服用。朝起きると、部屋の中がめちゃくちゃになっており自分でも訳が分らない。					
88	10歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
夕方、リン酸オセルタミビル1カプセル服用後就寝。約5時間後、本人が「トイレに行く」と言い、叫びながらベランダに向かって歩き出したため、母親が驚き制止。4日後、リン酸オセルタミビルカプセル服用せず。異常行動なし。					
89	10歳代/男性	2006年	異常行動	135.6mg/不明	ヒベンズ酸チペピジン 塩化リゾチーム カルボシステイン エバスチン アセトアミノフェン ポビドンヨード クロモグリク酸ナトリウム
服用2日後、立ち上がって意味不明の事を言って寝た。30分後位、再び同じ行動をし、朝、そのことは覚えていなかった。					
90	10歳代/男性	2006年	精神症状	87mg/5日間	
リン酸オセルタミビル服用し、仮眠。服用30分後突然めざめ、夢で母親を見て、「おばけが出た」「怖い」「あっちいって」と興奮状態で泣き叫んだ(体温38.6°C)。					

91	10歳代/女性	2006年	視覚障害 会話障害	不明/1日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビルを内服。解熱剤使用なし。リン酸オセルタミビル内服と同時刻に鎮咳去痰薬も内服した。夜中にかけ断続的に「ふすま天井が高く見えた、ママの背が高くなったり。。。ふすまが100で。。。ふすまが新しく見える」また「白目がくりつとなって気持悪い」などの発言あり。幻視幻聴、異常行動なし。自然に改善。					
92	30歳代/女性	2006年	精神症状	150mg/1日間	
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビルを服用。服用時、39°C代の発熱、おかしな言動ありと受診。帰宅後も、おかしな言動ありと再診。熱は37.8~36.9で推移。夢なのか現実なのかわからないと発言。					
93	10歳代/男性	2006年	悪心 胸部不快感 流涙増加 多汗症 落ち着きのなさ	75mg/1日間	
熱発(38.4°C)し、インフルエンザ迅速検査にてB型が陽性。自宅にてリン酸オセルタミビル75mg 1カプセルを内服したところ、1時間後に嘔気、胸苦しいとの事。発汗、流涙あり。不穏状態。服用から2時間後に受診。診察上、異常なし。					
94	10歳代/女性	2006年	幻覚	150mg/4日間	
リン酸オセルタミビル服用後、吐氣があるため内服中止した。夜中、枕等の目の前の物が大きく迫ってきたため、逃げ出そうと思い、家族が押さえつけたところ、「痛い、痛い」と言いながら、両手をばたばたと動かした。経過をみていたが翌朝には軽快した。					
95	10歳未満/男性	2006年	異常行動 異常行動	80mg/1日間	
発熱にて近医受診し、インフルエンザA陽性のためリン酸オセルタミビル内服。30分後嘔吐、しばらく睡眠後「おもちゃが喋っている」などの異常言動か行動がみられた。					

96	10歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル75mgを1回服用。服用3時間後、寝ていたところ突然起き上がり、部屋中を手をゆさぶりながら歩き回るが、呼びかけには答えず、2~3分で落ち着いた。本剤内服中止。翌日未明に突然起き上がり、上肢を1分程バタつかせることあたが、その後は見られなくなった。					
97	30歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/5日間	
リン酸オセルタミビル服用。服用1時間半後にベッドの上に立ち飛び降りる。					
98	30歳代/男性	2006年	異常行動 転倒	75mg/2日間	
夕方より、リン酸オセルタミビル服用。翌日朝食に転倒。体を前後に揺らす。2日間異常行動がみられたため、服用中止。中止後異常行動はなくなる。					
99	10歳代/女性	2006年	異常行動	75mg/1日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル75mgを1回内服させた。3時間後に体温が38.7°Cあったためアセトアミノフェンを内服。リン酸オセルタミビル服用5時間後に患児が突然起き出して眼をつり上げ眼の焦点が合わない表情で色々叫んで暴れるため母親が押さえつけようとしたが振り払おうとして母親の手に負えないと父を呼んで抑えつけた。					
100	70歳代/女性	2006年	異常行動 転倒	150mg/4日間	
インフルエンザA型を診断され、リン酸オセルタミビル服用1日目、夜トイレに行こうとして、フラフラして転倒、玄関で靴を枕に2~3時間寝ていた。その間記憶なし。					

101	10歳代/女性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル150mg/日を服用。深夜、突然さけんだりする異常行動あり。					
102	10歳代/男性	2006年	異常行動	75mg/1日間	セフポドキシムプロキセチル 鎮咳配合剤(1) アセトアミノフェン
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビルを服用。服用後、寝ていたのが起きだし、しながらをさがす等意味不明の発言あり、何かをさがす様な動きをくり返した。家族の声には全く答えず、20分程で回復。その後著変なし。本人全く記憶なし。					
103	70歳代/女性	2006年	腹痛 錯乱状態 幻覚 尿失禁	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビル150mg服用後、精神錯乱、幻覚などの症状が出現。					
104	10歳未満/女性	2006年	異常行動	60mg/2日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル服用。翌日朝リン酸オセルタミビル服用後に暴れだし、イライラした様子だった。夕方服用後は、それまで寝ていたのに急に起きだして壁をたたくなどの異常行動がみられた。					
105	10歳未満/男性	2006年	意識変容状態	80mg/1日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル内服。服用時は39°C代の発熱あり。服用2時間後から嘔気、気持わるいと訴え、わけのわからない事を言ったり恐がったり睡眠をくり返した。翌日も昼間解熱傾向。夜、リン酸オセルタミビル服用。服用3時間後から部屋をとび出そうにしたり、服を着ようとしたり、意味のとおらない事を言ったり、明け方までました。					
106	10歳代/女性	2006年	異常行動	150mg/1日間	アセトアミノフェン メキタジン
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビルを初回内服。服用2時間後、トイレより下着を下げてまま出てきて異常言動も見られた。20分ほどで意識正常化。					

107	10歳未満/男性	2006年	異常行動	66mg/5日間	ザナミビル水和物
夜インフルエンザの症状がでたため、当日妹がインフルエンザで処方されていたリン酸オセルタミビルを投与した。深夜、突然おきあがって意味不明な事を口にしました。					
108	10歳未満/男性	2006年	低体温 泣き 激越	75mg/1日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。深夜睡眠中に泣き出したり、騒いだりした。体温測定でも35.8°Cと低体温症状を見せたが、経過観察し、翌日の朝には元気になっていた。					
109	10歳代/男性	2006年	幻聴	150mg/不明	アセトアミノフェン
インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビル処方。服用後、家族より患者に幻聴が出現しているという電話あり。					
110	10歳代/男性	2006年	異常行動	120mg/1日間	
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル服用開始。翌日には解熱していたが、服用。翌々日も解熱していたので服用中止した。夜、入眠するが、入眠2時間後に異常行動発現。すぐにまた入眠。					
111	10歳代/女性	2006年	幻覚 悪夢	150mg/不明	
インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビル75mg1回を内服。1時間後、睡眠から覚醒後、小さな光がたくさん見え、吸い込まれそうで恐かった。9時間後リン酸オセルタミビル75mg1回服用。翌日朝、夢で爆弾がしきかけられて、爆発しそうで恐かった。					
112	10歳代/女性	2006年	幻覚 幻覚	120mg/不明	
インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビル60mgを1回内服。服用3時間後、目覚めると大きなクモが部屋にいて恐かった。					