

ジノテフラン作物残留試験一覧表

農作物	試験圃場	試験条件			最大残留量 (ppm)	
		剤型	使用量・使用方法	回数		経過日数
ピーマン (果実)	2	1%粒剤＋ 20%水溶剤	植穴処理 2g/株 2,000倍散布 200L/10a	3回	1, 3, 7, 14日	圃場A:0.431 圃場B:1.18
ピーマン [*] (果実)	2	1%粒剤	植穴土壌混和 2g/株 株元処理 2g/株	3回	1, 3, 7日	圃場A:0.10(3回, 3日) (#) 圃場B:0.07(3回, 1日) (#)
なす (果実)	2	1%粒剤＋ 20%水溶剤	植穴処理 3g/株 2,000倍散布 250L/10a	3回	1, 3, 7日	圃場A:0.264 圃場B:0.504
なす (果実)	2	1%粒剤＋ 20%水溶剤	植穴土壌混和 2g/株、株元処理 2g/株 2,000倍散布 200, 157L/10a	4回	1, 3, 7日	圃場A:0.48(4回, 1日) (#) 圃場B:0.46(4回, 1日) (#)
なす [*] (果実)	2	1%粒剤	植穴土壌混和 2g/株 株元処理 2g/株	3回	1, 3, 7, 14日	圃場A:0.06(3回, 1日) (#) 圃場B:0.08(3回, 7日) (#)
ししとう (果実)	2	1%粒剤＋ 20%水溶剤	定植時植穴土壌混和 2g/株 2,000倍希釈液 2.5G, 15.0L/10a	3回	1, 3, 7日	圃場A:1.44(3回, 1日) 圃場B:1.50(3回, 3日)
ししとう (果実)	2	20%水溶剤＋ 1%粒剤＋ 20%水溶剤	2,000倍希釈液 500, 100mL/ 散布 2,000倍希釈液 500mL/箱 灌注 200倍希釈液 20mL/株 灌注 植穴土壌混和＋株元散布 2g/株 2,000倍希釈液 300, 90, 120L/10a	7回	1, 3, 7, 14日	圃場A:1.42(7回, 3日) (#) 圃場B:1.60(7回, 1日) (#)
とうがらし (果実)	2	20%水溶剤＋ 1%粒剤＋ 20%水溶剤	2,000倍希釈液 1000mL/箱, 200mL/3箱 50倍希釈液 500mL/株 灌注 200倍希釈液 20mL/株 灌注 植穴土壌混和＋株元散布 2g/株 2,000倍希釈液 200, 170L/10a	7回	1, 3, 7, 14日	圃場A:1.8(7回, 7日) (#) 圃場B:1.6(7回, 1日) (#)
きゅうり [*] (果実)	2	1%粒剤＋ 20%水溶剤	植穴処理 2g/株 2,000倍散布 200L/10a	3回	1, 3, 7日	圃場A:0.43(3回, 3日) 圃場B:0.52(3回, 3日)
きゅうり [*] (果実)	2	1%粒剤＋ 20%水溶剤	植穴土壌混和 2g/株、株元処理 2g/株 2,000倍散布 200, 250L/10a	4回	1, 3, 7日	圃場A:0.65(4回, 3日) (#) 圃場B:0.38(4回, 1日) (#)
メロン [*] (果実)	2	1%粒剤	植穴処理 2g/株	1回	80, 87, 94日 85, 92, 99日	圃場A:<0.005 圃場B:0.030(1回, 92日)

ジノテフラン作物残留試験一覧表

農作物	試験圃場	試験条件			最大残留量 (ppm)	
		剤型	使用量・使用方法	回数		経過日数
メロン* (果実)	2	1%粒剤+ 20%水溶剤	植穴処理 2g/株 1,000倍散布 250L/10a	3回	3, 14, 28, 42日	圃場A:0.47(3回, 28日) (#) 圃場B:0.26(3回, 28日) (#)
すいか* (果実)	2	1%粒剤+ 20%水溶剤	植穴土壌混和 5g/株、株元処理 2g/株 2,000倍散布 200, 250L/10a	4回	7, 14, 21, 28日	圃場A:0.20(4回, 21日) (#) 圃場B:0.13(4回, 21日) (#)
ほうれんそう (茎葉)	2	1%粒剤+ 20%水溶剤	定植時植溝土壌混和 9kg/10a 2,000倍散布 150, 250L/10a	3回	3, 7, 14日	圃場A:9.33(3回, 3日) (#) 圃場B:7.10(3回, 3日) (#)
オクラ (果実)	2	1%粒剤+ 20%水溶剤	生育期株元処理 9kg/10a 2,000倍散布 180~250, 300L/10a	3回	1, 3, 7, 14日	圃場A:0.46(3回, 1日) (#) 圃場B:0.56(3回, 1日) (#)
さやえんどう (さや)	2	20%水溶剤+ 1%粒剤+ 20%水溶剤	100倍希釈液 30mL/株 灌注 植溝土壌混和+株元散布 9kg/10a 2,000倍希釈液 300, 200L/10a	5回	1, 3, 7, 14日	圃場A:2.49(5回, 3日) (#) 圃場B:1.17(5回, 1日) (#)
えだまめ* (さや)	2	1%粒剤+ 20%水溶剤	播種時播溝処理土壌混和 6kg/10a 2,000倍散布 200, 220L/10a	3回	7, 14, 21, 28日	圃場A:0.534(3回, 14日) (#) 圃場B:0.678(3回, 7日) (#)
くわい (塊茎)	2	1%粒剤	3kg/10a	3回	30, 60, 90日	圃場A:<0.02(3回, 60日) 圃場B:0.03(3回, 60日)
温州みかん* (果肉)	2	20%水溶剤	1,000倍散布 400L/10a	2回	7, 14, 28, 42, 56日 8, 14, 28, 42, 49日	圃場A:0.460(2回, 28日) 圃場B:0.581(2回, 28日)
温州みかん* (果皮)	2	20%水溶剤	1,000倍散布 400L/10a	2回	7, 14, 28, 42, 56日 8, 14, 28, 42, 49日	圃場A:1.95(2回, 28日) 圃場B:3.46
夏みかん* (果肉)	2	20%水溶剤	1,000倍散布 500L/10a	2回	7, 14, 21日	圃場A:0.012(2回, 14日) 圃場B:0.034(2回, 14日)
夏みかん* (果皮)	2	20%水溶剤	1,000倍散布 500L/10a	2回	7, 14, 21日	圃場A:1.34(2回, 14日) 圃場B:0.99
夏みかん* (果実)	2	20%水溶剤	1,000倍散布 500L/10a	2回	7, 14, 21日	圃場A:0.486(2回, 14日) 圃場B:0.233
すだち (果実)	1	20%水溶剤	1,000倍散布 500L/10a	2回	7, 14, 21日	圃場A:1.04

ジノテフラン作物残留試験一覧表

農作物	試験圃場	試験条件				最大残留量 (ppm)
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
かぼす (果実)	1	20%水溶剤	1,000倍散布 500L/10a	2回	7, 14, 21日	圃場A:0.83
りんご (果実)	2	20%水溶剤	1,000倍散布 500, 600L/10a	2回	7, 14, 21日	圃場A:0.276(2回, 7日) (#) 圃場B:0.187(2回, 7日) (#)
りんご (果実)	2	20%水溶剤	500倍土壌表面散布 500L/10a 2,000倍希釈液 600, 500L/10a	4回	1, 3, 7, 14, 21日	圃場A:0.14(3回, 1日) (#) 圃場B:0.10(3回, 7日) (#)
なし (果実)	2	20%水溶剤	1,000倍散布 450, 500L/10a	2回	7, 14, 21, 28日	圃場A:0.736(2回, 7日) (#) 圃場B:0.454(2回, 7日) (#)
なし (果実)	2	20%水溶剤	500倍土壌表面散布 500L/10a 2,000倍散布 350L/10a	4回	1, 3, 7, 14, 21, 28日	圃場A:0.16(4回, 1日) (#) 圃場B:0.42(4回, 1日) (#)
もも (果肉)	2	20%水溶剤	2,000倍散布 400, 450L/10a	2回	7, 14, 20, 26日 7, 14, 21, 27日	圃場A:0.196 圃場B:0.476
もも (果皮)	2	20%水溶剤	2,000倍散布 400, 450L/10a	2回	7, 14, 20, 26日 7, 14, 21, 27日	圃場A:1.24 圃場B:1.90
もも* (果肉)	2	20%水溶剤	500倍土壌表面散布 400, 500L/10a 2,000倍散布 400, 500L/10a	4回	1, 3, 7, 14, 21, 28日	圃場A:1.03(4回, 21日) (#) 圃場B:0.54(4回, 3日) (#)
もも (果皮)	2	20%水溶剤	500倍土壌表面散布 400, 500L/10a 2,000倍散布 400, 500L/10a	4回	1, 3, 7, 14, 21, 28日	圃場A:5.28(4回, 1日) (#) 圃場B:5.26(4回, 1日) (#)
ネクタリン (果実)	2	20%水溶剤	2,000倍散布 270, 700L/10a	3回	1, 3, 7日	圃場A:0.93 圃場B:0.86
すもも (果実)	2	20%水溶剤	500倍土壌表面散布 500L/10a 2,000倍散布 400, 500L/10a	4回	1, 3, 7, 21日	圃場A:0.18(4回, 7日) (#) 圃場B:0.18(4回, 7日) (#)
うめ (果実)	2	20%水溶剤	2,000倍散布 400L/10a	2回	7, 14, 21日	圃場A:1.36 圃場B:1.94
おうとう* (果実)	2	20%水溶剤	1,000倍散布 400, 500L/10a	2回	7, 14, 21, 28日	圃場A:2.76(2回, 14日) (#) 圃場B:1.54(2回, 7日) (#)
おうとう (果実)	2	20%水溶剤	500倍土壌表面散布 500L/10a 2,000倍散布 400, 500L/10a	3回	1, 7, 14, 21, 28日 1, 7, 13, 20, 27日	圃場A:2.03(3回, 1日) (#) 圃場B:5.05(3回, 1日) (#)