

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」 《患者特性調査（医療療養病棟） 集計結果（共通病院比較）》

平成18年度調査集計対象：平成18年度調査対象病院のうち、平成17年度慢性期入院医療実態調査を実施した49病院の、
療養病棟入院基本料2を算定している患者

平成17年度調査集計対象：平成17年度慢性期入院医療実態調査の対象病院のうち、平成18年度調査を実施した49病院の、
下記入院料を算定している患者

- ・療養病棟入院基本料1, 2
- ・療養病棟入院基本料特別1, 2
- ・特殊疾患療養病棟入院料1, 2
- ・特殊疾患入院管理料

(注)本集計における「医療区分」は、特殊疾患療養病棟等の経過措置については考慮していない。

1 ADL区分・医療区分・認知機能障害加算の状況

ADL区分	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=849)	医療区分2 (n=1,280)	医療区分3 (n=483)	合計 (n=2,612)	医療区分1 (n=1,313)	医療区分2 (n=1,028)	医療区分3 (n=312)	合計 (n=2,653)
ADL区分3	9.9%	28.2%	14.5%	52.5%	14.6%	18.9%	8.3%	41.8%
ADL区分2	10.9%	11.7%	2.5%	25.1%	15.2%	10.6%	1.8%	27.7%
ADL区分1	2.6%（認）	1.7%（認）	1.5%	22.4%	7.1%（認）	3.8%（認）	1.7%	30.5%
	9.2%	7.4%			12.6%	5.4%		
全 体	32.5%	49.0%	18.5%	100.0%	49.5%	38.7%	11.8%	100.0%
無回答(n)	(2)	(4)	(0)	(6)	(11)	(3)	(1)	(15)

2 医療区分採用項目

医療区分採用項目	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=851)	医療区分2 (n=1,284)	医療区分3 (n=483)	合 計 (n=2,618)	医療区分1 (n=1,324)	医療区分2 (n=1,031)	医療区分3 (n=313)	合 計 (n=2,668)
スモン	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
24時間の監視・管理	0.0%	0.0%	5.2%	1.0%	0.0%	0.0%	13.1%	1.5%
中心静脈栄養	0.0%	0.0%	31.1%	5.7% ↑	0.0%	0.0%	16.6%	1.9%
24時間持続点滴	0.0%	0.0%	41.0%	7.6% ↑	0.0%	0.0%	31.0%	3.6%
人工呼吸器（レスピレーター）	0.0%	0.0%	3.9%	0.7%	0.0%	0.0%	4.8%	0.6%
ドレン法・胸腹腔洗浄	0.0%	0.0%	0.8%	0.2%	0.0%	0.0%	1.0%	0.1%
気管切開・気管内挿管[×発熱]	0.0%	0.0%	11.8%	2.2%	0.0%	0.0%	11.8%	1.4%
酸素療法	0.0%	0.0%	51.6%	9.5% ↑	0.0%	0.0%	51.4%	6.0%
感染隔離室におけるケア	0.0%	0.0%	8.9%	1.6%	0.0%	0.0%	9.6%	1.1%
多発性硬化症	0.0%	0.4%	0.2%	0.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%
*パーキンソン病関連疾患	0.0%	16.9%	4.6%	9.1%	0.0%	15.5%	3.2%	6.4%
その他神経難病	0.0%	3.5%	3.9%	2.4%	0.0%	3.9%	5.1%	2.1%
神経難病以外の難病	0.0%	1.6%	0.8%	0.9%	0.0%	3.9%	5.1%	2.1%
脊髄損傷[×四肢麻痺]	0.0%	0.9%	0.4%	0.5%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%
肺気腫／慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.0%	4.8%	13.3%	4.8%	0.0%	6.1%	13.4%	3.9%
悪性腫瘍[×疼痛コントロール]	0.0%	1.1%	2.9%	1.1%	0.0%	2.0%	0.3%	0.8%
肺炎	0.0%	7.9%	23.2%	8.2%	0.0%	13.7%	22.0%	7.9%
尿路感染症	0.0%	9.7%	11.2%	6.8% ↑	0.0%	6.1%	6.1%	3.1%
創感染	0.0%	0.9%	0.8%	0.6%	0.0%	1.5%	0.3%	0.6%
リハビリテーション	0.0%	6.2%	1.2%	3.3%	0.0%	6.1%	3.5%	2.8%
脱水	0.0%	6.3%	11.8%	5.3% ↑	0.0%	3.2%	3.5%	1.6%
体内出血	0.0%	1.0%	3.7%	1.2%	0.0%	0.9%	1.9%	0.6%
嘔吐	0.0%	3.0%	3.9%	2.2%	0.0%	2.3%	4.8%	1.5%
褥瘡	0.0%	6.5%	9.7%	5.0%	0.0%	14.4%	14.1%	7.2%
うつ血性潰瘍	0.0%	0.9%	1.0%	0.6%	0.0%	1.0%	0.6%	0.4%
せん妄の兆候	0.0%	2.9%	2.7%	1.9%	0.0%	3.1%	3.5%	1.6%
うつ状態	0.0%	14.0%	5.4%	7.9%	0.0%	11.4%	4.2%	4.9%
暴行	0.0%	2.4%	1.2%	1.4%	0.0%	1.7%	1.3%	0.8%
透析	0.0%	5.3%	0.6%	2.7%	0.0%	4.5%	1.6%	1.9%
*経鼻胃管・胃瘻の経腸栄養 [×発熱または嘔吐]	0.0%	8.3%	18.8%	7.5%	0.0%	8.1%	22.4%	5.8%
喀痰吸引(1日8回以上)	0.0%	26.4%	42.4%	20.8% ↑	0.0%	19.2%	39.3%	12.0%
気管切開・気管内挿管	0.0%	8.3%	20.1%	7.8%	0.0%	11.1%	22.7%	6.9%
血糖検査(1日3回以上)	0.0%	7.8%	6.0%	4.9% ↑	0.0%	3.1%	2.2%	1.5%
皮膚の潰瘍のケア	0.0%	10.4%	9.7%	6.9%	0.0%	8.6%	10.2%	4.5%
創傷処置	0.0%	14.9%	12.2%	9.5% ↑	0.0%	11.7%	11.2%	5.8%
全 体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(注)↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

3 入退院の状況

調査病棟に入院する前の状況	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)
1. 自宅(家族等との同居も含む)	98	11.5%	130	10.1%	38	7.9%	266 10.2% ↓
2. グループホーム	1	0.1%	6	0.5%	3	0.6%	10 0.4%
3. 有料老人ホーム	6	0.7%	11	0.9%	3	0.6%	20 0.8%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	2 0.1%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	6	0.7%	33	2.6%	15	3.1%	54 2.1%
6. 介護老人保健施設	30	3.5%	61	4.8%	31	6.4%	122 4.7%
7. 他の医療機関	387	45.5%	556	43.3%	197	40.8%	1,140 43.5% ↑
(再掲)他の医療機関の一般病床	331	38.9%	495	38.6%	183	37.9%	1,009 38.5%
(再掲)他の医療機関の療養病床	49	5.8%	46	3.6%	12	2.5%	107 4.1%
(再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等)	7	0.8%	15	1.2%	2	0.4%	24 0.9%
* 8. 自院の他の病床	314	36.9%	481	37.5%	193	40.0%	988 37.7% ↑
(再掲)自院の一般病床(転棟)	259	30.4%	390	30.4%	158	32.7%	807 30.8%
(再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟)	55	6.5%	91	7.1%	35	7.2%	181 6.9%
9. わからない	5	0.6%	3	0.2%	2	0.4%	10 0.4%
無回答	2	0.2%	3	0.2%	1	0.2%	6 0.2%
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618 100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

調査病棟に入院する前の状況	平成17年度調査						
	医療区分1 (n=1,324)		医療区分2 (n=1,031)		医療区分3 (n=313)		合計 (n=2,668)
1. 自宅(家族等との同居も含む)	260	19.6%	120	11.6%	32	10.2%	412 15.4%
2. グループホーム	5	0.4%	3	0.3%	2	0.6%	10 0.4%
3. 有料老人ホーム	4	0.3%	8	0.8%	1	0.3%	13 0.5%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	3	0.2%	4	0.4%	0	0.0%	7 0.3%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	12	0.9%	33	3.2%	14	4.5%	59 2.2%
6. 介護老人保健施設	39	2.9%	41	4.0%	21	6.7%	101 3.8%
7. 他の医療機関	520	39.3%	394	38.2%	148	47.3%	1,062 39.8%
8. 自院の他の病棟	447	33.8%	387	37.5%	91	29.1%	925 34.7%
9. わからない	34	2.6%	41	4.0%	4	1.3%	79 3.0%
全 体	1,324	100.0%	1,031	100.0%	313	100.0%	2,668 100.0%

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)
急性期状態が安定	593	69.7%	867	67.5%	295	61.1%	1,755 67.0%
疾病の急性憎悪	65	7.6%	107	8.3%	91	18.8%	263 10.0%
継続的高度医療管理が必要	56	6.6%	229	17.8%	172	35.6%	457 17.5% ↑
* 継続的なリハビリが必要	369	43.4%	423	32.9%	85	17.6%	877 33.5% ↓
他施設の空きがない	102	12.0%	142	11.1%	18	3.7%	262 10.0%
自宅の体制が整わない	193	22.7%	289	22.5%	50	10.4%	532 20.3% ↓
* 本人、家族等が希望	386	45.4%	627	48.8%	226	46.8%	1,239 47.3% ↑
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618 100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成17年度調査						
	医療区分1 (n=1,324)		医療区分2 (n=1,031)		医療区分3 (n=313)		合計 (n=2,668)
急性期状態が安定	848	64.0%	698	67.7%	214	68.4%	1,760 66.0%
疾病の急性憎悪	70	5.3%	85	8.2%	45	14.4%	200 7.5%
継続的高度医療管理が必要	127	9.6%	169	16.4%	61	19.5%	357 13.4%
継続的なリハビリが必要	685	51.7%	448	43.5%	90	28.8%	1,223 45.8%
他施設の空きがない	122	9.2%	100	9.7%	18	5.8%	240 9.0%
自宅の体制が整わない	337	25.5%	253	24.5%	55	17.6%	645 24.2%
本人、家族等が希望	514	38.8%	437	42.4%	142	45.4%	1,093 41.0%
全 体	1,324	100.0%	1,031	100.0%	313	100.0%	2,668 100.0%

退院先の見通し (「退院(転院・転倒)の見込みは無い」と回答された患者を除く)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=589)		医療区分2 (n=641)		医療区分3 (n=180)		合計 (n=1,410)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	171	29.0%	142	22.2%	18	10.0%	331	23.5% ↓
2. グループホーム	13	2.2%	11	1.7%	1	0.6%	25	1.8%
3. 有料老人ホーム	7	1.2%	21	3.3%	2	1.1%	30	2.1%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	12	2.0%	8	1.2%	3	1.7%	23	1.6%
* 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	138	23.4%	131	20.4%	18	10.0%	287	20.4% ↓
6. 介護老人保健施設	141	23.9%	159	24.8%	30	16.7%	330	23.4% ↑
7. 他の医療機関	64	10.9%	122	19.0%	44	24.4%	230	16.3%
(再掲)他の医療機関の一般病床	16	2.7%	18	2.8%	10	5.6%	44	3.1%
(再掲)他の医療機関の療養病床	42	7.1%	98	15.3%	31	17.2%	171	12.1%
(再掲)他の医療機関のその他の病床	6	1.0%	6	0.9%	3	1.7%	15	1.1%
8. 自院の他の病床	20	3.4%	27	4.2%	19	10.6%	66	4.7%
(再掲)自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	1	0.2%	0	0.0%	1	0.6%	2	0.1%
(再掲)自院の一般病床(10.の病棟を除く)	5	0.8%	14	2.2%	12	6.7%	31	2.2%
(再掲)自院のその他の病床	14	2.4%	13	2.0%	6	3.3%	33	2.3%
9.その他	20	3.4%	16	2.5%	44	24.4%	80	5.7%
無回答	3	0.5%	4	0.6%	1	0.6%	8	0.6%
全 体	589	100.0%	641	100.0%	180	100.0%	1,410	100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

退院先の見通し	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=631)		医療区分2 (n=418)		医療区分3 (n=107)		合計 (n=1,156)	
1.自宅(家族等との同居も含む)	240	38.0%	112	26.8%	22	20.6%	374	32.4%
2.グループホーム	2	0.3%	2	0.5%	0	0.0%	4	0.3%
3.有料老人ホーム	9	1.4%	3	0.7%	1	0.9%	13	1.1%
4.ケアハウス	3	0.5%	2	0.5%	0	0.0%	5	0.4%
5.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	159	25.2%	111	26.6%	34	31.8%	304	26.3%
6.介護老人保健施設	111	17.6%	69	16.5%	9	8.4%	189	16.3%
7.他の医療機関	81	12.8%	101	24.2%	26	24.3%	208	18.0%
8.自院の他の病棟	26	4.1%	18	4.3%	15	14.0%	59	5.1%
全 体	631	100.0%	418	100.0%	107	100.0%	1,156	100.0%
(わからない)	693		613		206		1,512	

(注) 上記集計表は、平成18年度と比較するため、「9. わからない」の回答者を除く患者数での、各選択肢の回答割合である。

<平成18年度のみ> 退院の見通し	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)	
90日以内に退院できる見通し	189	22.2%	166	12.9%	23	4.8%	378	14.4%
90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる	372	43.7%	433	33.7%	80	16.6%	885	33.8%
悪化して転院・転棟・死亡する見通し	28	3.3%	42	3.3%	77	15.9%	147	5.6%
退院(転院・転棟)の見通しはない	261	30.7%	642	50.0%	303	62.7%	1,206	46.1%
無回答	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618	100.0%

退院先の見通し(「90日以内に退院できる見通し」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=189)		医療区分2 (n=166)		医療区分3 (n=23)		合計 (n=378)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	96	50.8%	82	49.4%	5	21.7%	183	48.4%
2. グループホーム	7	3.7%	1	0.6%	1	4.3%	9	2.4%
3. 有料老人ホーム	2	1.1%	7	4.2%	0	0.0%	9	2.4%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	1	0.5%	2	1.2%	1	4.3%	4	1.1%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	19	10.1%	26	15.7%	5	21.7%	50	13.2%
6. 介護老人保健施設	42	22.2%	24	14.5%	7	30.4%	73	19.3%
7. 他の医療機関の一般病床	9	4.8%	5	3.0%	0	0.0%	14	3.7%
8. 他の医療機関の療養病床	9	4.8%	13	7.8%	3	13.0%	25	6.6%
9. 他の医療機関のその他の病床	1	0.5%	3	1.8%	1	4.3%	5	1.3%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
13. その他	2	1.1%	2	1.2%	0	0.0%	4	1.1%
無回答	1	0.5%	1	0.6%	0	0.0%	2	0.5%
全 体	189	100.0%	166	100.0%	23	100.0%	378	100.0%

退院先の見通し(「今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=372)		医療区分2 (n=433)		医療区分3 (n=80)		合計 (n=885)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	75	20.2%	60	13.9%	12	15.0%	147	16.6%
2. グループホーム	6	1.6%	10	2.3%	0	0.0%	16	1.8%
3. 有料老人ホーム	4	1.1%	13	3.0%	1	1.3%	18	2.0%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	11	3.0%	5	1.2%	1	1.3%	17	1.9%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	117	31.5%	104	24.0%	13	16.3%	234	26.4%
6. 介護老人保健施設	98	26.3%	133	30.7%	22	27.5%	253	28.6%
7. 他の医療機関の一般病床	3	0.8%	7	1.6%	5	6.3%	15	1.7%
8. 他の医療機関の療養病床	33	8.9%	83	19.2%	24	30.0%	140	15.8%
9. 他の医療機関のその他の病床	5	1.3%	3	0.7%	0	0.0%	8	0.9%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	1	0.2%	1	1.3%	2	0.2%
12. 自院のその他の病床	9	2.4%	10	2.3%	1	1.3%	20	2.3%
13. その他	10	2.7%	3	0.7%	0	0.0%	13	1.5%
無回答	1	0.3%	1	0.2%	0	0.0%	2	0.2%
全 体	372	100.0%	433	100.0%	80	100.0%	885	100.0%

退院先の見通し(「悪化して転院・転棟・死亡する見通し」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=28)		医療区分2 (n=42)		医療区分3 (n=77)		合計 (n=147)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	0.7%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	1	3.6%	1	2.4%	1	1.3%	3	2.0%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	1	2.4%	1	1.3%	2	1.4%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	2	7.1%	1	2.4%	0	0.0%	3	2.0%
6. 介護老人保健施設	1	3.6%	2	4.8%	1	1.3%	4	2.7%
7. 他の医療機関の一般病床	4	14.3%	6	14.3%	5	6.5%	15	10.2%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	2	4.8%	4	5.2%	6	4.1%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	2	1.4%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	1	3.6%	0	0.0%	1	1.3%	2	1.4%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	5	17.9%	13	31.0%	11	14.3%	29	19.7%
12. 自院のその他の病床	5	17.9%	3	7.1%	5	6.5%	13	8.8%
13. その他	8	28.6%	11	26.2%	44	57.1%	63	42.9%
無回答	1	3.6%	2	4.8%	1	1.3%	4	2.7%
全 体	28	100.0%	42	100.0%	77	100.0%	147	100.0%

4 その他の患者状態像（医療区分採用項目以外）

疾患(複数回答)	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)
糖尿病	98	11.5%	203	15.8%	62	12.8%	363 13.9%
不整脈	37	4.3%	81	6.3%	34	7.0%	152 5.8%
うつ血性心不全	24	2.8%	39	3.0%	42	8.7%	105 4.0% ↓
高血圧症	167	19.6%	254	19.8%	86	17.8%	507 19.4%
虚血性心疾患	35	4.1%	79	6.2%	28	5.8%	142 5.4%
大腿骨頸部骨折	73	8.6%	71	5.5%	22	4.6%	166 6.3%
脊椎圧迫骨折	23	2.7%	46	3.6%	9	1.9%	78 3.0%
その他の骨折	49	5.8%	61	4.8%	16	3.3%	126 4.8%
関節リウマチ	23	2.7%	29	2.3%	2	0.4%	54 2.1%
アルツハイマー病	32	3.8%	42	3.3%	26	5.4%	100 3.8%
*失語症	48	5.6%	111	8.6%	34	7.0%	193 7.4%
脳性麻痺	7	0.8%	6	0.5%	2	0.4%	15 0.6%
*脳梗塞	311	36.5%	459	35.7%	168	34.8%	938 35.8% ↓
脳出血	142	16.7%	206	16.0%	60	12.4%	408 15.6%
アルツハイマー病以外の認知症	150	17.6%	245	19.1%	96	19.9%	491 18.8% ↑
片側不全麻痺	130	15.3%	171	13.3%	38	7.9%	339 12.9%
*四肢麻痺	34	4.0%	127	9.9%	46	9.5%	207 7.9%
脊髄損傷	4	0.5%	26	2.0%	2	0.4%	32 1.2%
喘息	21	2.5%	27	2.1%	26	5.4%	74 2.8%
腎不全	51	6.0%	112	8.7%	20	4.1%	183 7.0%
がん(悪性腫瘍)	46	5.4%	70	5.5%	57	11.8%	173 6.6%
腸閉塞(イレウス)＜新規＞	5	0.6%	10	0.8%	15	3.1%	30 1.1%
肝不全＜新規＞	5	0.6%	15	1.2%	7	1.4%	27 1.0%
急性心不全＜新規＞	2	0.2%	1	0.1%	9	1.9%	12 0.5%
慢性心不全＜新規＞	67	7.9%	81	6.3%	58	12.0%	206 7.9%
仮性球麻痺＜新規＞	71	8.3%	159	12.4%	61	12.6%	291 11.1%
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618 100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

疾患(複数回答)	平成17年度調査						
	医療区分1 (n=1,324)		医療区分2 (n=1,031)		医療区分3 (n=313)		合計 (n=2,668)
糖尿病	189	14.3%	163	15.8%	42	13.4%	394 14.8%
不整脈	59	4.5%	66	6.4%	20	6.4%	145 5.4%
うつ血性心不全	99	7.5%	85	8.2%	32	10.2%	216 8.1%
高血圧症	317	23.9%	217	21.0%	57	18.2%	591 22.2%
虚血性心疾患	105	7.9%	77	7.5%	17	5.4%	199 7.5%
大腿骨頸部骨折	99	7.5%	74	7.2%	15	4.8%	188 7.0%
脊椎圧迫骨折	52	3.9%	25	2.4%	5	1.6%	82 3.1%
その他の骨折	69	5.2%	37	3.6%	7	2.2%	113 4.2%
関節リウマチ	36	2.7%	32	3.1%	3	1.0%	71 2.7%
アルツハイマー病	48	3.6%	37	3.6%	12	3.8%	97 3.6%
失語症	46	3.5%	64	6.2%	13	4.2%	123 4.6%
脳性麻痺	5	0.4%	10	1.0%	3	1.0%	18 0.7%
脳梗塞	526	39.7%	390	37.8%	122	39.0%	1,038 38.9%
脳出血	184	13.9%	134	13.0%	44	14.1%	362 13.6%
アルツハイマー病以外の認知症	210	15.9%	138	13.4%	39	12.5%	387 14.5%
片側不全麻痺	219	16.5%	102	9.9%	38	12.1%	359 13.5%
四肢麻痺	39	2.9%	77	7.5%	23	7.3%	139 5.2%
脊髄損傷	8	0.6%	12	1.2%	2	0.6%	22 0.8%
喘息	41	3.1%	30	2.9%	18	5.8%	89 3.3%
腎不全	35	2.6%	72	7.0%	13	4.2%	120 4.5%
がん(悪性腫瘍)	53	4.0%	70	6.8%	20	6.4%	143 5.4%
全 体	1,324	100.0%	1,031	100.0%	313	100.0%	2,668 100.0%

感染症(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	6	0.7%	47	3.7%	45	9.3%	98	3.7%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	7	0.8%	20	1.6%	9	1.9%	36	1.4%
敗血症	0	0.0%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.2%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.0%
ウィルス性肝炎	3	0.4%	6	0.5%	1	0.2%	10	0.4%
皮膚の感染症	6	0.7%	20	1.6%	9	1.9%	35	1.3%
急性胆囊炎 <新規>	3	0.4%	7	0.5%	5	1.0%	15	0.6%
急性腹膜炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
急性肺炎 <新規>	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.0%
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618	100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

感染症(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=1,324)		医療区分2 (n=1,031)		医療区分3 (n=313)		合計 (n=2,668)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	25	1.9%	43	4.2%	30	9.6%	98	3.7%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	15	1.1%	31	3.0%	12	3.8%	58	2.2%
敗血症	4	0.3%	2	0.2%	3	1.0%	9	0.3%
多剤耐性結核	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	2	0.1%
上記以外の結核	0	0.0%	4	0.4%	2	0.6%	6	0.2%
ウィルス性肝炎	5	0.4%	8	0.8%	3	1.0%	16	0.6%
皮膚の感染症	5	0.4%	19	1.8%	4	1.3%	28	1.0%
全 体	1,324	100.0%	1,031	100.0%	313	100.0%	2,668	100.0%

問題状況(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)	
妄想	32	3.8%	81	6.3%	16	3.3%	129	4.9%
発熱	19	2.2%	146	11.4%	198	41.0%	363	13.9% ↑
幻覚	18	2.1%	43	3.3%	13	2.7%	74	2.8%
嘔吐	0	0.0%	38	3.0%	19	3.9%	57	2.2%
胸水 <新規>	1	0.1%	17	1.3%	24	5.0%	42	1.6%
腹水 <新規>	0	0.0%	6	0.5%	13	2.7%	19	0.7%
高カルシウム血症(10.5mg/dl以上) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.0%
悪疫質(癌を伴う) <新規>	2	0.2%	2	0.2%	10	2.1%	14	0.5%
消化管の通過障害(癌を伴う) <新規>	2	0.2%	4	0.3%	10	2.1%	16	0.6%
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618	100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

問題状況(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=1,324)		医療区分2 (n=1,031)		医療区分3 (n=313)		合計 (n=2,668)	
妄想	31	2.3%	30	2.9%	7	2.2%	68	2.5%
発熱	31	2.3%	131	12.7%	120	38.3%	282	10.6%
幻覚	14	1.1%	21	2.0%	5	1.6%	40	1.5%
嘔吐	0	0.0%	24	2.3%	15	4.8%	39	1.5%
全 体	1,324	100.0%	1,031	100.0%	313	100.0%	2,668	100.0%

処置・治療(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)	
抗がん剤療法	5	0.6%	3	0.2%	4	0.8%	12	0.5%
胃瘦、腎瘦、人工肛門などの瘦の処置	68	8.0%	275	21.4%	103	21.3%	446	17.0% ↑
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.0%
吸引(1日1~7回)	46	5.4%	103	8.0%	78	16.1%	227	8.7% ↓
輸血	1	0.1%	1	0.1%	2	0.4%	4	0.2%
緩和ケア	4	0.5%	12	0.9%	9	1.9%	25	1.0%
疼痛コントロール	30	3.5%	50	3.9%	23	4.8%	103	3.9%
膀胱留置カテーテル	50	5.9%	169	13.2%	187	38.7%	406	15.5% ↑
血糖チェック(週1回~1日2回)	24	2.8%	38	3.0%	18	3.7%	80	3.1%
インスリン皮下注射	19	2.2%	79	6.2%	25	5.2%	123	4.7%
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618	100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

処置・治療(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=1,324)		医療区分2 (n=1,031)		医療区分3 (n=313)		合計 (n=2,668)	
抗がん剤療法	1	0.1%	2	0.2%	0	0.0%	3	0.1%
胃瘦、腎瘦、人工肛門などの瘦の処置	104	7.9%	196	19.0%	74	23.6%	374	14.0%
放射線治療	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
吸引(1日1~7回)	110	8.3%	142	13.8%	62	19.8%	314	11.8%
輸血	2	0.2%	0	0.0%	1	0.3%	3	0.1%
緩和ケア	13	1.0%	19	1.8%	5	1.6%	37	1.4%
疼痛コントロール	67	5.1%	74	7.2%	6	1.9%	147	5.5%
膀胱留置カテーテル	64	4.8%	124	12.0%	100	31.9%	288	10.8%
血糖チェック(週1回~1日2回)	65	4.9%	49	4.8%	21	6.7%	135	5.1%
インスリン皮下注射	45	3.4%	50	4.8%	12	3.8%	107	4.0%
全 体	1,324	100.0%	1,031	100.0%	313	100.0%	2,668	100.0%

状態の安定性(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)	
個室における管理が必要	4	0.5%	24	1.9%	53	11.0%	81	3.1%
* 急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	11	1.3%	83	6.5%	92	19.0%	186	7.1%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	7	0.8%	11	0.9%	39	8.1%	57	2.2%
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618	100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

状態の安定性(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=1,324)		医療区分2 (n=1,031)		医療区分3 (n=313)		合計 (n=2,668)	
絶対安静	14	1.1%	27	2.6%	36	11.5%	77	2.9%
個室における管理が必要	3	0.2%	19	1.8%	37	11.8%	59	2.2%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	30	2.3%	97	9.4%	93	29.7%	220	8.2%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	8	0.6%	15	1.5%	14	4.5%	37	1.4%
全 体	1,324	100.0%	1,031	100.0%	313	100.0%	2,668	100.0%

栄養摂取の方法(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	150	31.1%	150	5.7% ↑
末梢静脈栄養	10	1.2%	44	3.4%	86	17.8%	140	5.3%
経管栄養	156	18.3%	551	42.9%	189	39.1%	896	34.2% ↑
いずれか1つ以上該当	165	19.4%	585	45.6%	387	80.1%	1,137	43.4% ↑
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618	100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

栄養摂取の方法(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=1,324)		医療区分2 (n=1,031)		医療区分3 (n=313)		合計 (n=2,668)	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	52	16.6%	52	1.9%
末梢静脈栄養	28	2.1%	47	4.6%	62	19.8%	137	5.1%
経管栄養	251	19.0%	398	38.6%	139	44.4%	788	29.5%
いずれか1つ以上該当	278	21.0%	436	42.3%	226	72.2%	940	35.2%
全 体	1,324	100.0%	1,031	100.0%	313	100.0%	2,668	100.0%

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=525)		医療区分2 (n=735)		医療区分3 (n=185)		合計 (n=1,445)	
14日以下	0	0.0%	23	3.1%	3	1.6%	26	1.8%
15日から30日以下	0	0.0%	57	7.8%	3	1.6%	60	4.2%
31日から90日以下	89	17.0%	78	10.6%	24	13.0%	191	13.2%
91日から180日以下	99	18.9%	93	12.7%	37	20.0%	229	15.8%
* 181日以上	330	62.9%	480	65.3%	113	61.1%	923	63.9% ↓
無回答	7	1.3%	4	0.5%	5	2.7%	16	1.1%
全 体	525	100.0%	735	100.0%	185	100.0%	1,445	100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=917)		医療区分2 (n=638)		医療区分3 (n=141)		合計 (n=1,696)	
14日以下	0	0.0%	29	4.5%	3	2.1%	32	1.9%
15日から30日以下	0	0.0%	34	5.3%	8	5.7%	42	2.5%
31日から90日以下	119	13.0%	48	7.5%	14	9.9%	181	10.7%
91日から180日以下	131	14.3%	78	12.2%	12	8.5%	221	13.0%
181日以上	639	69.7%	434	68.0%	101	71.6%	1,174	69.2%
無回答	28	3.1%	15	2.4%	3	2.1%	46	2.7%
全 体	917	100.0%	638	100.0%	141	100.0%	1,696	100.0%

日常の意思決定を行うための認知能力	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=851)		医療区分2 (n=1,284)		医療区分3 (n=483)		合計 (n=2,618)	
自立	218	25.6%	186	14.5%	41	8.5%	445	17.0% ↓
限定的な自立	125	14.7%	148	11.5%	40	8.3%	313	12.0%
軽度の障害	87	10.2%	110	8.6%	24	5.0%	221	8.4%
中程度の障害	140	16.5%	184	14.3%	57	11.8%	381	14.6%
重度の障害	178	20.9%	331	25.8%	146	30.2%	655	25.0% ↑
* 意識障害者	94	11.0%	307	23.9%	170	35.2%	571	21.8%
無回答	9	1.1%	18	1.4%	5	1.0%	32	1.2%
全 体	851	100.0%	1,284	100.0%	483	100.0%	2,618	100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

日常の意思決定を行うための認知能力	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=1,324)		医療区分2 (n=1,031)		医療区分3 (n=313)		合計 (n=2,668)	
自立	338	25.5%	167	16.2%	51	16.3%	556	20.8%
限定的な自立	195	14.7%	121	11.7%	28	8.9%	344	12.9%
軽度の障害	123	9.3%	101	9.8%	10	3.2%	234	8.8%
中程度の障害	222	16.8%	183	17.7%	35	11.2%	440	16.5%
重度の障害	273	20.6%	229	22.2%	67	21.4%	569	21.3%
意識障害者	157	11.9%	224	21.7%	121	38.7%	502	18.8%
無回答	16	1.2%	6	0.6%	1	0.3%	23	0.9%
全 体	1,324	100.0%	1,031	100.0%	313	100.0%	2,668	100.0%

5 詳細条件該当状況（平成18年度調査のみ）

VII.1 疾患 e. 慢性心不全

NYHA III度/IV度	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=67)		医療区分2 (n=81)		医療区分3 (n=58)		合計 (n=206)
1. III度未満	39	58.2%	33	40.7%	23	39.7%	95 46.1%
2. III度	8	11.9%	19	23.5%	11	19.0%	38 18.4%
3. IV度	2	3.0%	9	11.1%	16	27.6%	27 13.1%
(再掲) III度+IV度	10	14.9%	28	34.6%	27	46.6%	65 31.6%
無回答	18	26.9%	20	24.7%	8	13.8%	46 22.3%
全 体	67	100.0%	81	100.0%	58	100.0%	206 100.0%

VII.1 疾患 a b. 肺気腫／慢性閉塞性肺疾患 (COPD)

Hugh Jones IV度/V度の状態	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=62)		医療区分3 (n=64)		合計 (n=126)
1. IV度未満	0	-	22	35.5%	8	12.5%	30 23.8%
2. IV度	0	-	5	8.1%	10	15.6%	15 11.9%
3. V度	0	-	32	51.6%	36	56.3%	68 54.0%
(再掲) IV度+V度	0	-	37	59.7%	46	71.9%	83 65.9%
無回答	0	-	3	4.8%	10	15.6%	13 10.3%
全 体	0	-	62	100.0%	64	100.0%	126 100.0%

VII.1 疾患 a e. 腎不全

高クレアチニン血症2.0mg/dl以上	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=51)		医療区分2 (n=112)		医療区分3 (n=20)		合計 (n=183)
0. なし	32	62.7%	35	31.3%	6	30.0%	73 39.9%
1. あり	17	33.3%	72	64.3%	12	60.0%	101 55.2%
無回答	2	3.9%	5	4.5%	2	10.0%	9 4.9%
全 体	51	100.0%	112	100.0%	20	100.0%	183 100.0%

VI.1 疾患 a f. 肝不全

(1)ビリルビン		平成18年度調査						
		医療区分1 (n=5)		医療区分2 (n=15)		医療区分3 (n=7)		合計 (n=27)
1. <2	2	40.0%	6	40.0%	3	42.9%	11	40.7%
2. 2~3	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	3.7%
3. >3	1	20.0%	2	13.3%	0	0.0%	3	11.1%
無回答	2	40.0%	7	46.7%	3	42.9%	12	44.4%
全 体	5	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	27	100.0%

(2)アルブミン		平成18年度調査						
		医療区分1 (n=5)		医療区分2 (n=15)		医療区分3 (n=7)		合計 (n=27)
1. >3.5	0	0.0%	3	20.0%	1	14.3%	4	14.8%
2. 2.8~3.5	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	7.4%
3. <2.8	3	60.0%	5	33.3%	3	42.9%	11	40.7%
無回答	2	40.0%	5	33.3%	3	42.9%	10	37.0%
全 体	5	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	27	100.0%

(3)PT(%)		平成18年度調査						
		医療区分1 (n=5)		医療区分2 (n=15)		医療区分3 (n=7)		合計 (n=27)
1. >80	0	0.0%	1	6.7%	1	14.3%	2	7.4%
2. 60~80	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. <60	1	20.0%	1	6.7%	1	14.3%	3	11.1%
無回答	4	80.0%	13	86.7%	5	71.4%	22	81.5%
全 体	5	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	27	100.0%

(4)腹水		平成18年度調査						
		医療区分1 (n=5)		医療区分2 (n=15)		医療区分3 (n=7)		合計 (n=27)
1. なし	1	20.0%	8	53.3%	0	0.0%	9	33.3%
2. 軽度	3	60.0%	1	6.7%	0	0.0%	4	14.8%
3. 中等度	0	0.0%	2	13.3%	5	71.4%	7	25.9%
無回答	1	20.0%	4	26.7%	2	28.6%	7	25.9%
全 体	5	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	27	100.0%

(5)脳症		平成18年度調査						
		医療区分1 (n=5)		医療区分2 (n=15)		医療区分3 (n=7)		合計 (n=27)
1. なし	2	40.0%	9	60.0%	4	57.1%	15	55.6%
2. Grade1~2	1	20.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	7.4%
3. Grade3~4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	2	40.0%	5	33.3%	3	42.9%	10	37.0%
全 体	5	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	27	100.0%

Child-Pugh分類 (上記5項目の合計スコア)		平成18年度調査						
		医療区分1 (n=5)		医療区分2 (n=15)		医療区分3 (n=7)		合計 (n=27)
1. Class A (5~6点)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2. Class B (7~9点)	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	3.7%
3. Class C (10~15点)	1	20.0%	1	6.7%	2	28.6%	4	14.8%
無回答	4	80.0%	13	86.7%	5	71.4%	22	81.5%
全 体	5	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	27	100.0%

VII.2 感染症 h. 尿路感染症

(1)細菌尿/白血球尿(>10/HPF)の該当状況 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査					
	医療区分1 (n=0)	医療区分2 (n=124)	医療区分3 (n=54)	合計 (n=178)		
1. 両方該当なし	0	-	7	5.6%	5	9.3%
2. 細菌尿のみ該当	0	-	14	11.3%	3	5.6%
3. 白血球尿(>10/HPF)のみ該当	0	-	9	7.3%	3	5.6%
4. 両方該当	0	-	87	70.2%	35	64.8%
無回答	0	-	7	5.6%	8	14.8%
全 体	0	-	124	100.0%	54	100.0%
					178	100.0%

VII.1 問題状況 a. 脱水

(1)舌の乾燥 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査					
	医療区分1 (n=0)	医療区分2 (n=81)	医療区分3 (n=57)	合計 (n=138)		
0. なし	0	-	12	14.8%	13	22.8%
1. あり	0	-	68	84.0%	43	75.4%
無回答	0	-	1	1.2%	1	1.8%
全 体	0	-	81	100.0%	57	100.0%
					138	100.0%

(2)皮膚の乾燥 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査					
	医療区分1 (n=0)	医療区分2 (n=81)	医療区分3 (n=57)	合計 (n=138)		
0. なし	0	-	12	14.8%	8	14.0%
1. あり	0	-	67	82.7%	48	84.2%
無回答	0	-	2	2.5%	1	1.8%
全 体	0	-	81	100.0%	57	100.0%
					138	100.0%

(3)尿量減少 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査					
	医療区分1 (n=0)	医療区分2 (n=81)	医療区分3 (n=57)	合計 (n=138)		
0. なし	0	-	51	63.0%	30	52.6%
1. あり	0	-	28	34.6%	24	42.1%
無回答	0	-	2	2.5%	3	5.3%
全 体	0	-	81	100.0%	57	100.0%
					138	100.0%

(4)BUN/Cre比の上昇 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査					
	医療区分1 (n=0)	医療区分2 (n=81)	医療区分3 (n=57)	合計 (n=138)		
0. なし	0	-	67	82.7%	31	54.4%
1. あり	0	-	12	14.8%	23	40.4%
無回答	0	-	2	2.5%	3	5.3%
全 体	0	-	81	100.0%	57	100.0%
					138	100.0%

項目該当状況 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査					
	医療区分1 (n=0)	医療区分2 (n=81)	医療区分3 (n=57)	合計 (n=138)		
1. 0項目該当	0	-	0	0.0%	0	0.0%
2. 1項目該当	0	-	15	18.5%	10	17.5%
3. 2項目該当	0	-	41	50.6%	20	35.1%
4. 3項目該当	0	-	15	18.5%	11	19.3%
5. 4項目該当	0	-	8	9.9%	12	21.1%
無回答	0	-	2	2.5%	4	7.0%
全 体	0	-	81	100.0%	57	100.0%
					138	100.0%

VII.1 問題状況 f. 嘔吐

1日の間に繰り返しの嘔吐	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=0)	医療区分2 (n=38)	医療区分3 (n=19)	合 計 (n=57)			
0. なし	0	-	30	78.9%	12	63.2%	42 73.7%
1. あり	0	-	7	18.4%	6	31.6%	13 22.8%
無回答	0	-	1	2.6%	1	5.3%	2 3.5%
全 体	0	-	38	100.0%	19	100.0%	57 100.0%

VIII.2 栄養摂取の方法 a. 中心静脈栄養

消化管異常、悪性腫瘍等により消化管からの栄養摂取が困難である	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=0)	医療区分2 (n=0)	医療区分3 (n=150)	合 計 (n=150)			
0. なし	0	-	0	43	28.7%	43	28.7%
1. あり	0	-	0	94	62.7%	94	62.7%
無回答	0	-	0	13	8.7%	13	8.7%
全 体	0	-	0	150	100.0%	150	100.0%

X.2 注射・点滴 e. 24時間の持続点滴

経口摂取が困難/体液の不均衡(電解質異常等)の状況 (点滴を行った際に認められたかどうか)	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=0)	医療区分2 (n=0)	医療区分3 (n=198)	合 計 (n=198)			
1. 両方該当なし	0	-	0	7	3.5%	7	3.5%
2. 経口摂取が困難のみ該当	0	-	0	87	43.9%	87	43.9%
3. 体液の不均衡(電解質異常等)のみ該当	0	-	0	6	3.0%	6	3.0%
4. 両方該当	0	-	0	84	42.4%	84	42.4%
無回答	0	-	0	14	7.1%	14	7.1%
全 体	0	-	0	198	100.0%	198	100.0%

X II.1 処置・治療 e. 酸素療法

(1) 安静時でSaO ₂ 90%以下に該当	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=249)		合 計 (n=249)
0. なし	0	-	0	-	83	33.3%	83 33.3%
1. あり	0	-	0	-	157	63.1%	157 63.1%
無回答	0	-	0	-	9	3.6%	9 3.6%
全 体	0	-	0	-	249	100.0%	249 100.0%

(2) 睡眠時でSaO ₂ 90%以下に該当	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=249)		合 計 (n=249)
0. なし	0	-	0	-	103	41.4%	103 41.4%
1. あり	0	-	0	-	131	52.6%	131 52.6%
無回答	0	-	0	-	15	6.0%	15 6.0%
全 体	0	-	0	-	249	100.0%	249 100.0%

(3) 運動負荷時でSaO ₂ 90%以下に該当	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=249)		合 計 (n=249)
0. なし	0	-	0	-	93	37.3%	93 37.3%
1. あり	0	-	0	-	125	50.2%	125 50.2%
無回答	0	-	0	-	31	12.4%	31 12.4%
全 体	0	-	0	-	249	100.0%	249 100.0%

3項目該当状況	平成18年度調査						
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=249)		合 計 (n=249)
0. いずれも該当なし	0	-	0	-	47	18.9%	47 18.9%
1. 1つ以上に該当	0	-	0	-	171	68.7%	171 68.7%
無回答	0	-	0	-	31	12.4%	31 12.4%
全 体	0	-	0	-	249	100.0%	249 100.0%

X II.1 処置・治療 g. 吸引

(1)過去7日間のうち1日の最大回数 (回数毎患者数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=46)		医療区分2 (n=446)		医療区分3 (n=286)		合 計 (n=778)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	8	17.4%	8	1.8%	5	1.7%	21	2.7%
2回	5	10.9%	10	2.2%	3	1.0%	18	2.3%
3回	10	21.7%	19	4.3%	16	5.6%	45	5.8%
4回	5	10.9%	16	3.6%	10	3.5%	31	4.0%
5回	8	17.4%	23	5.2%	16	5.6%	47	6.0%
6回	6	13.0%	14	3.1%	20	7.0%	40	5.1%
7回	4	8.7%	13	2.9%	8	2.8%	25	3.2%
8回	0	0.0%	62	13.9%	34	11.9%	96	12.3%
9回	0	0.0%	28	6.3%	7	2.4%	35	4.5%
10回	0	0.0%	74	16.6%	33	11.5%	107	13.8%
11回	0	0.0%	11	2.5%	5	1.7%	16	2.1%
12回	0	0.0%	40	9.0%	24	8.4%	64	8.2%
13回	0	0.0%	16	3.6%	11	3.8%	27	3.5%
14回	0	0.0%	9	2.0%	11	3.8%	20	2.6%
15回	0	0.0%	38	8.5%	24	8.4%	62	8.0%
16回	0	0.0%	10	2.2%	7	2.4%	17	2.2%
17回	0	0.0%	4	0.9%	4	1.4%	8	1.0%
18回	0	0.0%	9	2.0%	3	1.0%	12	1.5%
19回	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%
20回	0	0.0%	13	2.9%	20	7.0%	33	4.2%
21回以上	0	0.0%	25	5.6%	21	7.3%	46	5.9%
無回答	0	0.0%	4	0.9%	3	1.0%	7	0.9%
全 体	46	100.0%	446	100.0%	286	100.0%	778	100.0%
平均値	3.7		10.8		11.6		10.7	
標準偏差	1.9		6.4		8.0		7.1	
最大値	7		56		97		97	
最小値	1		1		1		1	

(2)過去7日間のうち1日の最大回数 (累積度数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=46)		医療区分2 (n=446)		医療区分3 (n=286)		合 計 (n=778)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	8	17.4%	8	1.8%	5	1.7%	21	2.7%
2回	13	28.3%	18	4.0%	8	2.8%	39	5.0%
3回	23	50.0%	37	8.3%	24	8.4%	84	10.8%
4回	28	60.9%	53	11.9%	34	11.9%	115	14.8%
5回	36	78.3%	76	17.0%	50	17.5%	162	20.8%
6回	42	91.3%	90	20.2%	70	24.5%	202	26.0%
7回	46	100.0%	103	23.1%	78	27.3%	227	29.2%
8回	46	100.0%	165	37.0%	112	39.2%	323	41.5%
9回	46	100.0%	193	43.3%	119	41.6%	358	46.0%
10回	46	100.0%	267	59.9%	152	53.1%	465	59.8%
11回	46	100.0%	278	62.3%	157	54.9%	481	61.8%
12回	46	100.0%	318	71.3%	181	63.3%	545	70.1%
13回	46	100.0%	334	74.9%	192	67.1%	572	73.5%
14回	46	100.0%	343	76.9%	203	71.0%	592	76.1%
15回	46	100.0%	381	85.4%	227	79.4%	654	84.1%
16回	46	100.0%	391	87.7%	234	81.8%	671	86.2%
17回	46	100.0%	395	88.6%	238	83.2%	679	87.3%
18回	46	100.0%	404	90.6%	241	84.3%	691	88.8%
19回	46	100.0%	404	90.6%	242	84.6%	692	88.9%
20回	46	100.0%	417	93.5%	262	91.6%	725	93.2%
21回以上	46	100.0%	442	99.1%	283	99.0%	771	99.1%
無回答	46	100.0%	446	100.0%	286	100.0%	778	100.0%
全 体	46	100.0%	446	100.0%	286	100.0%	778	100.0%

X II.1 処置・治療 o. 血糖チェック

(1)過去7日間のうち1日の最大回数 (回数毎患者数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=26)		医療区分2 (n=141)		医療区分3 (n=48)		合 計 (n=215)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	16	61.5%	26	18.4%	13	27.1%	55	25.6%
2回	8	30.8%	12	8.5%	5	10.4%	25	11.6%
3回	0	0.0%	69	48.9%	20	41.7%	89	41.4%
4回	0	0.0%	17	12.1%	5	10.4%	22	10.2%
5回	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%
6回以上	0	0.0%	13	9.2%	4	8.3%	17	7.9%
無回答	2	7.7%	3	2.1%	1	2.1%	6	2.8%
全 体	26	100.0%	141	100.0%	48	100.0%	215	100.0%
平均値	1.3		3.3		3.4		3.1	
標準偏差	0.5		3.2		4.2		3.3	
最大値	2		30		23		30	
最小値	1		1		1		1	

(2)過去7日間のうち1日の最大回数 (累積度数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=26)		医療区分2 (n=141)		医療区分3 (n=48)		合 計 (n=215)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	16	61.5%	26	18.4%	13	27.1%	55	25.6%
2回	24	92.3%	38	27.0%	18	37.5%	80	37.2%
3回	24	92.3%	107	75.9%	38	79.2%	169	78.6%
4回	24	92.3%	124	87.9%	43	89.6%	191	88.8%
5回	24	92.3%	125	88.7%	43	89.6%	192	89.3%
6回以上	24	92.3%	138	97.9%	47	97.9%	209	97.2%
無回答	26	100.0%	141	100.0%	48	100.0%	215	100.0%
全 体	26	100.0%	141	100.0%	48	100.0%	215	100.0%