

みすむし、いんきんたむし、ぜにたむし

1日1回適量を患部に噴霧して下さい。


【用法・用量に関する注意】

1. 定められた用法を厳守して下さい。
2. 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。
3. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。
4. 小児に使用せる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
5. 外用にのみ使用して下さい。
6. 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないで下さい。
7. 足の指の間にみすむしがある場合には患部から2~3cm位、その他のみすむし、たむしには5cm位の距離から噴霧して下さい。なお、噴霧口をよく確かめ、顔面特に目に向けて噴霧したり、吸入しないで下さい。また、点鼻用として鼻腔内に使用しないで下さい。

噴霧操作のポイント

1. 翻掌で行いますと操作が容易です。
2. スプレー頭部を押す際、途中で止めず一気に最後まで押し込んで下さい。
3. 使用開始時すぐに噴霧されないことがあります、数回空吹きすると噴霧できるようになります。

使用方法



ご使用の際は青いキャップをはずし、患部に噴霧口を向けてスプレー頭部を押して下さい。
逆さまにしても同量だけ噴霧できます。
患部には2~3cm位の距離から、より広範な患部には5cm位の距離から噴霧して下さい。

ラミシールAT 噴霧液(スプレー)は、無色~微黄色透明の液剤のスプレーで、1g中に塩酸テルビナフィン10mgを含有しています。

添加物：ポリオキシエチレンセタステアリルエーテル、プロピレングリコール、アルコール

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わります。)。
4. 使用期限をすぎた製品は使用しないで下さい。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用して下さい。
5. 火気には近づけないで下さい。
6. 使用済み容器は火中に投じないで下さい。
7. 本剤は合成樹脂(スチロール等)を軟化したり塗料をとかしたりすることがあるので、床や家具等につかないようにして下さい。

水虫・たむしの原因である白癬菌(水虫菌)は、症状があらわれている範囲より広く寄生していることが多いので、薬剤を広めに噴霧することをお勧めします。また、以下のことに留意して使用して下さい。

1. 根気よく継続治療する

- かゆみなどの症状がなくなった後も、約1カ月間は、根気よく治療を続けて下さい。



2. 患部を清潔にする

- 白癬菌の増殖を抑え、二次感染を防ぐため、患部をよく洗い清潔に保って下さい。
- 薬剤を塗布した後、患部に芯れた手や指もしっかりと洗って下さい。



3. 患部の乾燥に心がける

- 白癬菌はじめじめした環境を好みます。入浴あとや、スポーツなどで汗をかいたあとはしっかり患部を乾燥させて下さい。
- 通気性の悪い靴・靴下はなるべく避け、患部を乾燥させるよう心がけて下さい。



4. 履き物なども清潔に

- 靴、靴下、スリッパ、浴室のマットなども清潔に保ち、感染に注意して下さい。
- 靴のむれは水虫の温床になります。数足を毎日順番にはきかえるよう心がけて下さい。



お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願い致します。

ノバルティス ファーマ株式会社
お客様相談室

〒106-8618 東京都港区西麻布4丁目17番30号
電話 03(5766)2615

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

05

「輸入品」

製造販売元

ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区西麻布4-17-30

7411797-D

NOVARTIS

ラミシールATクリーム



ラミシール
AT.クリーム

殺真菌成分
塩酸テルビナフィン配合
1日1回で効く

LAMISIL AT[®]

NOVARTIS



ラミシール
AT.クリーム

殺真菌成分
塩酸テルビナフィン配合
1日1回で効く

LAMISIL AT[®]

7411790
A 12345
1

ラミシールAT[®]クリーム

医薬部外品 10g

1. 本中の成分、塩酸テルビナフィン 10mg
濃度物:ゼンソール・スマリアルコール、
パルミチン酸セチル、ミスチド酸イソブロ
ビルミン、ステアリン酸トリセタノキ、セチル
ベヘート、ベントジカルコール、甘草酸アル
コール、水、防腐剤(メチルヒドロキシ
丙酸)、着色料(β-ヒドロキシエチル)、ビタミン
E、香料、用法:用法:1日1回、患部を局部的に塗布して
ください。

2. 次の部位には使用しないで下さい
(1) 目や口の周囲、粘膜(けつもく)、鼻(ぬの)、
耳(みみ)、喉(のど)、舌(ぜつ)、歯(は)
(2) 患部(かんぶつ)をたどり、角質(かくしつ)
や外因(がいいん)のひどい皮膚(ひふ)。

3. 使用上の注意
1. 次の人は使用しないで下さい
本剤による過敏症(かゆみ)、発疹(はれしん)、
かゆみがある人を表記した。
2. 次の部位には使用しないで下さい
本剤による過敏症(かゆみ)、発疹(はれしん)、
かゆみがある人を表記した。
3. 小児の手
の届かない所に保管して下さい。4. 他の医
薬と一緒に服用しないで下さい(閉鎖的(へい
さくせき)な状態(じょうたい)で、商品(めい
ざん)が変わります)。5. 使用期限
を過ぎた製品(せいひん)は使用しないで下さい。
6. 本剤は医薬部外品(いやくぶがい品种)であ
るため、医薬(いやく)としての販賣(はん
ばい)や販賣(はんばい)をして下さい。

35×30×110


C188

ラミシールAT液




C187

ラミシールATスプレー



35×35×10

C190

一般名	プラノプロフェン		
構造式	 及び鏡像異性体		
医療用製剤	ニフラン点眼液 0.1% (5 ml) 等		
医療用承認年月日	昭和 63 年 6 月 28 日等		
医療用効能・効果	外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法（眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、前眼部ブドウ膜炎、術後炎症）		
医療用用法・用量	1回 1~2 滴、1日 4 回。症状により適宜回数を増減。		
一般用製剤	①マイティアアイテクト ②マイティアキュア ③マイティアノンステロン ④ロートクリア ⑤ロートなみだクリーン ⑥ロートティアロック ⑦ロートティアブロック	⑧ロートアルクリア ⑨ロートアイクリア ⑩アイリスガード P ⑪アイリスガード i ⑫アイリスプラノ ⑬ホワイトアイリス 40	
一般用承認年月日	①~③ 平成 14 年 12 月 10 日 ④~⑬ 平成 17 年 11 月 2 日		
一般用効能・効果	目の次の症状の緩和： 目のかゆみ、異物感（コロコロ、チクチクする感じ）、結膜充血、なみだ目、目やにの多いときの目のかすみ		
一般用用法・用量	1回 1~2 滴、1日 4 回点眼すること。		
一般用医薬品市販後調査結果等	マイティアアイテクト等の市販後調査（第 1 次：平成 15 年 10 月 16 日～平成 16 年 10 月 15 日、第 2 次：平成 16 年 10 月 16 日～平成 17 年 10 月 15 日、第 3 次：平成 17 年 10 月 16 日～平成 18 年 10 月 15 日）		
	(1) 特別調査：1690 例中 7 例（8 件）（副作用発現率 0.41%） 眼瞼湿疹 2 件、眼球重感、羞明、流涙増加、結膜炎、結膜充血、適用部位疼痛各 1 件 いずれも非重篤で投与部位である眼局所における副作用であった。		
	(2) 一般調査：60 例（91 件）		

	<p>・既知の副作用</p> <p>結膜充血 20 件、眼瞼腫脹 10 件、適用部位そう痒感 6 件、適用部位刺激感 5 件、眼の異物感、結膜浮腫各 3 件、流涙、眼瞼炎各 2 件、眼瞼皮膚炎、眼瞼発赤、眼瞼浮腫、眼脂、呼吸困難、発疹、眼窩周囲紅斑、紅斑、発赤、皮膚発赤、蕁麻疹各 1 件</p> <p>※ 重篤とされた「眼瞼腫脹」、「呼吸困難」の転帰については軽快若しくは回復を確認。</p> <p>・未知の副作用</p> <p>眼痛 5 件、霧視 3 件、角膜びらん、めまい感各 2 件、結膜炎増悪、アレルギー性結膜炎、虹彩炎、涙嚢炎、眼部不快感、高熱、喉頭浮腫、咽頭浮腫、咽頭痛、鼻閉、副鼻腔痛、冷汗、そう痒症、浮動性めまい、頭痛、頭部のしびれ感、顔面のしびれ感各 1 件</p> <p>※ 重篤若しくは中等度とされた「喉頭浮腫」、「咽頭浮腫」、「浮動性めまい」、「冷汗」、「そう痒症」、「角膜びらん」、「虹彩炎」軽快若しくは回復を確認。</p> <p>個々の発現件数は少なく、特に本剤との因果関係が明確な副作用の発現はないことから、添付文書改訂等の特段の措置は必要ないと考えられる。</p>
対応案	プラノプロフェンとして 1 mL 中 0.5 mg 以下を含有する外用剤（点眼剤）を指定医薬品から解除する。

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるように大切に保管すること。

眼科疾患　スッキリしない目のかゆみ・異物感　なみだ目　充血に効く

マイティア アイテクト[®]

医薬品

販売名　マイティアアイテクト

消炎成分「プラノプロフェン」配合

特徴

- マイティアアイテクトは、消炎成分「プラノプロフェン」を配合し、目の炎症から起こるスッキリしない目のかゆみ、異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、なみだ目、結膜充血などの症状によく効きます。

プラノプロフェンの働き

目に外的刺激※が加わると、炎症の原因物質「プロスタグランジン」が生成されます。「プラノプロフェン」は、炎症の原因となるこの物質の生成を抑制することにより、目の炎症症状に効果を発揮します。

※目の炎症を引き起こす外的刺激には、花粉、ハウスダスト、コンタクトレンズ、紫外線、大気汚染などがあります。

- 目やにの多いときの目のかすみに効きめがあります。

- やさしい清涼感のある無色透明の点眼液です。

△ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 7歳未満の小児。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人は。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
 (5) 次の診断を受けた人。
 緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、刺激感、異物感、なみだ目、目やに
その他	息苦しさ

- (2) 症状が悪化した場合
- (3) 目のかすみが改善されない場合(線内障等の可能性も考えられる)
- (4) 3日位使用しても症状がよくならない場合
- (5) 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合

効能

目の次の症状の緩和:


目のかゆみ、異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、結膜充血、なみだ目、目やにの多いときの目のかすみ

用法・用量

1回1~2滴、1日4回点眼すること。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。
また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
(一旦レンズをはずしてから点眼すること。)
- (4) 点眼用にのみ使用すること。
- (5) 用法・用量を厳守すること。



成分


1mL中

プラノプロフェン 0.5mg

添加物: ホウ酸、エデト酸ナトリウム、ジブチルヒドロキシトルエン、塩化ベンザルコニウム、l-メントール、ポリソルベート80、ホウ砂、dl-カンフル

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。
なお、本剤は光による品質の変化を防ぐため、密栓して、必ず添付の携帯用袋(しゃ光性がある)に入れること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり、品質が変わること。)
- (4) 他の人と共用しないこと。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、使用期限内であっても、開封後はすみやかに使用すること。



包装

15mL

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。

千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」

〒541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号

電話(06)6201-8552

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 千寿製薬株式会社

〒541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号

販売元 武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

目の異物感・なみだ目・充血・かゆみに

アイリスガードP

〈眼科用薬〉



- ◆アイリスガードPは抗炎症成分のプラノプロフェンを配合した目薬です。
- ◆プラノプロフェンは炎症の原因物質(プロスタグランジン)の生成をおさえることにより、目の異物感(コロコロ・チクチクする感じ)・なみだ目・充血・かゆみ等の症状を緩和します。
- ◆やさしい清涼感の目薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 7才未満の小児。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人は。



相談すること

① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に 相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
 緑内障

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を 持つて医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、刺激感、 異物感、なみだ目、目やに
その他	息苦しさ

- (2) 症状が悪化した場合。
- (3) 目のかすみが改善されない場合。(緑内障等の可能性も
考えられる)
- (4) 3日位使用しても症状がよくならない場合。
- (5) 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合。

