

大切な腎臓を守るために、T市の特徴を見てみよう

腎臓の病気分類	GFR基準 (mg/分)	年齢	性別	糸球体ろ過量 (GFR) (mg/分)	血清クレアチニン 1.3mg/分以上	+危険因子の重なり				
						血圧 収縮期: 140mmHg以上 拡張期: 90mmHg以上 または高血圧で治療中	尿酸 7mg/d以上 または 高尿酸血症・痛風で 治療中	脂質異常 LDL: 140mg/d以上 または 高脂血症で治療中	糖代謝異常 空腹時血糖: 110mg/d以上 随時血糖: 140mg/d以上 HbA1c 5.5%以上 または糖尿病で治療中	BMI 25以上
(人工透析期)	15.0未満	65	女	6.6	5.98	○	○		○	
		65	男	13.8	4.1	○	○			
腎機能不全期	29.9	87	女	19.6	2.22	○				○
		89	男	20.2	1.94					
		72	女	23.0	2	○			○	
		91	男	23.4	2.45		○		○	
		81	女	25.5	1.79	○				
		67	男	28.7	2.16	○				○
		77	男	29.0	2.09		○		○	
		30	女	31.4	1.78			○		
		81	女	33.8	1.4	○				
		77	女	34.2	1.4	○	○			
		71	女	35.1	1.39	○			○	
		70	男	35.2	1.8	○	○			
		76	男	35.7	1.75	○	○			
		80	男	35.8	1.73		○			
		腎機能障害期	30.0	84	女	36.0	1.32	○		
82	男			36.9	1.68	○			○	
51	男			37.3	1.81					○
51	女			38.4	1.36					
56	男			38.8	1.72		○			
76	男			38.8	1.63	○	○			
69	男			39.3	1.64	○			○	
85	男			39.6	1.57	○	○			○
71	男			40.8	1.58	○			○	○
79	男			40.8	1.55				○	
72	男			40.9	1.57		○			
83	男			41.0	1.53		○			
75	男			41.5	1.54		○			
65	男			42.4	1.55				○	
69	男			42.5	1.53	○				
71	男			42.6	1.52					○
80	男			42.6	1.49					
90	男			42.9	1.45	○				
58	男			43.1	1.56		○			
79	男			43.3	1.47	○				
79	男			43.3	1.47		○			○
73	男			43.4	1.49				○	
76	男			43.7	1.47				○	○
79	男			43.7	1.46	○	○			
81	男			43.8	1.44					
82	男			44.6	1.42					
61	男			45.0	1.49	○			○	
68	男			45.0	1.46	○			○	
74	男			45.0	1.44	○	○			
65	男			45.1	1.47	○	○			
78	男			45.2	1.42	○				○
77	男			45.3	1.42		○			
66	男			45.7	1.45	○			○	
64	男			46.0	1.45		○			
80	男			46.1	1.39		○		○	
67	男			46.3	1.43		○			
67	男			46.3	1.43	○	○		○	
73	男			46.6	1.4		○		○	
85	男			46.7	1.36				○	
74	男			46.8	1.39	○				
77	男			46.9	1.38	○		○		
62	男			47.0	1.43	○	○			
73	男			47.0	1.39	○	○		○	
71	男			47.2	1.39	○	○		○	
78	男			47.5	1.36				○	
81	男	47.6	1.35	○			○			
83	男	47.7	1.34	○			○			
85	男	47.9	1.33				○			
77	男	48.5	1.34	○				○		
91	女	48.5	1.3		○					
70	男	48.6	1.36	○			○			
73	男	48.6	1.35			○	○			
74	男	48.9	1.34	○						
77	男	49.3	1.32	○						
81	男	49.3	1.31				○			
62	男	49.4	1.37		○		○			
80	男	49.4	1.31					○		
79	男	49.5	1.31	○	○		○			
64	男	49.9	1.35	○			○			
79	男	49.9	1.3	○				○		
66	男	50.0	1.34	○			○			
72	男	50.0	1.32	○			○			
75	男	50.0	1.31	○	○			○		
49	男	50.1	1.41							
68	男	50.1	1.33	○			○			
69	男	50.4	1.32				○			
69	男	50.4	1.32		○		○			
71	男	50.6	1.31	○			○			
62	男	50.7	1.34	○		○				
70	男	50.7	1.31				○			
70	男	50.7	1.31	○						
計				87	重なるの数(人) 割合	51 58.6%	34 39.1%	7 8.0%	40 46.0%	13 14.9%

高血圧+高尿酸の重なり 19名 (21.8%)