

慢性腎臓病CKD 予備群抽出(2006年度)

集計表20 GFR-健診個別異常数値とのクロス集計

条件	総人数	尿酸値 7.0以上		クレアチニン正常(1.1以上)		高血圧 Max>130orMin>80		糖代謝異常 血糖>110orHbA1c>5.5		高脂血 中性脂肪>140orHDL<40		高LDL		BMI >=25								
正常領域	3469	458	34	7.40%	3469	0	0.00%	3469	1298	37.40%	1984	405	20.40%	3469	659	19.00%	3469	856	24.70%			
腎予備力の低下	6992	1514	202	13.30%	6992	0	0.00%	6992	3184	45.50%	4141	804	19.40%	6992	1428	20.40%	6992	1946	27.80%			
腎機能障害期	988	465	127	27.30%	988	218	22.10%	988	609	61.60%	706	205	29.00%	988	448	45.30%	988	224	22.70%	988	396	40.10%
腎機能不全期	27	24	12	50.00%	27	27	100.00%	27	20	74.10%	19	9	47.40%	27	15	55.60%	27	4	14.80%	27	9	33.30%
尿毒期	2	1	1	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	1	50.00%	2	0	0.00%	2	1	50.00%	2	1	50.00%
総数	11859	2595	386	14.90%	11859	250	2.10%	11859	5340	45.00%	7075	1482	20.90%	11859	3989	33.60%	11859	2384	20.10%	11859	3328	28.10%

集計表21 GFR-健診個別異常数値とのクロス集計(血圧:中等高血圧異常、血糖:糖尿病域)

条件	総人数	尿酸値 7.0以上		クレアチニン正常(1.1以上)		中等高血圧 Max>160orMin>100		糖尿病域 血糖>140orHbA1c>7.0		高脂血 中性脂肪>140orHDL<40		高LDL		BMI >=25								
正常領域	3469	458	34	7.40%	3469	0	0.00%	3469	114	3.30%	1984	162	8.20%	3469	659	19.00%	3469	856	24.70%			
腎予備力の低下	6992	1514	202	13.30%	6992	0	0.00%	6992	312	4.50%	4141	240	5.80%	6992	1428	20.40%	6992	1946	27.80%			
腎機能障害期	988	465	127	27.30%	988	218	22.10%	988	82	8.30%	706	52	7.40%	988	448	45.30%	988	224	22.70%	988	396	40.10%
腎機能不全期	27	24	12	50.00%	27	27	100.00%	27	3	11.10%	19	7	36.80%	27	15	55.60%	27	4	14.80%	27	9	33.30%
尿毒期	2	1	1	100.00%	2	2	100.00%	2	0	0.00%	2	1	50.00%	2	0	0.00%	2	1	50.00%	2	1	50.00%
総数	11859	2595	386	14.90%	11859	250	2.10%	11859	546	4.60%	7075	480	6.80%	11859	3989	33.60%	11859	2384	20.10%	11859	3328	28.10%