

中医協 診 - 2 - 3

19 . 11 . 30

中医協 診 - 5 - 3

19 . 11 . 28

リハビリテーションについて


(参考資料)

(図表1) 日常生活機能指標

患者の状況	得点		
	0点	1点	2点
床上安静の指示	なし	あり	
どちらかの手を胸元まで持ち上げられる	できる	できない	
寝返り	できる	何かにつかまればできる	できない
起き上がり	できる	できない	
座位	できる	支えがあればできる	できない
移乗	できる	見守り・一部介助が必要	できない
移乗方法(主要なもの一つ)	自力歩行・つかまり歩き	補助を要する移動(搬送を含む)	移動なし
口腔清潔	できる	できない	
食事摂取	介助なし	一部介助	全介助
衣服の着脱	介助なし	一部介助	全介助
他者への意思の伝達	できる	できる時とできない時がある	できない
診療・療養上の指示が通じる	はい	いいえ	
危険行動への対応	ない	ある	


※得点は0～20点
 ※得点が低いほど、生活自立度が高い

(図表2) 入院時の生活機能
n=189




(図表3) 退院時の生活機能改善

n=189



(図表4) 入院時10点以上の患者の生活機能改善度

n=39



(図表5) 退院後の行き先

n=189

自宅 (or 有料老人ホーム) 復帰率
= 75.1%

