

識別番号 B02-2181	担当医等 02年5月23日	報告企業の意見 「うわ言、幻覚」は本剤投与後に発現しており本剤との時間的関連は考えられるものの、原疾患による影響も考えられる。 担当医のコメント 他の薬剤では今までの様な症状を呈した経験が無い。発熱による影響は否定できない。	意見 「うわ言、幻覚」は本剤投与後に発現しており本剤との時間的関連は考えられるものの、原疾患による影響も考えられる。
処置と今後の対策		参考事項	
「うわ言、幻覚」は本剤の「使用上の注意」に未記載であるが、原疾患による影響も考えられることから現時点では対応は行わない。 尚、今後とも同様症例の情報収集に努め、必要に応じて適切な対応を行なう。		MCN:307255 本症例の担当医による重篤度判定は軽微であったが、厚生省薬務局(当時)の作成した「医薬品等の副作用の重篤度分類基準」(薬安第80号)のグレード2に該当し、弊社判断で軽微ではない症例として30日報告とする。	
使用上の注意の記載状況等 1. 使用上の注意の記載状況 うわ言 本剤(国内)記載なし、(CDS, PDR)記載なし 他剤記載なし 幻覚 本剤(国内)記載なし、(CDS, PDR)記載なし 他剤記載なし		2. 累積報告件数 うわ言：(国内)1件(今回の報告を含む) (国外)報告なし 幻覚：(国内)8件(今回の報告を含む) (国外)報告なし	

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B02-2182	02年5月24日	登録番号	B01-5654	02年2月25日	情報入手日	02年2月15日	同一症例番号	B02-1737	02年5月13日	死・感・重未・先・感・改・OTC
区分	副作用・感染症	15日・(30日)	入院・(外来)	妊娠(無)	有(妊娠週)	不明	医薬品副作用歴(無)	不明	主な既往歴、患者の体質等	無・不明	(厚生労働省処理欄)
患者略名	男	87歳	医療機関所在地：東京都	職業：無職			有()		(有)胃潰瘍、うつ傾向、便秘症		
販売名 (企業名)	一般名		S O	使用 方法		使用理由 原疾患には下線 合併症には()		副作用・ 感染症名	幻覚		
タミフルアゼル (日本ロシユ)	リン酸セタピビル	経路	S	一日量	開始	終了	インフルエンザ、疑い	年月日	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過		
不明	酸化マグネシウム	P0	0	150mg	02. 2. 11	02. 2. 13	便秘	02. 2. 11	身長：■■■cm、体重：■■■kg インフルエンザ発症。インフルエンザ(検査未実施)にて本剤150mg/ 日(分2)経口投与開始。		
ルボックス錠 (ソルベイ)	マレイン酸フルボ キサミン	P0	0	0.9g	99. 6. 2	継続	うつ病	02. 2. 12	PM12時頃、幻覚発現。 本剤投与中止。幻覚回復。		
ガスモチン (大日本)	クエン酸モサプ リド	P0	0	50mg	99. 6. 2	継続	胃もたれ	02. 2. 13			
メバロチン (三共)	プラバスタチンナ トリウム	P0	0	15mg	99. 6. 2	継続	(高脂血症)				
ガスターD錠 (山之内)	ファモチジン	P0	0	10mg	99. 6. 2	継続	胃もたれ				
プロマック顆粒 (ゼリア)	ボラブレジンク	P0	0	40mg	99. 6. 2	継続	胃もたれ				
カロナール (昭和薬化)	アセトアミノフェ ン	P0	0	1g	不明	02. 2. 13	発熱				
その他の治療	有(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他())	不明	再投与	有(再発・再発せず)・不明	転帰	回(02年2月13日)					

識別番号	B02-2182	02年5月24日	<p>担当医等の意見</p> <p>副作用の程度(本剤との因果関係) 幻覚：軽微でも重篤でもない(本剤による) 担当医のコメント</p>	<p>報告企業の意見</p>
処置と今後の対策			参考事項	
<p>使用上の注意の記載状況等</p>			<p>MCN 307836</p> <p>尚、本症例票の「タミフルの1日量」については弊社医薬情報担当者からの情報に基づき作成した。 今回、追加情報を入力したため差し替え報告を行うものである。なお、追加及び変更点については波線を付した。</p>	

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B02-2384	02年5月29日	登録番号	B01-6175	02年3月18日	情報入手日	02年2月20日	同一症例番号	年月日	死・感・重未・先・癌・改・OTC
区分	副作用・感染症	15日・30日	入院・外来・不明	妊娠(無)	有(妊娠週)・不明	02年2月20日	02年2月20日	主な既往歴、患者の体質等	無・不明・	(厚生労働省処理欄)
患者略名	男・女	15歳	医療機関所在地:	職業:	有()	有()	有()	有()	有()	有()
販売名 (企業名)	S・O	一般名	使用量		使用開始		使用理由 原疾患には下線 合併症には()		副作用・ 感染症名	
経路	開始	終了	使用量		使用開始		使用理由 原疾患には下線 合併症には()		年月日	
タミフル (日本ロシュ)	P0	02.2.15	02.2.17	150mg	02.2.15	02.2.17	インフルエンザA	副作用・ 感染症名	年月日	
アストミン錠 (山之内)	P0	02.2.15	02.2.24	60mg	02.2.15	02.2.24	インフルエンザA	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過		
ムコソルバン錠 (蒂人)	P0	02.2.15	02.2.24	45mg	02.2.15	02.2.24	インフルエンザA			
ベネトリン錠 (三共)	P0	02.2.15	02.2.24	6mg	02.2.15	02.2.24	インフルエンザA			
ポララミン錠 (シエリングブ ワ)	P0	02.2.15	02.2.24	6mg	02.2.15	02.2.24	インフルエンザA			
カロナール錠 (昭和薬化)	P0	02.2.15	02.2.17	400mg (屯用)	02.2.15	02.2.17	解熱			
その他の治療	無・有	(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他 ())	不明	再投与	無・有	(再発・再発せず)・不明	転帰	回	(02年3月4日)	

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B02-2384	02年5月29日																												
区分	副作用・感染症	15日・30日																												
患者略名	男	入院・外来																												
NS	女	不明																												
年齢	15歳	職業：学生																												
登録番号	B01-6175	02年3月18日																												
情報入手日	02年2月20日	同一症例番号																												
年	月	日																												
主な既往歴・患者の体質等	無・不明・	有()																												
死・感・重未・先・糖・改・OTC (厚生労働省処理欄)																														
販売名 (企業名)	一般名	使用理由 原疾患には下線 合併症には()																												
タミフル (日本ロシュ)	リン酸オセルタミビル	インフルエンザA																												
アストミン錠 (山之内)	リン酸ジメモルファン	インフルエンザA																												
ムコソルバン錠 (帝人)	塩酸アンブロキシール	インフルエンザA																												
ベネトリン錠 (三共)	硫酸サルブタモール	インフルエンザA																												
ポララミン錠 (シエリングプラウ)	d-マーレイン酸クロールフェニラミン	インフルエンザA																												
カロナール錠 (昭和薬化)	アセトアミノフェン	熱																												
<table border="1"> <tr> <td>経路</td> <td>一日量</td> <td>開始</td> <td>終了</td> </tr> <tr> <td>S P0</td> <td>150mg</td> <td>02.2.15</td> <td>02.2.17</td> </tr> <tr> <td>O P0</td> <td>60mg</td> <td>02.2.15</td> <td>02.2.24</td> </tr> <tr> <td>O P0</td> <td>45mg</td> <td>02.2.15</td> <td>02.2.24</td> </tr> <tr> <td>O P0</td> <td>6mg</td> <td>02.2.15</td> <td>02.2.24</td> </tr> <tr> <td>O P0</td> <td>6mg</td> <td>02.2.15</td> <td>02.2.24</td> </tr> <tr> <td>O P0</td> <td>400mg (屯用)</td> <td>02.2.15</td> <td>02.2.17</td> </tr> </table>			経路	一日量	開始	終了	S P0	150mg	02.2.15	02.2.17	O P0	60mg	02.2.15	02.2.24	O P0	45mg	02.2.15	02.2.24	O P0	6mg	02.2.15	02.2.24	O P0	6mg	02.2.15	02.2.24	O P0	400mg (屯用)	02.2.15	02.2.17
経路	一日量	開始	終了																											
S P0	150mg	02.2.15	02.2.17																											
O P0	60mg	02.2.15	02.2.24																											
O P0	45mg	02.2.15	02.2.24																											
O P0	6mg	02.2.15	02.2.24																											
O P0	6mg	02.2.15	02.2.24																											
O P0	400mg (屯用)	02.2.15	02.2.17																											
(臨床検査値)																														
2002/2/15	2/15夜間	2/16	2/17	2/19																										
最高体温(℃)	38.3	40.0	38.0	36.3																										
				36.0																										
再投与	有(再発・再発せず)	不明	転帰	回 (02年3月4日)																										
その他の治療	有(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他)	不明																												