

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B03-3859	2003年7月2日	登録番号	B02-6825	2003年1月14日	情報入手日	2002年12月27日	同一症例番号	年月日	死・感・重・先・感・改・OTC	主な既往歴・患者の体質等 (甲状腺全摘除、複雑骨折)	有	(厚生労働省処理欄)
区分	副作用	15日	外来	妊娠	無	職業：無職	無	無	年月日	死・感・重・先・感・改・OTC	主な既往歴・患者の体質等 (甲状腺全摘除、複雑骨折)	有	(厚生労働省処理欄)
患者略名 K. T.	女性	66歳	外来	妊娠	無	職業：無職	無	無	年月日	死・感・重・先・感・改・OTC	主な既往歴・患者の体質等 (甲状腺全摘除、複雑骨折)	有	(厚生労働省処理欄)
販売名 (企業名)	タミフルカプセル75 (中外製薬) アーチスト (第一製薬) チラーヂンS散 (帝國臓器) オイグルコン錠 (規格不明) (中外製薬) グルコバイン (バイエル薬品)	リン酸オセルタミビル カルベジロール レボチロキシンナトリウム グリベンクラミド アカルボース	S O O O O O	経路	投与量	開始	終了	用法	使用理由 原疾患には下線 合併症には( )	副作用・ 感染症名	年月日	血圧低下、脳血栓	
					150mg	2002/12/17	2002/12/20	継続	インフルエンザ		1989		
					20mg	1995	2002/12/18	継続	(高血圧NOS)		1995/11		
					10mg	2002/12/23		継続	甲状腺機能低下症		2002/12/17		
					50µg	1995							
					2.5mg	1995		継続	(糖尿病NOS)		2002/12/18		
					200mg	1995		継続	(糖尿病NOS)		2002/12/19		
											2002/12/21		
											2002/12/23		
											2002/12/28		
											2003/1/4		
											2003/1/11		
											2003/1/13		
											2003/1/27		
											2003/2/14		
その他の治療	無								再投与	無	転帰	未回復 (2003年2月14日)	

2017/2/10 現在までの、特許出願の状況について

使用上の注意の記載状況等

使用上の注意の記載状況等

1. 使用上の注意の記載状況

本剤：(国内) 記載なし (CDS) 記載なし (PDR) 記載なし

他剤：記載なし

2. 累積報告件数

脳血栓症：(国内) 1件 (今回の報告を含む)

その他 播種性血管内凝固症候群：1件

(国外) 報告なし



検査項目名	単位	正常域下限	正常域上限	2002/12/14		2002/12/15		2002/12/16		2002/12/17	
				AM9:00	AM5:00	AM12:00	AM:9:00	PM5:00	PM12:00	AM9:00	PM5:00
time											
血圧 (収縮期)	mmHg			135	173	145	141	143	123	140	157
血圧 (拡張期)	mmHg			73	81	71	69	67	63	68	78
脈拍	回/分			60	68	75	61	64	72	78	72
赤血球	$\times 10^4/mm^3$	350	480								
ヘマトクリット	%	38	51								
ヘモグロビン	g/dL	12	15								
白血球	$/mm^3$	4000	9000								
白血球分画 好中球(st)	%	3	6								
白血球分画 好中球(seg)	%	40	60								
白血球分画 好酸球	%	1	5								
白血球分画 好塩基球	%	0	1								
白血球分画 リンパ球	%	25	45								
白血球分画 単球	%	3	8								
血小板	$\times 10^4/mm^3$	12	35								
AST (GOT)	IU	8	38								
ALT (GPT)	IU	4	43								
ALP	IU	110	354								
LDH	IU	121	230								
$\gamma$ -GTP	IU	12	48								
BUN	mg/dL	8.0	22.0								
血清クレアチニン	mg/dL	0.6	0.9								
Na	mEq/L	135	150								
K	mEq/L	3.5	5.3								
Cl	mEq/L	98	110								
CK (CPK)	IU/L	30	172								
CRP	mg/dL										
尿糖			(-)								
尿蛋白			(-)								

尿管白																				

検査項目名	単位	正常域下限	正常域上限	2002/12/20		2002/12/21		2002/12/22		2002/12/22	
				AM9:00	PM5:00	AM9:00	PM5:00	AM9:00	PM5:00	AM9:00	PM5:00
time											
血圧 (収縮期)	mmHg			118	124	136	120	121	116	118	123
血圧 (拡張期)	mmHg			63	69	72	65	62	63	66	63
脈拍	回/分			64	63	66	75	67	80	75	66
赤血球	$\times 10^4 / \text{mm}^3$	350	480								
ヘマトクリット	%	38	51								
ヘモグロビン	g/dL	12	15								
白血球	$/\text{mm}^3$	4000	9000								
白血球分画 好中球 (st)	%	3	6								
白血球分画 好中球 (seg)	%	40	60								
白血球分画 好酸球	%	1	5								
白血球分画 好塩基球	%	0	1								
白血球分画 リンパ球	%	25	45								
白血球分画 単球	%	3	8								
血小板	$\times 10^4 / \text{mm}^3$	12	35								
AST (GOT)	IU	8	38								
ALT (GPT)	IU	4	43								
Al-P	IU	110	354								
LDH	IU	121	230								
$\gamma$ -GTP	IU	12	48								
BUN	mg/dL	8.0	22.0								
血清クレアチニン	mg/dL	0.6	0.9								
Na	mEq/L	135	150								
K	mEq/L	3.5	5.3								
Cl	mEq/L	98	110								
CK (CPK)	IU/L	30	172								
CRP	mg/dL										
尿糖			(-)								
尿蛋白			(-)								