

識別番号・報告回数	B-06026555	第3報	関連報告番号	2007年03月23日	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
最新情報入手日	2007年08月01日	第一報入手日	2007年03月23日	死に至るもの			報告された死因 (死亡の場合)	
副作用	15日	身長 cm	原疾患・合併症・既往歴	生命を脅かすもの				
発現国(情報源)	日本(日本)	体重 Kg	過去の副作用歴	入院又は入院期間の延長が必要なもの				
患者略名	N.S.		インフルエンザ	永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの				
性別	男性			先天異常を来すもの				
年齢	12歳		曝露時の妊娠期間	◎ その他の医学的に重要な状態				新医薬品等の区分 承認2年以内

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間		医薬品使用理由
					投与量/回	回数	開始日	終了日	
リレンザ	ザナミビル水和物	S	吸入	INH	10mg/2回	1日	07/03/17	07/03/20	インフルエンザ
カロナール	アセトアミノフェン	0	経口	FGR	0.5g/回	1日 (2-3回/日(分割投与回数不明))	07/03/17	07/03/19	高熱

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの時間間隔	最終投与からの時間間隔	転帰
重・重	異常行動 (異常行動)	異常行動		07/03/18	07/03/18			回

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

これまで発熱した時に異常行動や異常言動なし。
 2007/03/1710:00 体温:37.4度。
 2007/03/1712:15 インフルエンザウイルス感染症にて来院。インフルエンザB。受診時:37.7度。
 2007/03/1713:30
 リレンザ4ブリスター吸入。パファリン服用。体温:38.8度。
 2007/03/1719:00 体温:37.7度。
 2007/03/1721:00
 リレンザ4ブリスター吸入。吸入時38.8~39.1度の高熱のため、カロナールG (20%) 0.5g併用内服。
 2007/03/186:00
 38.7度の高熱にて、カロナールG (20%) 内服。その時、夢を見ていたようで、飛びおき、かけおき、かけおきのように階段をおり、その時ストープが異常に大きく天井まで大きなものになっていて異常にこわがり、なかなかおちつかなく、それわしていた。
 その間5分程して母親と一緒にリビングに行きストープを見て「あれ?小さくなっている」とようやく落ち着きをとりもどした。その間約5分程であった。その時、38から39度台の高熱。