

(様式第2 (一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-07001162	第2報	関連報告番号	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄	
副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過								
<p>2007/03/0414:30 リレンザ吸入して4時間後、38.8度の発熱時、突然大声で叫び、「頭がぐるぐる廻る」「生きていてもかたがない」といい、気持ち悪いとも がく為、たきかえながら、体全体頭部を冷却シートで冷やしなから、30分間親がおさえつけていたら、普通の状態に戻り入眠。 2007/03/04夜 37.5度に下がり、リレンザ3回目吸入。 2007/03/05朝 37.1度に解熱したが、下がっても丸1日は吸入続ける指示をしていた為、再び吸入するも何の症状も発現せず。昨晚のことは覚えていなかった。 2007/03/05夕方 受診。35.8度。自覚症状すべておちつき、咳がのこることと、もう一回吸入投与し、メイアクト3T、アスタゲーム3T、ダーゼン3T追加。 親のコメント:「私を死なせて」「ぐるぐる廻って気持ち悪い」2階にねているのに「窓からおとして」などと自殺願望の様なことを沢山口走 ったので、びっくりした。起き上がろうとするのに、手足をうごかしただけで、起き上がり切れなかった。まったくテレビと一緒の症状と思っ たとのこと。 <追加情報> 睡眠時驚悸症、睡眠時遊行症などの睡眠障害の既往歴:あり(ねごとを云って起き上がる程度の軽い症状) 睡眠時驚悸症、睡眠時遊行症などの睡眠障害の家族歴:なし 異常行動の既往歴:なし 他剤での異常行動の副作用歴:なし 「激越」発現時の患者さんの状態:睡眠中で覚醒していない状態(睡眠開始から1-2時間後)。大声で叫んだ時は半覚醒状態との母親の印象 。「激越」発現時あるいは発現直前の光に対する反応:なし</p>								
					MedDRA	Version (10.0)		