

(様式第2(一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-07007933	第1報	関連報告番号	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過							
<p>クを投与。</p> <p>21:00 39度まで体温上昇。 2001/03/14</p> <p>8:00 36.8度まで体温下降し、咳は軽減。 2001/03/14 夕方</p> <p>34.8度まで体温下降、悪寒、めまい出現し、持続。 2001/03/15</p> <p>9:30 リレンザ吸入。吸入30分後位から、体温下降する為当該医療機関に連絡があり、リレンザは中止とした。1日中35~35.3度位で、悪寒とめまいが持続。 2001/03/16</p> <p>11:00 再診。リレンザの副作用の可能性ありと判断し、体を温めるように指示する。熱い風呂に入り、電気毛布を使用するも、36.5度まで上昇後、35.4~35.5度に下降。その後も35.3~35.6度で、悪寒とめまいが持続。 2001/03/18</p> <p>8:00 36.3~36.5度に上昇し、悪寒、めまい消失。 患者の平熱は36.5度。 <追加情報> 睡眠時驚愕症、睡眠時遊行症などの睡眠障害の既往歴:無 睡眠時驚愕症、睡眠時遊行症などの睡眠障害の家族歴:不明 異常行動の既往歴:無 他剤での異常行動の副作用歴:無 「めまい」発現時あるいは発現直前の患者さんの光に対する反応の有無(光をまぶしがったり、明るくすると興奮するなど):無 「めまい」発現時あるいは発現直前の患者さんの光に対する反応の有無(光をまぶしがったり、明るくすると興奮するなど):無</p>							
MedDRA				Version (10.0)			