医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	C00-3531	2000年9月4日

区分	副作用	３０日	登録番号	C99-9689	2000年2月25日	情報入手日	2000年2月7日	同一症例番号		年 月 日	死・感・重未・先・癌・改・OTC

患者略名 K.N.	女性	65 歳	入院・外来: 入院	妊娠: 無	医薬品副作用歴: 無	主な既往歴・患者の体質等: 有	(厚生労働省処理欄)
			医療機関所在地：長野県	職業： 無職			

販売名（企業名）	一般名	S・O	使用方法 経路	一日量	開始	終了	使用理由 原疾患には下線 合併症には( )	副作用・感染症名	ジスキネジーＮＥＣ
シンメトレル（日本チバガイギー）	塩酸アマンタジン	S	PO	100mg	2000/1/22	2000/1/25		年 月 日	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過
コメリアン（興和）	塩酸ジラゼプ	O	PO	300mg	不明	不明			透析療法のため入院していた。
ノボリン３０Ｒ！（ノボ）	ヒューマンモノコンポーネントインスリン	O	SC	8U	不明	継続		2000/1/20	咳、発熱あり
								2000/1/21	インフルエンザＡ抗体（＋）
								2000/1/22	本剤処方（50mgＸ2回／日）。
								2000/1/25	体の不随意運動あり。　食事するにも不自由（振戦強く）。シンメトレルは中止とした。
								2000/1/27	症状悪いため、透析。麻痺（－）。排尿も大変でバルン留置した。 その後も体のふるえがあるため、日常生活も不自由、話すのでもふるえる。 血中アマンタジン濃度：透析前1738ng/mL、透析後1001ng/mL
								2000/2/3	透析後に血液浄化（吸着型）を行う。 その後しだいに体のふるえは改善 血中アマンタジン濃度：透析前813.4ng/mL、透析後542ng/mL、吸着後551.5ng/mL.
								2000/2/21	ほぼ振戦は消失した。 その後、リハビリを行う。（歩行訓練）

その他の治療: （その他（透析））	再投与: 無	転帰: 回（2000年2月21日）

（A200001225-008）　安全性情報部 [redacted]　03-3797-8697