

識別番号 C01-3885

2001年9月3日

担当医等の意見

【シンメトレル】

シンメトレルの副作用とも考えられるが、インフルエンザの軽度の脳症や、低い熱で起こるタイプの痙攣や、てんかん発作の初発症状や、嘔吐・下痢症に伴う痙攣発作等も考えられる。  
(痙攣発作、嘔吐、不気嫌；重篤（入院）、関連が疑われる)

[副作用の重篤性/重症度/因果関係]

痙攣発作 (痙攣NOS)：重篤 (入院) // 関連不明 (シンメトレル)

嘔吐 (嘔吐NOS)：重篤 (入院) // 関連不明 (シンメトレル)

不気嫌 (不気嫌)：重篤 (入院) // 関連不明 (シンメトレル)

報告企業の意見

【シンメトレル】

痙攣発作、嘔吐、不気嫌；既知、重篤 (入院)、Suspected  
(担当医の見解に同意し、様々な可能性が考えられるが、本剤関与の可能性を全くは否定できないと考える。)

処置と今後の対策

【シンメトレル】

本報告をもって特別な対応は不要と考えますが、今後とも類似の報告に留意したい。

参考事項

【シンメトレル】

詳細調査を依頼していたが、担当医多忙のため協力を得られなかった。よって弊社医薬情報担当者が、担当医より口頭で得た情報に基づき報告。  
家族歴：不明

使用上の注意の記載状況等

【シンメトレル】

シンメトレル：痙攣、悪心・嘔吐、神経過敏。