

医薬品副作用・感染症症例票

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| 識別番号 C03-1469 | 2003年6月2日 | 登録番号 | 2003年5月23日 | 同一症例番号 | 年月日 | 死・感・重未・先・感・OTC (厚生労働省処理欄) |
| 区分 | 30日 | 情報入手日 | 2003年5月23日 | 同一症例番号 | 年月日 | 死・感・重未・先・感・OTC (厚生労働省処理欄) |
| 患者略名 K.S. | 9 歳 | 入院・外来 不明 | 不明 | 同一症例番号 | 年月日 | 死・感・重未・先・感・OTC (厚生労働省処理欄) |
| 患者性別 | 男性 | 医療機関所在地：大分県 | 職業：不明 | 同一症例番号 | 年月日 | 死・感・重未・先・感・OTC (厚生労働省処理欄) |
| 販売名 (企業名) | シシメトトレル錠 (日本チバガイギー) LLシロップ | 一般名 塩酸アマンタジン | 使用量 100mg | 使用理由 原疾患には下線 合併症には() | 副作用・ 感染症名 | 活動性低下、無力症 |
| ニフラン (三菱ウェルファーマ) | | d l - マレイン酸クロロ フェニラミン | 10mL | 不明 | 2003/2/13 | 副作用・ 感染症の発現状況、症状及び処置等の経過 インフルエンザで来院(代診の先生が診察)。体温38.4℃、シシメ トトレル 100mg/2、LLシロップ 10ml/2、ニフラン 150mg/2を処方 。顔色不良、ぐったりしている。補液(ペンライブ300ml)点滴。AST (GOT) 27、ALT (GPT) 12、CK (CPK) 50、LDH 185、血糖 1 06、白血球4900。 |
| | | プラノプロフェン | 150mg | 不明 | 2003/2/14 | 顔色不良、ぐったりしている。補液(ペンライブ300ml)点滴。AST (GOT) 27、ALT (GPT) 12、CK (CPK) 50、LDH 185、血糖 1 06、白血球4900。 |
| | | | | | 2003/2/15 | 母親が他院(小児科)に独自に連れて行き、シシメトトレルは子供に 使うべきではないといわれる。その後、来院なし(このことは5/22 に知る)。 |
| | | | | | 2003/5/22 | 父親からインフルエンザ後、今でも元気のなさが続いているが、シ シメトトレルのせいではないかといわれる。 |
| 再投与：不明 | | | | 転帰：未(2003年5月22日) | | その他の治療：不明 |