

識別番号・報告回数	B-03010920	第2報	関連報告番号	2004年02月25日	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
最新情報入手日	2004年03月26日	第一報入手日	2004年02月25日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの	報告された死因 (死亡の場合)			新医薬品等の区分 該当なし
副作用	30日	過去の副作用歴	原疾患・合併症・ 既往歴	◎				
発現国 (情報源)	日本 (日本)	曝露時の妊娠期間	インフルエンザ 高血圧 脳出血					
患者略名	H.N.	身長 cm						
性別	男性	体重 Kg						
年齢	63歳							

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間		医薬品使用理由
					投与量/回	回数	開始日	終了日	
シンメトレル	塩酸アママンタジン	S	経口	TAB	50mg/2回	1日	04/02/09	04/02/12	インフルエンザ
レニベース	マレイン酸エナラプリル	0	経口	TAB	5mg/1回	1日			高血圧
アダラートCR	ニフェジピン	0	経口	TAB	40mg/1回	1日			高血圧
セレナール	オキサゾラム	0	経口	TAB	10mg/3回	1日			
ユベラニコチネート	ニコチン酸トコフェロール	0	経口	TAB	100mg/3回	1日			

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
重・重	振戦	振戦		04/02/12	04/02/19			回
重・重	振戦	手の振戦		04/02/12	04/02/19			回

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

2004/02/09
インフルエンザA型と診断。シンメトレル (50mg) 2Tを投与 (4日間)。
2004/02/12
顔面、上肢の振戦が出現。
・顔面全体がびくびくする動き、及び両上肢がびくびくと動く。足の振戦はなかった。
・その他の症状 (頭痛、意識障害など) はなかった。
・来院時にはすでに体温は平常であった。
・腎障害、脱水症状はなし。(尿量が少なく、クレアチニンが高めであることに対する回答)
2004/02/15
次第に振戦が強くなり、15日ごろ最大となる。
2004/02/18
【血中アママンタジン濃度】 50ng/mL
2004/02/19