

(様式第2 (一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-04026544	第2報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
最新情報入手日	2005年04月06日	第一報入手日	2005年03月14日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの 永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの ◎ その他の医学的に重要な状態	報告された死因 (死亡の場合)			新医薬品等の区分 該当なし
副作用	30日	過去の副作用歴	原疾患・合併症・ 既往歴					
発現国(情報源)	日本(日本)	身長 cm	インフルエンザ					
患者略名	X.X.	体重 Kg						
性別	男性							
年齢	4歳	曝露時の妊娠期間						

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間	医薬品使用理由
					投与量/回	回数		
シンメトレル	塩酸アママンタジン	S	経口	FGR	70mg/回	05/03/13		インフルエンザ
アスベリン	ヒベンズ酸チペピジン	0	不明	XXX	24mg/回	05/03/13		
ムコサール	塩酸アンブロキソール	0	不明	XXX	13.5mg/回	05/03/13		
ペリアクチン	塩酸シプロヘプロブタジン	0	不明	XXX	4mg/回	05/03/13		

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LL1)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
	幻覚 錯乱状態	幻覚 錯乱		05/03/14 05/03/14				不 不

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

薬剤師からの情報。

2005/03/13

インフルエンザにて本剤70mg投与開始。

2005/03/14

母親から薬局に連絡あり。幻覚、錯乱の症状があらわれたとのこと。勝手に処方中止できないので、処方医へ連絡し、指示を仰ぐよう指導した。インフルエンザの症状としては、約40℃の発熱があり、解熱剤の処方がなく、熱による消耗は激しかったと思われる。

Version (10.1)

MedDRA