除外
（報告者の[redacted]に照会したところ、タミフルを使用しない場合でも異常行動がおこることがあるとの情報提供等 との事）

医薬食品局安全対策課
平成
19. 4. 6
厚生労働省
第i07100179号

No.10の症例

中外製薬より書類届いたのでFaxします。

当院ではシーズン初めにタミフル注意が出た為 全身状態の良好な小学校高学年～高校生に対しては タミフルは出さず、症状の悪い人にのみリレンザを処方していました。

アセトアミノフェンのみ処方した子供でも ベッドの上でとびはね大声を出したり うろうろしたり ボーとしている などの異常行動は、高熱を伴なうインフルエンザの子供には数人みとから 保護者から聞きました。

又、リレンザ処方した11才女児は（グラクソに報告すみの症例）激越症状とグラクソが分類する症状で（抑えつけないとあばれる）、大声を出し（てり）ばかりか "死にたい" "窓からおとして" などと口走ったり 2階の窓から身をのり出そうとするので 必死で抑えこんだという症例がありましたが、その後解熱し 48時間後には37.5°でリレンザ終了し、翌朝36台でリレンザ終了しても症状の発現はなかった為 リレンザのせいとは考えにくい "自殺企図類似例"もありました

テレビとかで大々的にNegativeキャンペーンを行う前に、処方されたタミフルをのまずに近くの都市の子供がインフルエンザ脳症で死んだというのも聞きました。

うちは内科で地方都市でもあり 周囲に小児科もあるので 子供がそんなにこないのですが、タミフルのまない症例で 自殺企図を含めて5人 異常行動の報告を保護者から聞いています。

タミフルのまなくて死ぬ症例もあり、タミフルのまなくても自殺するかもしれない人もいるのに、しかも専門家は"サイトカインストーム"と説明していると聞き、専門外の私にとっても インターフェロン注射の大人でうつ、自殺企図があるのは周知のことだ。タミフルが本体の症状ではなく、サイトカインストームというものが小児の脳に影響しているというのは想像に難くなく、政治的なにおいのするNegativeキャンペーンは一体誰が、何の為に、何の得するために行っているのかと うらをかんぐる次第です。

[redacted]

[redacted]