

異常な行動

識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	タミフル 服用時刻	異常な行動発現時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就寝 中じゃない:×)	覚醒直 後に発現	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	回復までの 時間	一眠りして 完全回復	体温	患者の記憶	睡眠覚醒症 等の既往	睡眠覚醒症 等の家族歴	光に対する 反応	他剤による 「異常な行 動」の副作 用歴	異常な行動に 関する既往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見ていたよと云っているのか?)	旧資料No
152	B07011932	12	年	男性	異常行動	2007/3/5 2007/3/5 2007/3/6 2007/3/6	午前 午後 午前 午後	2007/3/6	1:00~2:00	○	Yes	—	—	Yes	発熱持続	No	—	—	2007/3/4 (夜)発熱にて救急受診。インフルエンザ確定診断にて陰性で、抗生剤バナン200mg/日と下熱頓服を処方。 2007/3/5 (AM9~10時頃)当院受診。受診時38.3℃で救急にて処方されていた薬は終了。インフルエンザ確定診断実施したところ、FluB診断。タミフル75mg×2回/日(5日分)、カロナール200mg(2回分)を処方。 2007/3/6 (AM1~2時頃)寝ていたが突然起きて寝室から飛び出し、廊下を走った。裸足で飛びように走った。予め今までの副作用の事例を話し一緒に夜間は過ごし、目を離さないように母親に指示していたため、大事には至らなかった。マンションの8階で玄関の外に出なくて幸いであった。 2007/03/07 (朝)本人は自分の行動を全く憶えていなかった。インフルエンザ軽快。本剤の内服中止。	
153	B07013228	12	年	男性	異常行動	2006/2/17 2006/2/18	—	2006/2/17	—	×	Yes	—	—	—	—	—	No	—	2006/2/17 (夕)前日よりの発熱(39.1℃)でインフルエンザA+との診断受け、本剤(75)2c/×5日分、麻黄湯7.5g×3日分の処方される。帰宅後、本剤を服用し、就寝。(22:30)気持ちが悪いとトイレへ行った。トイレから出てきてうわ言で「屋上が、屋上が。」と言って玄関から出ようとしていたので両親2人がかりでおさえつけた。 2006/02/18 (8:50)患者家族より処方医に連絡。上記の件を伝え、本剤中止との指示が出た。体温は37.2℃。(9:00)患者家族より薬局にもtelあり。経過の情報を受けた。念のため、本日は患者を見守るよう指導。	
154	B07013229	12	年	男性	異常行動	2007/2/1 2007/2/1	10:00 20:45	2007/2/2 2007/2/2	2:30 5:00	○	—	—	40分	Yes	—	No	No	No	2007/2/1 インフルエンザB型発症。(10:00)本剤75mg内服。(20:45)本剤75mg内服。鼻症状軽減のため、タビジュール1mg×2回/日投与開始(~2/4)。 2007/2/2 (2:30)異常行動発現(非重篤)。急に起き上がりて服を脱ぎ、部屋の中を歩き、お茶を飲んだ。母と会話したが、母のことを認識してない様子だが、祖母とは会話できた。ベランダに出て乗り越えようとしたのを母と祖母で止めて室内へ連れ戻した。体温:37.9℃。(3:10)40分くらいで再び眠りについた。(5:00)異常行動発現(非重篤)。寝ている状態でベッドでバタバタして話をしていた。目はグルグル回って変だった。40分くらい続いた。(5:40)40分くらい続いて症状回復。	
155	B07013305	12	年	男性	異常行動	2007/3/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2007/3/16 インフルエンザに対して、本剤の投与を開始。異常行動(走り回る、顔つきがおかしいetc)が発現。 不明 異常行動は回復。		
156	B07013374	12	年	女性	異常行動	2007/2/17	夕方	2007/2/17	—	○	—	—	—	Yes	—	No	—	—	2007/2/17 (夕方)B型インフルエンザ治療の為、本剤75mg×1/日の投与開始。幻覚、幻聴が出現(重篤度不明)、異常行動(非重篤)発現。何も持っていないのに1つ持っていると言う。外に出ようとする、一晩中、父親が側について、外に出ようとするのを制止していた。 2007/2/18 (4:00)落ちつく。	
157	B07013380	12	年	男性	異常行動	2007/2/27 2007/2/27	10:00 19:00	2007/2/27	—	×	—	—	—	—	—	—	No	—	2007/2/27 (5:00)体温:39.2℃。(10:00)インフルエンザA型治療の為、本剤75mg×1/回内服。内服後、不穏行動発現(非重篤)。突然2F階段をはしりおりる。(19:00)(夕)本剤75mg×1/回内服。内服後、やはり不穏状態となり、Familyが押さえつけてFollowする。 朝本剤服用して寝かせるが、3時間半後に起きてきて、親に怒られているという幻覚のため「ごめんなさい」と何度も繰り返した。夕方にも本剤服用するが、1時間半後に起きてきて、部屋の中をぐるぐる歩き回ったり、うなったりという異常行動を起こした。時間は特定できないが、ドライバーを持って家を飛び出そうとしたところを家族がとめている。	
158	B07013382	12	年	男性	異常行動	2007/3/18 2007/3/18	13:00 19:00	2007/3/18	23:50	×	Yes	50分	—	Yes	—	No	—	No	2007/3/17 39℃の発熱あり。 2007/3/18 (13:00)本剤75mg内服。(19:00)本剤75mg内服。(23:00)40.2℃の発熱、脱水に対して、カロナール2錠内服。ポタコールR 500ml点滴静注開始。その後睡眠。(23:50)点滴終了し、抜針した所、走り出した(非重篤)。 2007/3/19 異常行動は回復。	
159	B07013388	12	年	男性	異常行動	2007/2/24	夕	2007/2/25	未明	—	—	—	—	—	—	—	—	2007/2/23 (夜)38℃ 2007/2/24 (朝)39℃の発熱。(来院時)39.4℃、鼻汁あり。インフルエンザBの判定のもと、夕方本剤75mg内服。 2007/2/25 (未明)もうろう状態発現(非重篤)。急に起きて、ベッドの上で飛びはねて2階から下に階段を駆け降りて、下で尿、便を失禁した。 不明 症状回復。		
160	B0300982	13	年	男性	①異常行動 ②幻視 ③幻覚	2003/1/21~ 1/22	朝・夕	2003/1/22 2003/1/22	16:00 20:00~21:00	—	—	—	Yes	Yes	発熱持続	No	No	No	2003/1/20 夜、体温37.4℃、関節痛、頭痛、咽頭痛、咳あり。 2003/1/21 朝、前日の症状が悪化。当院受診。インフルエンザB型の診断。同日朝タミフル服薬。 2003/1/22 朝、38.8℃。本剤服薬。二次感染による咳(+++)・痰のためクラリス、メジコン、ムコダイン、リン酸コデイン、酸化マグネシウム処方、昼、服薬し休んだ。(16:00)突然バタバタと2階から降りてきて、持っていた洋服を「これおかしいよ」と言い、自分の太腿をたたき、ウサギ跳びをした。家族がなだめ再び就寝。(20:00~21:00)ベッド内で「死んじゃうよー」と泣いたり、ベッドから飛び降り、「逆立ちしようやる」とか「高校受験はこうする」等の言動あり(受験生ではない)。 2003/1/23 朝、すべての薬剤を中止。体温37.8~38.1℃ 2003/1/24 体温36.6~37.3℃。市販の咳止めトローチ使用。 2003/1/27 母親が来院。咳(+)あり、クラリスのみ継続するよう指示。	異-1-12