

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1. 年齢別

年齢別①

	症例数	(%)
10歳未満	94	34
10代	144	52
20代	8	3
30代	5	2
40代	5	2
50代	7	3
60代	2	1
70代	6	2
80代	4	1
90代	4	1
小計	279	100
不明	3	
総計	282	

年齢別②

	症例数	(%)
6歳以下	36	13
7歳から9歳	58	21
10歳から12歳	65	23
13歳から15歳	60	22
16歳から18歳	16	6
19歳以上	44	16
小計	279	100
不明	3	
総計	282	

2. 性別

	症例数	(%)
女性	75	27
男性	204	73
小計	279	100
不明	3	
総計	282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

3. インフルエンザウイルス型別

	症例数	(%)
A型インフルエンザ	150	53
A&B型インフルエンザ	3	1
B型インフルエンザ	74	26
型不明	45	16
不明	7	2
予防*	3	1
総計	282	100

* 予防症例3例の内訳

- 1) 38℃台の発熱、咽頭炎の記載あり
- 2) インフルエンザ疑いの記載あり
- 3) 鎮咳剤・抗生剤等併用の記載あり

4. 異常な行動の発現時期別

①年別

	症例数	(%)
2001	1	0
2002	4	1
2003	12	4
2004	10	4
2005	25	9
2006	67	24
2007	160	57
小計	279	100
不明	3	
総計	282	

②シーズン別

	症例数	(%)
2000-2001シーズン	1	0
2001-2002シーズン	4	1
2002-2003シーズン	11	4
2003-2004シーズン	11	4
2004-2005シーズン	15	5
2005-2006シーズン	76	27
2006-2007シーズン	161	58
小計	279	100
不明	3	
総計	282	

リン酸オセルタミビル

シーズン; 8月から7月

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

5.インフルエンザ発症から異常な行動発現までの病日

患者年齢別①

病日	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1	31	42	40	34	10	27			81	36
2	27	37	46	40	5	14			78	35
3	10	14	19	16	8	22			37	16
4	2	3	3	3	7	19			12	5
5	2	3	4	3	4	11			10	4
6以上	1	1	4	3	3	8			8	4
小計	73	100	116	100	37	100	0		226	100
不明	21		28		4		3		56	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

病日	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1	14	50	17	38	17	35	18	35	5	38	10	25			81	36
2	5	18	22	49	21	44	20	38	4	31	6	15			78	35
3	7	25	3	7	6	13	10	19	2	15	9	23			37	16
4	1	4	1	2	2	4	1	2			7	18			12	5
5	1	4	1	2	1	2	1	2	1	8	5	13			10	4
6以上			1	2	1	2	2	4	1	8	3	8			8	4
小計	28	100	45	100	48	100	52	100	13	100	40	100	0		226	100
不明	8		13		17		8		3		4		3		56	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

6. 最初の投与から異常な行動の発現までの時間
患者年齢別①

異常な行動発現までの時間	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	4	10	3	5	1	9			8	7
1時間以上2時間未満	4	10	5	9	1	9			10	9
2時間以上3時間未満	6	15	10	17	2	18			18	17
3時間以上4時間未満	3	8	10	17					13	12
4時間以上5時間未満	4	10	3	5	1	9			8	7
5時間以上6時間未満	5	13	2	3					7	6
6時間以上12時間未満	9	23	14	24	1	9			24	22
12時間以上24時間未満	4	10	10	17	2	18			16	15
24時間以上48時間未満			1	2					1	1
48時間以上					3	27			3	3
小計	39	100	58	100	11	100	0		108	100
不明	55		86		30		3		174	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

異常な行動発現までの時間	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	2	20	2	7	3	13					1	8			8	7
1時間以上2時間未満			4	14	3	13	1	4			2	15			10	9
2時間以上3時間未満			6	21	2	8	6	21	2	50	2	15			18	17
3時間以上4時間未満	1	10	2	7	5	21	4	14			1	8			13	12
4時間以上5時間未満	3	30	1	3	1	4	2	7			1	8			8	7
5時間以上6時間未満	1	10	4	14	1	4	1	4							7	6
6時間以上12時間未満	3	30	6	21	6	25	7	25	1	25	1	8			24	22
12時間以上24時間未満			4	14	2	8	7	25	1	25	2	15			16	15
24時間以上48時間未満					1	4									1	1
48時間以上											3	23			3	3
小計	10	100	29	100	24	100	28	100	4	100	13	100	0		108	100
不明	26		29		41		32		12		31		3		174	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

7. 直前の投与から異常な行動の発現までの時間
患者年齢別①

異常な行動発現までの時間	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	7	15	5	7	1	10			13	10
1時間以上2時間未満	9	19	8	12	1	10			18	14
2時間以上3時間未満	9	19	18	26	1	10			28	22
3時間以上4時間未満	5	10	14	20	2	20			21	17
4時間以上5時間未満	4	8	5	7	1	10			10	8
5時間以上6時間未満	6	13	2	3					8	6
6時間以上12時間未満	7	15	15	22	2	20			24	19
12時間以上	1	2	2	3	2	20			5	4
小計	48	100	69	100	10	100	0		127	100
不明	46		75		31		3		155	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

異常な行動発現までの時間	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	2	15	5	14	5	17					1	8			13	10
1時間以上2時間未満	3	23	6	17	6	20	1	3			2	17			18	14
2時間以上3時間未満			9	26	4	13	10	30	4	100	1	8			28	22
3時間以上4時間未満	1	8	4	11	5	17	8	24			3	25			21	17
4時間以上5時間未満	3	23	1	3	2	7	3	9			1	8			10	8
5時間以上6時間未満	2	15	4	11	1	3	1	3							8	6
6時間以上12時間未満	2	15	5	14	7	23	8	24			2	17			24	19
12時間以上			1	3			2	6			2	17			5	4
小計	13	100	35	100	30	100	33	100	4	100	12	100	0		127	100
不明	23		23		35		27		12		32		3		155	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

8. 異常な行動の発現時の体温

①異常な行動の直前の体温(発現前6時間以内)

患者年齢別①

異常な行動の発現時の体温	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
34度台			1	3					1	1
35度台	1	3	1	3					2	3
36度台	1	3							1	1
37度台	1	3	3	9	2	40			6	9
38度台	12	41	15	43	1	20			28	41
39度台	10	34	13	37	1	20			24	35
40度台	3	10	2	6	1	20			6	9
41度以上	1	3							1	1
小計	29	100	35	100	5	100	0		69	100
不明	65		109		36		3		213	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

異常な行動の発現時の体温	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
34度台					1	6									1	1
35度台	1	7					1	8							2	3
36度台			1	7											1	1
37度台			1	7	1	6			1	33	3	43			6	9
38度台	6	43	6	40	7	41	5	38	2	67	2	29			28	41
39度台	6	43	4	27	6	35	7	54			1	14			24	35
40度台			3	20	2	12					1	14			6	9
41度以上	1	7													1	1
小計	14	100	15	100	17	100	13	100	3	100	7	100	0		69	100
不明	22		43		48		47		13		37		3		213	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

②異常な行動の発現時の体温の経過

患者年齢別①

体温	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
発熱持続	37	66	68	72	5	23			110	64
解熱過程	19	34	24	26	14	64			57	33
解熱後			2	2	3	14			5	3
小計	56	100	94	100	22	100	0		172	100
不明	38		50		19		3		110	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

体温	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
発熱持続	17	71	20	63	32	74	31	74	4	50	6	26			110	64
解熱過程	7	29	12	38	10	23	10	24	4	50	14	61			57	33
解熱後					1	2	1	2			3	13			5	3
小計	24	100	32	100	43	100	42	100	8	100	23	100	0		172	100
不明	12		26		22		18		8		21		3		110	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

9.異常な行動の発現時刻別

患者年齢別①

発現時刻	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
0-6時まで	6	10	29	29	6	29			41	23
6-12時まで	4	7	9	9	4	19			17	9
12-18時まで	21	35	26	26	3	14			50	28
18-24時まで	29	48	35	35	8	38			72	40
小計	60	100	99	100	21	100	0		180	100
不明	34		45		20		3		102	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

発現時刻	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
0-6時まで	0	0	6	15	11	26	16	36	1	11	7	29			41	23
6-12時まで	1	5	3	8	3	7	5	11	1	11	4	17			17	9
12-18時まで	8	40	13	33	13	31	9	20	3	33	4	17			50	28
18-24時まで	11	55	18	45	15	36	15	33	4	44	9	38			72	40
小計	20	100	40	100	42	100	45	100	9	100	24	100	0		180	100
不明	16		18		23		15		7		20		3		102	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

10. 就寝から異常な行動の発現までの時間

患者年齢別①

就寝から発現までの時間	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	6	40	7	28	1	25			14	32
1時間以上2時間未満	2	13	4	16					6	14
2時間以上3時間未満	3	20	4	16	2	50			9	20
3時間以上4時間未満	1	7	2	8	1	25			4	9
4時間以上5時間未満	2	13	1	4					3	7
5時間以上	1	7	7	28					8	18
小計	15	100	25	100	4	100	0		44	100
不明/就寝中でない	79		119		37		3		238	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

就寝から発現までの時間	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	1	20	5	50	6	46	1	9			1	25			14	32
1時間以上2時間未満	2	40			2	15	1	9	1	100					6	14
2時間以上3時間未満			3	30			4	36			2	50			9	20
3時間以上4時間未満	1	20			1	8	1	9			1	25			4	9
4時間以上5時間未満	1	20	1	10			1	9							3	7
5時間以上			1	10	4	31	3	27							8	18
小計	5	100	10	100	13	100	11	100	1	100	4	100	0		44	100
不明/就寝中でない	31		48		52		49		15		40		3		238	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

11.異常な行動の発現が就寝中か否か

患者年齢別①

就寝中	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
Yes	34	61	56	68	6	30		0	96	60
No	22	39	26	32	14	70	1	100	63	40
小計	56	100	82	100	20	100	1	100	159	100
不明	38		62		21		2		123	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

就寝中	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
Yes	12	50	22	69	25	66	23	72	7	70	7	32		0	96	60
No	12	50	10	31	13	34	9	28	3	30	15	68	1	100	63	40
小計	24	100	32	100	38	100	32	100	10	100	22	100	1	100	159	100
不明	12		26		27		28		6		22		2		123	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

12.異常な行動の発現が覚醒直後か否か

患者年齢別①

覚醒直後に発現	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
Yes	25	57	46	58	6	32			77	54
No	19	43	34	43	13	68			66	46
小計	44	100	80	100	19	100	0		143	100
不明	50		64		22		3		139	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

覚醒直後に発現	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
Yes	11	52	14	61	21	60	16	48	7	78	8	36			77	54
No	10	48	9	39	14	40	17	52	2	22	14	64			66	46
小計	21	100	23	100	35	100	33	100	9	100	22	100	0		143	100
不明	15		35		30		27		7		22		3		139	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

<参考>11番と12番のクロス集計

		覚醒直後の発現			
		Yes	No	小計(%)	
就寝中	Yes	64	6	70	64
	No	6	34	40	36
	小計(%)	70	40	110	
		64	36		

13.異常な行動が一眠りして回復したか否か
患者年齢別①

一眠り後回復	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
Yes	41	76	85	84	11	46			137	77
No	13	24	16	16	13	54			42	23
小計	54	100	101	100	24	100	0		179	100
不明	40		43		17		3		103	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

一眠り後回復	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
Yes	16	73	25	78	36	82	37	84	10	100	13	48			137	77
No	6	27	7	22	8	18	7	16		0	14	52			42	23
小計	22	100	32	100	44	100	44	100	10	100	27	100	0		179	100
不明	14		26		21		16		6		17		3		103	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

14.異常な行動に関する患者の記憶の有無

患者年齢別①

患者の記憶	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
有	2	5	26	27	13	43			41	25
無	35	95	71	73	17	57			123	75
小計	37	100	97	100	30	100	0		164	100
不明	57		47		11		3		118	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
有	1	7	1	5	11	26	13	32	2	18	13	39			41	25
無	14	93	21	95	31	74	28	68	9	82	20	61			123	75
小計	15	100	22	100	42	100	41	100	11	100	33	100	0		164	100
不明	21		36		23		19		5		11		3		118	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

15.光に対する反応の有無

患者年齢別①

	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
有	1	3	1	2	0				2	2
無	33	97	55	98	14	100			102	98
小計	34	100	56	100	14	100	0		104	100
不明	60		88		27		3		178	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
有	1	6	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0			2	2
無	15	94	18	100	26	100	22	96	5	100	16	100			102	98
小計	16	100	18	100	26	100	23	100	5	100	16	100	0		104	100
不明	20		40		39		37		11		28		3		178	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

16. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の既往歴の有無

睡眠驚愕症等の既往	症例数	(%)
有	13	8
無	144	92
小計	157	100
不明	125	
総計	282	

17. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の家族歴の有無

睡眠驚愕症等の家族歴	症例数	(%)
有	2	2
無	123	98
小計	125	100
不明	157	
総計	282	

18. 異常な行動の回復までの時間

患者年齢別①

回復までの時間	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
30分未満	26	39	53	50	5	17	1	100	85	42
30分以上60分未満	6	9	14	13	3	10			23	11
1時間以上6時間未満	15	23	24	23	4	14			43	21
6時間以上24時間未満	13	20	6	6	4	14			23	11
24時間以上	2	3	1	1	6	21			9	4
未回復	4	6	8	8	7	24			19	9
小計	66	100	106	100	29	100	1	100	202	100
不明	28		38		12		2		80	
総計	94		144		41		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

患者年齢別②

回復までの時間	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
30分未満	10	37	16	41	23	50	23	48	6	67	6	19	1	100	85	42
30分以上60分未満	3	11	3	8	9	20	5	10			3	9			23	11
1時間以上6時間未満	5	19	10	26	9	20	10	21	3	33	6	19			43	21
6時間以上24時間未満	6	22	7	18	3	7	3	6			4	13			23	11
24時間以上	2	7			1	2					6	19			9	4
未回復	1	4	3	8	1	2	7	15			7	22			19	9
小計	27	100	39	100	46	100	48	100	9	100	32	100	1	100	202	100
不明	9		19		19		12		7		12		2		80	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

19. 異常な行動が発現した後に投与を継続した症例の状況

患者年齢別①

再投与再発の有無	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
再発あり(注)	16	41	12	29	3	30			31	34
再発なし	23	59	29	71	7	70			59	66
小計	39	100	41	100	10	100			90	100
その他/不明	55		103		31		3		192	
総計	94		144		41		3		282	

患者年齢別②

再投与再発の有無	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
再現性あり(注)	9	60	7	29	8	38	3	23	1	17	3	27			31	34
再現性なし	6	40	17	71	13	62	10	77	5	83	8	73			59	66
小計	15	100	24	100	21	100	13	100	6	100	11	100			90	100
その他/不明	21		34		44		47		10		33		3		192	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

(注) 異常な行動を含む精神神経症状の発現が見られたもの

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

20. 他剤による同様な副作用歴の有無

他剤による既往	症例数	(%)
有	8	4
無	176	96
小計	184	100
不明	98	
総計	282	

21. 熱性痙攣の既往歴の有無

熱性痙攣の既往	症例数	(%)
有	9	-
不明	273	

熱性痙攣のアンケートに関しては282例に関してアンケートに盛り込まれておらず経過欄から抜き出した。

22. 熱性痙攣の家族歴の有無

熱性痙攣に関するアンケートは282例に関してアンケートに盛り込まれていなかったために不明。

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

参考1. 主な併用薬の内訳

薬効細分類2		集計
解熱鎮痛消炎剤	アニリン系製剤	96
	サリチル酸系製剤	2
	その他の解熱鎮痛消炎剤	17
	フェニル酢酸系製剤	5
	塩基性消炎鎮痛剤	4
計		124
去たん剤	システイン系製剤	62
	その他の去たん剤	27
	プロムヘキシシン製剤	6
	植物性製剤	2
計		97
鎮咳去たん剤	その他の鎮咳去たん剤	54
	植物性製剤	7
計		61
抗ヒスタミン剤	その他の抗ヒスタミン剤	46
	トリペレナミン系製剤	1
	フェノチアジン系製剤	12
計		59
鎮咳剤	エフェドリン及びマオウ製剤	2
	その他の鎮咳剤	36
	デキストロメトルファン製剤	19
計		57
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オキサセフェム系抗生物質製剤	1
	セフェム系抗生物質製剤	22
	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に	1
	ペニシリン系抗生物質製剤	5
計		29
気管支拡張剤	イソプレナリン系製剤	1
	キサントシン系製剤	5
	その他の気管支拡張剤	21
計		27
消化性潰瘍用剤	H2遮断剤	1
	その他の消化性潰瘍用剤	25
計		26

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

参考2. 既往症・合併症

医師記載疾患名	既往症	合併症	計
アトピー性皮膚炎	3	1	4
アレルギー性結膜炎	1	1	2
アレルギー性鼻炎		1	1
ウイルス性下痢症	1		1
ウイルス性筋炎		1	1
ウイルス性発疹症疑い		1	1
うつ状態		1	1
うつ病		2	2
スギ花粉症		1	1
ぜんそく		1	1
てんかん		2	2
異常興奮	1		1
胃潰瘍	1		1
胃癌術後		1	1
一過性心房細動		1	1
咽頭炎		1	1
右単径ヘルニア	1		1
花粉症	1	1	2
過呼吸	1		1
感冒	1		1
感冒性消化不良症		1	1
肝障害		1	1
顔面外傷		1	1
川崎病	1		1
期外収縮		1	1
気管支喘息	3	8	11
急性気管支炎		2	2
急性中耳炎		1	1
強迫性障害		1	1
頸動脈血栓症	1		1
原因不明成長障害		1	1
甲状腺腫大		1	1
高CK血症		1	1
高血圧		3	3
腰部脊椎管狭窄症(術後)	1		1
骨粗鬆症		1	1
左単径ヘルニア	1		1
細菌感染症(かぜ)		1	1
失明		1	1
上気道炎	1	1	2
腎不全		1	1
睡眠時驚愕症	1		1
睡眠時遊行症	1		1
髄膜炎	1		1
精神遅滞		1	1
川崎病後冠動脈瘤		1	1
脱水症		1	1
知的障害		1	1

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

医師記載疾患名	既往症	合併症	計
虫垂炎	1		1
陳旧性肺結核	1		1
鉄欠乏性貧血		1	1
糖尿病		2	2
糖尿病性右足壊疽		1	1
統合失調症疑い		1	1
洞不全症候群(ペースメーカー留置)		1	1
特発性血小板減少性紫斑病		1	1
突発性心房細動		1	1
認知症		1	1
熱射病	1		1
熱性けいれん	11	1	12
脳炎		1	1
脳梗塞		3	3
肺炎		2	2
肺結核後遺症		1	1
肺結核後遺症に伴う慢性呼吸不全		1	1
不眠症		2	2
不明熱		1	1
副鼻腔炎		2	2
腹痛		1	1
片頭痛(疑)	1		1
便秘	1	1	2
慢性心不全		1	1
慢性腎不全		2	2
慢性中耳炎		1	1
夢中遊行	1		1
夢遊症	1		1
夜驚症	1		1
溶連菌感染		1	1
抑うつ神経症	1		1
喘息	3	1	4
喘息様気管支炎	1	2	3

参考3. 症例票から抜き出した既往に関して

タミフルを以前に服用があると報告があったもの 11例
 精神神経症状を発現した 6例
 発現せず 4例
 (その他:兄がタミフル使用時に異常な既往歴あり 1例 (11例には含まれていない))

熱時に譫妄・異常行動の既往あり 9例
 他剤による副作用既往歴あり 3例
 ウイルス性脳炎の既往歴あり 1例

睡眠時驚愕症の既往あり 8例

リン酸オセルタミビル