

患者家族用

記入例：経過観察調査票

服薬（内服あるいは座薬など）を時間軸の左側に、体温および症状を右側にご記入ください。
長く続いた症状については、続いた時間（ ——— ）がわかるように記入してください。

◇ 薬の使用
（内服あるいは座薬など）
□ 薬の使用なし

◇ 体温
（測ったもののすべて）
□ 体温の測定なし

◇ 症状
（けいれん、意識障害、異常言動・異常行動、激しく嘔吐する等、などの重い症状がみられた場合に、ご記入ください。また、異常言動あるいは異常行動の内容を、別紙の「異常行動・異常言動調査票」に記入してください。
多少の咳、鼻水、頭痛、喉の痛みなどの普通に見られる症状については、記入いただかなくて結構です。）
□ 重い症状なし

（時）

38.5℃ (1:45)
激しい咳 (2:00)
40.2℃ (3:30)
○○病院受診 (9:15)
座薬のために泣かずにけいれんが6分間おさまる (9:56)
アセトアミノフェンの座薬 (9:20)
41.0℃ (10:55)
タミフル服用 (11:00)
泣くに泣けないのに座薬の処方をもんだり、母親の顔が分からない様子だった (12:00 - 13:05)
40.5℃ (12:30)
お気づきの点がありましたら、思いついた順番にご記入ください。
アセトアミノフェンの座薬を使用したが、すぐには解熱せず、けいれんが起きた
など
38.8℃ (17:00)
タミフル服用 (20:00)
38.2℃ (20:45)
少しずつ元気が戻ってきた



Q2 異常行動や異常言動につきまして、具体的に詳しくお書きください。前ページの様々な例に当てはまらない異常行動・異常言動が見られました場合にも、具体的に記入してください。

発現日時　月　日　□午前 □午後　時頃 ～　日　□午前 □午後　時頃

<異常行動・異常言動について、状況、継続時間などがわかるように、できるだけ詳しくご記入下さい>

Q3 異常行動や異常言動は、発熱した時にこれまでにもありましたか ？

□無　□有 → いつごろ、どのようなものでしたか、下に具体的にご記入ください。

Q2 異常行動や異常言動につきまして、具体的に詳しくお書きください。前ページの様々な例に当てはまらない異常行動・異常言動が見られました場合にも、具体的に記入してください。

発現日時　2月 3日 □午前 ☑午後 7時頃 ～ 4日 ☑午前 □午後 7時頃

<異常行動・異常言動について、状況、継続時間などがわかるように、できるだけ詳しくご記入下さい>

2月3日19時すぎに38.7℃の発熱に気づき坐薬挿入の解熱薬の坐薬を入れた。その直後から月齢にすっとしがみついて離れなくなった。解熱薬を入れたのに体温は下がらずに40.3℃になった。20時ころ「ママがいる？」と聞くと目の前にいるのに泣く在ぼすような目で、しばらくしてから「ママ」と言うようになった。目の焦点が合わず、泣くて伝えるように、あるいは何かを探すように繰り返していた。このような様子は普段にはまるにぎったり開いたりする動作に変わった。深夜は「レッた（祖父のこと）、パーシー（トーマスのキャラクター）」など知っている言葉を次々繰り返していた。このような様子は翌朝にはなくなった。

Q3 異常行動や異常言動は、発熱した時にこれまでにもありましたか ？

□無　☑有 → いつごろ、どのようなものでしたか、下に具体的にご記入ください。

4歳の秋、夜中に40℃の熱が出た際に、うなされるように奇声をあげたことがある。