

## 現在まで得られた結果と考察 (1)

### 主要な集計結果

- 医師用・患者用調査票が一致 9,358 症例、医師用調査票のみ 876 症例、患者家族用調査票のみ 674 症例について、データベースの構築を行った。
- 医師を対象に、未記入項目等について 5,313 症例の追加調査を行い、4,774 症例について返答を得た。
- 現時点で、医師用調査票に基づき、10,316 症例のデータを整理した。
- タミフル使用率は、79.3% (78.5-80.1) (7870/9929)であった。
- 異常行動を、14.7% (14.0-15.4) (1478/10038)に認めた。  
そのうち、重度の異常行動 (A群)「事故につながったり、他人に危害を与えたりする可能性がある異常な行動」は、3.2% (2.3-4.1) (47/1459)であった。

### 時間性と実データ

	異常行動あり		異常行動なし				
	Tm	To	Tm	To			
タミフル 投薬あり	(a)	+	→	+	(f)	+	-
	(b)	+	←	+		(g)	-
	(c)	+	-	(h)	-		+
	(d)	-	+		(i)		-
	(e)	-	-			(j)	-
(h)	-	+	(j)		-		-
タミフル 投薬なし	(i)	-	-				

Tm: time of medication

To : time of onset

## タミフルのリスクを最大見積もりする場合

	異常行動あり		異常行動なし					
	Tm	To	Tm	To				
タミフル 投薬あり	(a)	+	→	+	(f)	+	-	
	(b)	+	←	+		(g)	-	-
	(c)	+	-	-				
タミフル 投薬なし	(d)	-	-	+	(h)		-	+
	(e)	-	-	-		(i)	-	-
	(j)	-	-	-				

Tm: time of medication

To: time of onset

## 全症例 [タミフル×異常行動]: 実データ

	異常行動あり		異常行動なし							
	Tm	To	Tm	To						
タミフル 投薬あり	(a)	+	→	+	( 700 )	(f)	+	-	( 5953 )	
	(b)	+	←	+	( 285 )		(g)	-	-	( 528 )
	(c)	+	-	-	( 171 )			(h)	-	+
タミフル 投薬なし	(d)	-	-	+	( 32 )	(i)			-	-
	(e)	-	-	-	( 8 )		(j)		-	-
	(j)	-	-	-	( 1931 )					

Tm: time of medication

To: time of onset

		異常行動・異常言動		
		(+)	(-)	計
タミフル	(+)	700	6481	7181
	(-)	546	1931	2477
	計	1246	8412	9658
オッズ比, 95%信頼区間		0.382	0.338 ~ 0.432	
$\chi^2$ 検定, P値		247.758	<.0001	