

表2 予防接種後健康状況調査-麻疹、風疹、MR (製造所別)

		対象者	発熱率									
			発熱計	37.5°C以上 38.5°C未満	38.5°C以上	6日まで			7-13日			
						小計	37.5°C以上 38.5°C未満	38.5°C以上	小計	37.5°C以上 38.5°C未満	38.5°C以上	
武田薬品	麻疹	2005年度	1,838	23.2%	8.6%	14.6%	8.2%	3.2%	5.0%	10.4%	4.0%	6.4%
	風疹	2005年度	1,607	11.9%	4.7%	7.2%	4.9%	2.1%	2.9%	3.0%	1.5%	1.5%
	I期MR	2006年度	1,851	20.4%	7.7%	12.7%	8.0%	2.9%	5.1%	8.0%	3.0%	5.0%
	II期MR	2006年度	1,119	8.1%	3.1%	5.0%	2.8%	0.9%	1.9%	2.7%	1.0%	1.7%
阪大微研	麻疹	2005年度	659	21.7%	8.3%	13.4%	6.7%	3.3%	3.3%	8.5%	3.3%	5.2%
	風疹	2005年度	1,357	11.3%	3.8%	7.6%	4.0%	1.5%	2.4%	3.4%	1.0%	2.4%
	I期MR	2006年度	3,167	22.9%	9.2%	13.7%	8.1%	3.3%	4.7%	9.6%	3.9%	5.7%
	II期MR	2006年度	2,219	7.9%	3.6%	4.3%	3.2%	1.4%	1.8%	1.9%	1.0%	0.9%

表2 予防接種後健康状況調査-麻疹、風疹、MR（製造所別）

	局所反応			けいれん			蕁麻疹			発疹			その他			
	局所反 応計	3日以 内	6日以 内	けいれ ん計	37.5℃ 未満	37.5℃ 以上	蕁麻疹 計	13日以 内	1日以 内	発疹計	6日以 内	7-13 日	リンパ 節腫脹	関節痛		
武田薬品	麻疹	2005年度	2.5%	1.1%	1.4%	0.5%	0.0%	0.5%	2.8%	2.4%	0.2%	8.3%	2.4%	4.6%		
	風疹	2005年度	1.2%	0.9%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.7%	0.2%	2.6%	1.1%	0.7%	0.6%	0.4%
	I期MR	2006年度	1.7%	0.6%	1.0%	0.3%	0.0%	0.3%	3.0%	2.5%	0.4%	6.9%	2.3%	2.8%	0.7%	0.1%
	II期MR	2006年度	2.1%	1.7%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.8%	0.1%	2.2%	1.1%	0.5%	0.4%	1.7%
阪大微研	麻疹	2005年度	2.6%	1.7%	1.8%	0.2%	0.0%	0.2%	3.5%	2.6%	0.3%	6.2%	2.0%	2.6%		
	風疹	2005年度	1.3%	1.0%	1.0%	0.2%	0.1%	0.1%	1.0%	0.8%	0.4%	2.1%	0.9%	0.4%	0.1%	0.1%
	I期MR	2006年度	1.8%	0.9%	1.1%	0.1%	0.0%	0.1%	3.0%	2.2%	0.3%	6.5%	2.2%	2.8%	0.6%	0.1%
	II期MR	2006年度	2.8%	2.7%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.4%	0.1%	1.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.9%