

麻疹・風疹(MR)混合ワクチン 接種後健康状況 1118名調査

接種後健康調査 2006年6月2日～2007年12月31日

施設	A	B	C	D	E	F	合計
対象者	69名	444名	336名	112名	102名	55名	1118名
発赤	4 (5.8%)	26 (5.9%)	62 (18.5%)	10 (8.9%)	3 (2.9%)	8 (14.5%)	113 (10.1%)
腫脹	3 (4.3%)	12 (2.7%)	49 (14.6%)	8 (7.1%)	4 (3.9%)	4 (7.3%)	80 (7.2%)
発疹	1 (1.4%)	3 (0.7%)	15 (4.5%)	10 (8.9%)	3 (2.9%)	5 (9.1%)	37 (3.3%)
リンパ節 腫脹	3 (4.3%)	4 (0.9%)	8 (2.4%)	0	1 (1.0%)	2 (3.6%)	18 (1.6%)
関節痛	0	1 (0.2%)	13 (3.9%)	2 (1.8%)	3 (2.9%)	1 (1.8%)	20 (1.8%)
発熱	1 (1.4%)	48 (10.8%)	68 (20.2%)	28 (25%)	15 (14.7%)	18 (32.7%)	178 (15.9%)

上段:報告数
下段:発現率

麻疹・風疹(MR)混合ワクチン 接種健康状況 1118名調査

接種後健康調査 2006年6月2日～2007年12月31日

