

③ アモトサレン(商品名:インターセプト)

パラメータ	正常血漿 凝固因子 活性参考値	アモトサレン未処 理血漿	アモトサレン処理 血漿	アモトサレン処理 前後の活性比較
PT(n=14)	11.1-13.5 秒	11.2±0.3 秒	11.6±0.3 秒	1.0±0.1 秒
APTT(n=14)	23.0-35.0 秒	26.8±1.4 秒	29.1±1.7 秒	4.3±1.8 秒
Fibrinogen (n=91)	167-379mg/dL	290±40 mg/dL	209±36 mg/dL	72±5%
F II (n=59)	71-127U/ dL	96±11IU/ dL	85±11IU/ dL	88±4%
FV (n=91)	77-153U/ dL	130±23IU/ dL	119±19IU/ dL	92±7%
FVII (n=91)	58-166U/ dL	123±32IU/ dL	95±20IU/ dL	78±6%
FVIII (n=91)	67-235U/ dL	157±35IU/ dL	115±28IU/ dL	73±7%
FIX (n=91)	63-143U/ dL	108±21IU/ dL	88±16IU/ dL	82±4%
FX (n=59)	66-134U/ dL	100±13IU/ dL	86±11IU/ dL	86±3%
FX I (n=91)	62-142U/ dL	130±22IU/ dL	87±18IU/ dL	86±5%
FX III (n=26)	—	110±11IU/ dL	102±10IU/ dL	93±3%
vWF(n=12)	—	114±44IU/ dL	111±41IU/ dL	97±8%

Y.Singh, et al ; Transfusion 46;1168:2006