

中医協 検-1-8
20.7.9

診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成 19 年度調査）

ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における
禁煙成功率の実態調査
報告書

◆◆目 次◆◆

1. 目的	1
2. 調査対象	1
3. 調査方法	1
(1) 患者追跡調査	1
(2) 呼気一酸化炭素濃度検査	1
4. 調査項目	1
5. 結果	3
(1) 回収の状況	3
(2) 施設の状況（平成 18 年 11 月）	4
1) 施設区分	4
2) 1 日平均外来患者数（平成 18 年 11 月）	5
3) 開設主体	6
4) 標榜診療科	7
5) ニコチン依存症管理料の施設基準の届出時期	8
6) 禁煙治療の体制	9
7) 禁煙治療に携わる職員数	10
8) 患者に対する 1 回あたりの平均指導時間	12
9) 1 か月間のニコチン依存症管理料算定患者数（平成 18 年 11 月）	14
(3) 患者の状況	16
1) 患者属性（性別および年齢）	16
2) 喫煙年数	17
3) 禁煙指導開始時における 1 日あたりの喫煙本数	17
4) 禁煙指導開始時におけるブリンクマン指数	18
5) 禁煙指導開始時における TDS 点数	18
6) ニコチン依存症管理料算定回数 of 状況	19
7) 5 回の指導を全て終了した患者の指導終了時の状況	20
8) 5 回の指導を途中で中止した患者の中止時の状況	23
9) 5 回の指導を全て終了した患者の指導終了時から 9 か月後までの状況	24
10) 算定回数別の指導終了 3 か月後および 9 か月後の状況	28
(4) 客観的指標における継続禁煙率	30
(5) 禁煙成功率に関する国際比較	32
6. まとめ	33
参考資料	

1. 目的

平成 18 年 4 月の診療報酬改定で「ニコチン依存症管理料」が新設され、ニコチン依存症と診断された患者のうち禁煙の希望がある者に対する一定期間の禁煙指導について診療報酬上の評価が行われることとなった。

この「ニコチン依存症管理料」新設についてその結果を検証するために、平成 18 年度調査では、ニコチン依存症管理料算定医療機関の実態及びニコチン依存症管理料を算定した患者に対する禁煙治療の実施状況、当該患者の指導終了後 3 か月後と 6 か月後の禁煙成功率を把握するための調査を行った。

本調査は、平成 18 年度調査の対象患者について追跡調査を行い、指導終了後 9 か月後（指導開始から 1 年後）の禁煙成功率を把握することを目的とした。

2. 調査対象

本調査では、ニコチン依存症管理料の届出を行っている医療機関のうち、平成 18 年度に実施した「一次調査」で有効回答を得られた 456 施設において、平成 18 年 6 月および 7 月の 2 か月間に、ニコチン依存症管理料の算定を開始した患者全員を対象とした。

3. 調査方法

（1）患者追跡調査

一次調査対象患者の指導終了から 10～11 か月目となる平成 19 年 7 月に、当該患者のその時点での禁煙／喫煙状況について調査を実施した。

調査方法は、患者の禁煙／喫煙状況を記載する調査票を、対象医療機関に郵送配布した。医療機関の担当者が、調査時点の禁煙／喫煙状況について、対象患者に電話調査を実施し、患者の同意を得てその結果を調査票に記入し、本調査事務局に返送いただく形式とした。調査実施期間（調査票の発送から回収までの期間）は平成 19 年 7 月～8 月とした。

（2）呼気一酸化炭素濃度検査

本調査対象患者の禁煙／喫煙状況を客観的に確認して禁煙継続率を算出することを目的に、呼気一酸化炭素濃度検査に協力が可能な施設を募り、調査対象患者のうち「禁煙継続」とされた患者の呼気一酸化炭素濃度検査を実施した。

4. 調査項目

ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導終了 9 か月後の禁煙／喫煙の状況。

調査の全体像

<一次調査> 調査時期：平成 18 年 12 月～平成 19 年 1 月

施設調査	【調査対象】 <ul style="list-style-type: none">・全国の保険医療機関の中で、平成 18 年 7 月 1 日現在にニコチン依存症管理料の届出があった施設から無作為抽出した 1,000 施設 【調査項目】 <ul style="list-style-type: none">・施設区分、所在地、1 日平均外来患者数、開設主体、標榜診療科・ニコチン依存症管理料の施設基準の届出時期、禁煙治療の体制、禁煙治療に携わる職員数、患者に対する 1 回あたりの平均指導時間、ニコチン依存症管理料算定患者数
患者調査	【調査対象】 <ul style="list-style-type: none">・施設調査の対象施設において、平成 18 年 6 月および 7 月の 2 か月間に、ニコチン依存症管理料の算定を開始した患者全員 【調査項目】 <ul style="list-style-type: none">・性別、年齢、喫煙年数、1 日あたりの喫煙本数、TDS 点数、ニコチン依存症管理料の算定状況、指導終了時の禁煙／喫煙の状況、指導終了 3 か月後の禁煙／喫煙の状況 等

<二次調査> 調査時期：平成 19 年 3 月

患者調査	【調査対象】 <ul style="list-style-type: none">・一次調査に回答した施設 456 施設における、一次調査対象患者全員 【調査項目】 <ul style="list-style-type: none">・指導終了 6 か月後の禁煙／喫煙の状況
-------------	---

<三次調査> 調査時期：平成 19 年 7 月～8 月

患者調査	【調査対象】 <ul style="list-style-type: none">・一次調査に回答した施設 456 施設における、一次調査対象患者全員 【調査項目】 <ul style="list-style-type: none">・指導終了 9 か月後の禁煙／喫煙の状況・調査担当者
-------------	--

5. 結果

(1) 回収の状況

平成 18 年度に実施した一次調査で有効回答を得られた 456 施設に対し、同じ調査対象患者のニコチン依存症指導終了後 9 か月後¹の状況を調査するため、三次調査票を発送した結果、279 施設から回収することができた²。調査票に記載された有効患者数は 2,546 人であった。

図表 1 回収の状況

	有効回収数	有効回収率
回答施設数	279	61.2%
調査票に記載された患者数	2,546	—

* 一次調査の患者調査でニコチン依存症管理料算定要件外であるデータ、ブリンクマン指数が 200 未満もしくは TDS 点数が 5 点未満のデータ、および算定開始日が平成 18 年 6 月・7 月以外のデータ、本調査（三次調査）の調査日が平成 19 年 6 月以前のデータを無効票として除き、有効回収数とした。

¹ 実際には、指導終了から 10～11 か月目の状況について調査を実施した。

² 患者の記載があった調査票は 290 施設あった。このうち、有効回答が得られたのが 279 施設であった。


(2) 施設の状況（平成 18 年 11 月）

ここでは、平成 19 年 7 月～8 月に実施した「三次調査」で有効回答が得られた 279 施設について、「一次調査」における当該施設の回答内容を集計し、平成 18 年 11 月における施設の状況としてまとめた。

1) 施設区分


施設区分についてみると、「無床診療所」(69.5%) が最も多く、次いで「病院」(18.3%)、「有床診療所」(10.8%) であった。

図表 2 施設区分



病院における許可病床数についてみると、「100～200 床未満」(29.4%) が最も多く、次いで「50～100 床未満」(25.5%)、「200～500 床未満」(21.6%) であった。平均は 213.48 床（標準偏差 166.41、中央値 178.50）であった。

図表 3 許可病床数（病院）




2) 1日平均外来患者数（平成18年11月）

1日平均外来患者数（平成18年11月）についてみると、医療機関全体では、「50～100人未満」（40.9%）が最も多く、次いで、「100～200人未満」（20.4%）、「20～50人未満」（16.1%）であった。

医療機関別にみると、病院においては、「500人以上」（31.4%）が最も多く、次いで「100～200人未満」（27.5%）、「200～500人未満」（23.5%）となった。平均は409.00人（標準偏差359.32、中央値251.00）であった。

また、診療所においては、「50～100人未満」（47.8%）が最も多く、次いで「20～50人未満」（20.1%）、「100～200人未満」（19.2%）であった。平均は82.98人（標準偏差73.47、中央値69.00）であった。

図表4 1日平均外来患者数（平成18年11月）




（注）全体（n=279）には、施設区分不明（n=4）を含む。

3) 開設主体

開設主体についてみると、全体では「法人」(55.6%)が最も多く、次いで「個人」(35.1%)、「公的医療機関」(6.5%)であった。

医療機関別にみると、病院においては、「法人」(70.6%)が最も多く、次いで「公的医療機関」(23.5%)であった。また、診療所においては、「法人」(53.1%)が最も多く、次いで「個人」(43.3%)であった。

図表 5 開設主体



(注) 全体 (n=279) には、施設区分不明 (n=4) を含む。


※参考：開設主体の内訳

国等	厚生労働省、国立病院機構、国立大学法人、労働者健康福祉機構等
公的医療機関	都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会等
社会保険関係団体	全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合およびその連合会、共済組合およびその連合会、国民健康保険組合等
法人	公益法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人等


4) 標榜診療科

標榜診療科についてみると、病院、診療所ともに、「内科」が最も多かった（それぞれ100.0%、90.6%）。病院では、次いで「外科」（84.3%）、「循環器科」（74.5%）、診療所においては、次いで「消化器科」（39.3%）、「循環器科」（37.9%）となった。

図表 6 標榜診療科（病院）：複数回答



図表 7 標榜診療科（診療所）：複数回答



5) ニコチン依存症管理料の施設基準の届出時期

ニコチン依存症管理料の施設基準の届出時期についてみると、全体では「平成 18 年 4 月」(40.1%) が最も多く、次いで、「平成 18 年 6 月」(21.5%) であった。

医療機関別にみると、病院、診療所ともに「平成 18 年 4 月」の診療報酬改定直後から届け出た施設が多く、それぞれ 58.8%、36.2%となった。

また、「平成 18 年 5 月」の届出は減少しているものの、ニコチンパッチ等が保険適用となった「平成 18 年 6 月」には再び届出が増加しており、病院、診療所では、それぞれ 15.7%、23.2%となった。

図表 8 ニコチン依存症管理料の施設基準の届出時期


	総 数	平成 18 年 4 月	平成 18 年 5 月	平成 18 年 6 月	平成 18 年 7 月	それ以外	無回答
全体	279 100.0%	112 40.1%	32 11.5%	60 21.5%	56 20.1%	10 3.6%	9 3.2%
病院	51 100.0%	30 58.8%	3 5.9%	8 15.7%	9 17.6%	1 2.0%	0 0.0%
診療所	224 100.0%	81 36.2%	29 12.9%	52 23.2%	47 21.0%	9 4.0%	6 2.7%
無回答	4 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	3 -

6) 禁煙治療の体制

医療機関全体では、「通常の診療体制の中で禁煙治療を実施している」(78.5%)が最も多く、次いで「専門外来を設置するなど、特別の体制で禁煙治療を実施している」(12.2%)であった。

医療機関別にみると、病院においては、「専門外来を設置するなど、特別の体制で禁煙治療を実施している」(52.9%)が最も多く、次いで「通常の診療体制の中で禁煙治療を実施している」(41.2%)であった。診療所においては、「通常の診療体制の中で禁煙治療を実施している」(88.4%)が最も多く、次いで「特別な体制・通常の体制の両方」(7.1%)であった。

図表 9 禁煙治療の体制




(注) 全体 (n=279) には、施設区分不明 (n=4) を含む。

7) 禁煙治療に携わる職員数

禁煙治療に携わる職員数(医師数)についてみると、医療機関全体では「1人」が77.4%で最も多く、「2人」が15.4%、「3人以上」が6.1%であった。

医療機関別にみると、病院においては、「1人」が54.9%で最も多いが、「2人」が29.4%、「3人以上」が15.7%となっており、複数の医師が診療に携わっている場合も多かった。1施設あたりの医師数の平均は2.02人(標準偏差1.98、中央値1.00)であった。また、診療所においては、医師が「1人」(83.5%)という施設が最も多かった。平均は1.25人(標準偏差0.83、中央値1.00)であった。

図表 10 禁煙治療に携わる職員数(医師数)




(注) 全体 (n=279) には、施設区分不明 (n=4) を含む。

看護師数についてみると、医療機関全体では、「0~1人」(43.0%)が最も多く、次いで、「2人」(25.8%)、「4人以上」(15.1%)、「3人」(14.7%)となった。

医療機関別にみると、病院では、「0~1人」(52.9%)が最も多く、次いで「2人」(25.5%)となった。1施設あたりの看護師数の平均は2.18人(標準偏差3.02、中央値1.00)であった。診療所でも同様に、「0~1人」(41.5%)が最も多く、次いで「2人」(25.9%)となった。平均は2.43人(標準偏差2.24、中央値2.00)であった。

図表 11 禁煙治療に携わる職員数（看護師数）




(注) 全体 (n=279) には、施設区分不明 (n=4) を含む。

禁煙治療に携わる職員数（その他の職員数）についてみると、医療機関全体では「0~1人」（42.3%）が最も多く、次いで「4人以上」（12.2%）となった。

この傾向は医療機関別でも同様であった。病院においては、「0~1人」（47.1%）が最も多く、次いで「4人以上」（7.8%）となっており、平均は4.44人（標準偏差16.21、中央値0.00）であった。診療所においては、「0~1人」（41.5%）が最も多く、次いで「2人」および「4人以上」が同じ13.4%であった。平均は2.41人（標準偏差4.97、中央値1.00）であった。

本項目については無回答が多かったが、これは「0」人の場合に「0」と記載がなかったためと推察される。

図表 12 禁煙治療に携わる職員数（その他の職員数）




(注) 全体 (n=279) には、施設区分不明 (n=4) を含む。

8) 患者に対する1回あたりの平均指導時間

患者に対する1回あたりの平均指導時間についてみると、初回の指導では、「15～30分未満」(41.6%) および「30～45分未満」(39.1%) の施設が多かった。

医療機関別にみると、病院の方が初回の指導に時間をかけている傾向がみられた。病院においては「30～45分未満」(58.8%) が最も多く、次いで「15～30分未満」(25.5%)、「45分以上」(11.8%) となり、平均は31.04分(標準偏差11.60、中央値30.00)であった。一方、診療所においては「15～30分未満」(46.0%) が最も多く、次いで「30～45分未満」(34.8%)、「15分未満」(13.4%) となり、平均は24.04分(標準偏差12.17、中央値20.00)であった。

図表 13 患者に対する1回あたりの平均指導時間(初回の指導)




(注) 全体 (n=279) には、施設区分不明 (n=4) を含む。

2回目以降の平均指導時間についてみると、全体では「10～20分未満」(67.0%)が最も多く、次いで「10分未満」(15.8%)、「20～30分未満」(10.4%)となった。

医療機関別にみると、病院においては「10～20分未満」が68.6%と最も多く、次いで「20～30分未満」(11.8%)、「30分以上」(11.8%)、「10分未満」(7.8%)となり、平均は15.31分(標準偏差6.97、中央値15.00)であった。診療所においては、病院と同様に「10～20分未満」(67.9%)が最も多かった。次いで「10分未満」(17.9%)、「20～30分未満」(10.3%)となり、平均は11.90分(標準偏差5.62、中央値10.00)であった。

図表 14 患者に対する1回あたりの平均指導時間(2回目以降の指導)




(注) 全体 (n=279) には、施設区分不明 (n=4) を含む。

9) 1 か月間のニコチン依存症管理料算定患者数（平成 18 年 11 月）

平成 18 年 11 月 1 か月間におけるニコチン依存症管理料算定患者数（初回の算定患者数）についてみると、全体では「1～4 人」（59.1%）が最も多く、次いで「0 人」（16.8%）、「5～9 人」（14.3%）であった。

医療機関別にみると、病院と診療所では大きな差はみられなかった。病院においては、「1～4 人」（62.7%）が最も多く、次いで「5～9 人」（17.6%）、「0 人」（15.7%）となり、平均は 3.08 人（標準偏差 2.76、中央値 3.00）であった。診療所においては、「1～4 人」（59.4%）が最も多く、次いで「0 人」（17.0%）、「5～9 人」（13.8%）となり、平均は 2.94 人（標準偏差 3.25、中央値 2.00）であった。

図表 15 平成 18 年 11 月 1 か月間における、ニコチン依存症管理料算定患者数（初回の算定患者数）




（注）全体（n=279）には、施設区分不明（n=4）を含む。

一方、2回目以降のニコチン依存症管理料を算定した患者数についてみると、全体では「1～4人」(40.9%)が最も多く、次いで「5～9人」(22.9%)、「15人以上」(10.4%)、「0人」(10.0%)、「10～14人」(9.7%)と続いた。

医療機関別にみると、病院においては、「5～9人」(33.3%)が最も多く、次いで「1～4人」(31.4%)、「10～14人」(19.6%)と続き、平均は7.94人(標準偏差7.25、中央値6.50)となった。診療所においては、「1～4人」(43.8%)が最も多く、次いで「5～9人」(21.0%)、「0人」(11.6%)、「15人以上」(10.3%)、「10～14人」(7.6%)となり、平均は6.07人(標準偏差7.97、中央値4.00)であった。

図表 16 平成 18 年 11 月 1 か月間における、ニコチン依存症管理料算定患者数
(2回目以降の算定患者数)



(注) 全体 (n=279) には、施設区分不明 (n=4) を含む。

(3) 患者の状況

本調査では、平成 18 年度に実施した「一次調査」の対象となった患者について、指導終了 9 か月後（指導開始から 1 年後）の状況を調査した。分析対象患者は、「三次調査」の調査票を回収できた施設における、一次調査の患者票に記載された患者全数とした。


1) 患者属性（性別および年齢）

本調査において、指導終了 9 か月後の禁煙／喫煙状況の分析対象とした患者は、男性 1,884 人、女性 662 人、合計 2,546 人であった。

禁煙指導開始時の年齢についてみると、男性では「60 歳以上」（657 人）が最も多く、次いで「50～59 歳」（454 人）となっており、年齢の高い層が多かった。一方、女性においては、「30～39 歳」（183 人）が最も多いが、各年齢層に広く分散していた。

男性の平均年齢は 53.00 歳（標準偏差 13.75、中央値 54.00）であり、女性の平均年齢は 47.01 歳（標準偏差 13.54、中央値 45.00）であった。

図表 17 性別および年齢




(注) 年齢は禁煙指導開始時の年齢。

2) 喫煙年数

禁煙指導開始時における喫煙年数についてみると、「40年以上」(29.3%)が最も多く、次いで「20～30年未満」(26.2%)となった。喫煙年数の平均は30.08年(標準偏差12.94、中央値30.00)であった。


図表 18 禁煙指導開始時における喫煙年数



3) 禁煙指導開始時における1日あたりの喫煙本数

禁煙指導開始時における1日あたりの喫煙本数についてみると、「20～40本未満」(64.6%)が最も多く、次いで「40本以上」(22.9%)となった。1日あたりの喫煙本数の平均は、27.70本(標準偏差12.31、中央値25.00)であった。


図表 19 禁煙指導開始時における1日あたりの喫煙本数



4) 禁煙指導開始時におけるブリンクマン指数

禁煙指導開始時におけるブリンクマン指数（喫煙年数×1日あたり喫煙本数）についてみると、「500～1000未満」（37.7%）が最も多く、次いで「200～500未満」（30.5%）、「1000～1500未満」（21.0%）となった。ブリンクマン指数の平均は、826.20（標準偏差 524.30、中央値 720.00）であった。


図表 20 禁煙指導開始時におけるブリンクマン指数



5) 禁煙指導開始時における TDS 点数

禁煙指導開始時の TDS 点数³についてみると、「8点」（22.7%）が最も多く、次いで「9点」（21.8%）、「7点」（19.0%）、「10点」（14.0%）、「6点」（12.0%）、「5点」（8.0%）と続いた。TDS 点数の平均は、7.83点（標準偏差 1.48、中央値 8.00）であった。

図表 21 禁煙指導開始時における TDS 点数




³ TDS (Tobacco Dependence Screener) は、保険適用の対象患者を抽出するために実施するニコチン依存症のスクリーニングテストである。10項目の質問で構成され、「はい」を1点、「いいえ」を0点として合計得点を計算する。点数が高いほどニコチン依存度が高いと判断され、5点以上がニコチン依存症と診断される。

6) ニコチン依存症管理料算定回数の状況

ニコチン依存症管理料算定回数の状況についてみると、全体では「5回目終了」(30.0%)が最も多く、次いで「3回目で中止」(18.9%)、「1回目で中止」(18.0%)、「4回目で中止」(16.7%)、「2回目で中止」(16.4%)となった。算定回数の平均は、3.24回(標準偏差 1.48、中央値 3.00)であった。


図表 22 ニコチン依存症管理料算定回数の状況 (n=2,546)



7) 5回の指導を全て終了した患者の指導終了時の状況

ニコチン依存症の禁煙指導を5回全て終了した764人において、5回目指導終了時の状況についてみると、「4週間禁煙」が72.3%、「1週間禁煙」が8.2%、「失敗」が16.2%であった。

図表 23 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況



※禁煙の定義【指導終了時】

4週間禁煙	<ul style="list-style-type: none"> 5回終了時点で禁煙しており、5回終了時からさかのぼって少なくとも4週間、1本も吸わずに禁煙を継続している人 かつ、4回目と5回目の指導時の呼気一酸化炭素濃度の値が非喫煙者レベル（8ppm未満）であった人
1週間禁煙	<ul style="list-style-type: none"> 5回の治療が終了している時点で禁煙しており、5回終了時点からさかのぼって少なくとも1週間、1本も吸わずに禁煙を継続している人 かつ、5回目指導時の呼気一酸化炭素濃度の値が非喫煙者レベル（8ppm未満）であった人

以下、患者属性別にみた。まず、男女別についてみると、5回目指導終了時の「4週間禁煙」は、男性で73.2%、女性で69.1%であった。

図表 24 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況（男女別）

	合計	4週間禁煙	1週間禁煙	失敗	無回答
全体	764 100.0%	552 72.3%	63 8.2%	124 16.2%	25 3.3%
男性	583 100.0%	427 73.2%	46 7.9%	88 15.1%	22 3.8%
女性	181 100.0%	125 69.1%	17 9.4%	36 19.9%	3 1.7%

年齢別にみると、5回目指導終了時の「4週間禁煙」の割合は、「40～49歳」（76.5%）で最も高く、次いで「50～59歳」（73.5%）、「30歳未満」（73.3%）、「60歳以上」（72.0%）、「30～39歳」（64.0%）となった。

図表 25 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況（年齢別）

	合計	4週間 禁煙	1週間 禁煙	失敗	無回答
全体	764 100.0%	552 72.3%	63 8.2%	124 16.2%	25 3.3%
30歳未満	15 100.0%	11 73.3%	2 13.3%	1 6.7%	1 6.7%
30～39歳	89 100.0%	57 64.0%	8 9.0%	20 22.5%	4 4.5%
40～49歳	132 100.0%	101 76.5%	11 8.3%	18 13.6%	2 1.5%
50～59歳	189 100.0%	139 73.5%	13 6.9%	30 15.9%	7 3.7%
60歳以上	339 100.0%	244 72.0%	29 8.6%	55 16.2%	11 3.2%

ブリンクマン指数別にみると、ブリンクマン指数が低いほど「4週間禁煙」の割合が高く、「失敗」の割合が低くなる傾向が若干みられた。

図表 26 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況（ブリンクマン指数別）

	合計	4週間 禁煙	1週間 禁煙	失敗	無回答
全体	764 100.0%	552 72.3%	63 8.2%	124 16.2%	25 3.3%
200～500未満	177 100.0%	131 74.0%	13 7.3%	25 14.1%	8 4.5%
500～1000未満	296 100.0%	216 73.0%	24 8.1%	47 15.9%	9 3.0%
1000～1500未満	195 100.0%	140 71.8%	17 8.7%	33 16.9%	5 2.6%
1500以上	96 100.0%	65 67.7%	9 9.4%	19 19.8%	3 3.1%

TDS 点数別にみると、指導開始時の TDS 点数が低いほうが「4 週間禁煙」の割合が高く、禁煙に成功している傾向がみられた。

図表 27 5 回の指導を終了した患者の指導終了時の状況 (TDS 点数別)


	合計	4 週間 禁煙	1 週間 禁煙	失敗	無回答
全体	764 100.0%	552 72.3%	63 8.2%	124 16.2%	25 3.3%
5 点	62 100.0%	49 79.0%	4 6.5%	6 9.7%	3 4.8%
6 点	87 100.0%	68 78.2%	3 3.4%	14 16.1%	2 2.3%
7 点	141 100.0%	103 73.0%	13 9.2%	18 12.8%	7 5.0%
8 点	175 100.0%	135 77.1%	11 6.3%	26 14.9%	3 1.7%
9 点	183 100.0%	125 68.3%	20 10.9%	30 16.4%	8 4.4%
10 点	100 100.0%	60 60.0%	12 12.0%	27 27.0%	1 1.0%

8) 5回の指導を途中で中止した患者の中止時の状況

ニコチン依存症管理料の算定を5回目より前に中止した患者（n=1,782）では、中止時に46.3%が禁煙していた。

ニコチン依存症指導を実施した回数が多いほど、中止時に禁煙していた人の割合が高い傾向が認められた。

図表 28 ニコチン依存症指導中止時の状況




9) 5回の指導を全て終了した患者の指導終了時から9か月後までの状況

5回の禁煙指導を終了した患者764人における、指導終了時の状況、指導終了3か月後の状況および9か月後の状況を以下に示した。

指導終了時とそれ以外の状況とは回答選択肢が異なることに留意する必要があるが、5回目指導終了時の4週間禁煙率が72.3%、3か月後の禁煙継続率が56.8%、9か月後の禁煙継続率が45.7%となり、その割合は減少しているものの高い数値を維持した。

図表 29 指導終了時・3か月後・9か月後の禁煙／喫煙の状況



※参考：禁煙の定義【指導3か月後・9か月後】

1週間禁煙	<ul style="list-style-type: none"> ・3か月後、9か月後の調査時点で禁煙しており、少なくとも1週間、1本も吸わずに禁煙を継続している人 ・禁煙／喫煙の状況については、自己申告とする。
禁煙継続	<ul style="list-style-type: none"> ・5回目の指導終了時から3か月後、9か月後調査までの期間、または指導中断時から3か月後、9か月後調査までの期間、1本も吸わずに禁煙を継続している人 ・禁煙／喫煙の状況については、自己申告とする。

指導終了9か月後の状況について年齢別にみると、「30～39歳」の禁煙継続率が36.0%で他の年齢層よりも低い結果となった。

図表 30 指導終了9か月後の禁煙／喫煙の状況（年齢別）

	合計	禁煙 継続	1週間 禁煙	失敗	不明	無回答
全体	764 100.0%	349 45.7%	42 5.5%	230 30.1%	128 16.8%	15 2.0%
30歳未満	15 100.0%	7 46.7%	1 6.7%	1 6.7%	6 40.0%	0 0.0%
30～39歳	89 100.0%	32 36.0%	5 5.6%	30 33.7%	20 22.5%	2 2.2%
40～49歳	132 100.0%	62 47.0%	8 6.1%	29 22.0%	29 22.0%	4 3.0%
50～59歳	189 100.0%	95 50.3%	7 3.7%	60 31.7%	22 11.6%	5 2.6%
60歳以上	339 100.0%	153 45.1%	21 6.2%	110 32.4%	51 15.0%	4 1.2%

次に、喫煙年数別にみると、40年未満では、喫煙年数が長いほど禁煙継続率が高い結果となった。

図表 31 指導終了9か月後の禁煙／喫煙の状況（喫煙年数別）

	合計	禁煙 継続	1週間 禁煙	失敗	不明	無回答
全体	764 100.0%	349 45.7%	42 5.5%	230 30.1%	128 16.8%	15 2.0%
20年未満	100 100.0%	36 36.0%	4 4.0%	29 29.0%	28 28.0%	3 3.0%
20～30年未満	165 100.0%	78 47.3%	10 6.1%	40 24.2%	34 20.6%	3 1.8%
30～40年未満	188 100.0%	93 49.5%	10 5.3%	57 30.3%	23 12.2%	5 2.7%
40年以上	311 100.0%	142 45.7%	18 5.8%	104 33.4%	43 13.8%	4 1.3%

喫煙指導開始時の1日あたりの喫煙本数別にみると、喫煙本数が多いほど、禁煙継続率が低い傾向がみられた。

図表 32 指導終了9か月後の禁煙／喫煙の状況（1日あたりの喫煙本数別）

	合計	禁煙 継続	1週間 禁煙	失敗	不明	無回答
全体	764 100.0%	349 45.7%	42 5.5%	230 30.1%	128 16.8%	15 2.0%
10本未満	8 100.0%	4 50.0%	0 0.0%	4 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
10～20本未満	112 100.0%	58 51.8%	12 10.7%	27 24.1%	13 11.6%	2 1.8%
20～40本未満	505 100.0%	237 46.9%	24 4.8%	151 29.9%	82 16.2%	11 2.2%
40本以上	139 100.0%	50 36.0%	6 4.3%	48 34.5%	33 23.7%	2 1.4%

ブリンクマン指数別にみると、「1500以上」では禁煙継続率が低く、失敗率が高い結果となった。

図表 33 指導終了9か月後の禁煙／喫煙の状況（ブリンクマン指数別）

	合計	禁煙 継続	1週間 禁煙	失敗	不明	無回答
全体	764 100.0%	349 45.7%	42 5.5%	230 30.1%	128 16.8%	15 2.0%
200～500未満	177 100.0%	81 45.8%	11 6.2%	42 23.7%	40 22.6%	3 1.7%
500～1000未満	296 100.0%	142 48.0%	21 7.1%	85 28.7%	42 14.2%	6 2.0%
1000～1500未満	195 100.0%	92 47.2%	6 3.1%	63 32.3%	28 14.4%	6 3.1%
1500以上	96 100.0%	34 35.4%	4 4.2%	40 41.7%	18 18.8%	0 0.0%

TDS 点数別にみると、TDS 点数が低いほど禁煙継続率が高い傾向がみられた。

図表 34 指導終了 9 か月後の禁煙／喫煙の状況（TDS 点数別）


	合計	禁煙 継続	1 週間 禁煙	失敗	不明	無回答
全体	764 100.0%	349 45.7%	42 5.5%	230 30.1%	128 16.8%	15 2.0%
5点	62 100.0%	32 51.6%	3 4.8%	18 29.0%	7 11.3%	2 3.2%
6点	87 100.0%	48 55.2%	4 4.6%	20 23.0%	15 17.2%	0 0.0%
7点	141 100.0%	68 48.2%	11 7.8%	39 27.7%	20 14.2%	3 2.1%
8点	175 100.0%	77 44.0%	8 4.6%	59 33.7%	27 15.4%	4 2.3%
9点	183 100.0%	80 43.7%	8 4.4%	54 29.5%	38 20.8%	3 1.6%
10点	100 100.0%	34 34.0%	8 8.0%	36 36.0%	19 19.0%	3 3.0%

10) 算定回数別の指導終了3か月後および9か月後の状況


三次調査分析対象患者(2,546人)において、ニコチン依存症管理料の算定回数別に、指導終了3か月後の状況と9か月後の状況を比較した。

その結果、全体で、3か月後の禁煙継続率は40.8%、9か月後の禁煙継続率は32.6%であった。算定回数が多いほど禁煙継続率が高い傾向がみられた。5回の指導を全て終了した患者の3か月後および9か月後の禁煙継続率は、それぞれ56.8%、45.7%であった。

図表 35 指導終了3か月後の状況（算定回数別）




図表 36 指導終了9か月後の状況（算定回数別）




また、途中で治療を中止したが中止時に禁煙していた人、および5回の指導を終了した時点で禁煙（1週間禁煙もしくは4週間禁煙）していた1,440人について、ニコチン依存症管理料の算定回数別に、指導終了3か月後の状況と9か月後の状況を比較した。

その結果、9か月後は全体的に禁煙継続率が下がっているが、算定回数が多いほど禁煙継続の割合も高い傾向は変わらなかった。

図表 37 指導終了3か月後の状況（算定回数別：指導中止時／終了時の禁煙者のみ）



図表 38 指導終了9か月後の状況（算定回数別：指導中止時／終了時の禁煙者のみ）



(4) 客観的指標における継続禁煙率

本調査の患者調査では、ニコチン依存症管理料算定患者の指導終了から少なくとも9か月経過した後（指導開始から1年後）の禁煙／喫煙状況（継続禁煙率）について、医療機関が対象患者に電話調査を実施し、患者の申告結果を調査票に記入の上、返送していただく形式をとった。したがって、患者の自己申告による継続禁煙率となっている。

このため、本調査対象患者の禁煙／喫煙状況を客観的に確認して継続禁煙率を算出することを目的に、呼気一酸化炭素濃度検査に協力が可能な施設を募り、調査対象患者のうち「禁煙継続」と回答のあった患者の呼気一酸化炭素濃度検査を実施した。

この結果、医療機関 23 施設から協力を得ることができたが、最終的に、本調査対象患者で「禁煙継続」と申告のあった患者全員に対して呼気一酸化炭素濃度検査を実施した 18 施設を有効施設とした。この有効施設における「禁煙継続」と申告した患者数は 81 人であり、患者調査（アンケート）の「禁煙継続」者が 830 人であることから、本サンプルのカバー率は 9.8%となった。

「禁煙継続」と自己申告した 81 人のうち、呼気一酸化炭素濃度検査結果で非喫煙者レベルとされる 8ppm 未満となった患者の割合は 87.7%であった。したがって、患者調査（アンケート）における「禁煙継続」者（全患者の 32.6%）のうち客観的にも禁煙継続となる患者の割合が上記と同じ 87.7%であると仮定した上で、自己申告による「禁煙継続」を客観的な検査の結果で割り引いた禁煙率を試算すると、客観的な継続禁煙率は 28.6%となった。

※参考：算出方法

- 「自主申告+呼気一酸化炭素濃度検査（呼気検査）」結果による客観的な継続禁煙率（自己申告のうち、呼気検査で確認できた禁煙者の割合）は以下の方法により算出した。
- ①「禁煙継続」と自己申告した者のうち、呼気検査結果で 8ppm 未満⁴（非喫煙者レベル）となる患者（「自己申告+呼気検査」結果による「禁煙継続」者）の割合を算出。

<本調査における呼気検査の結果>

呼気検査実施施設数（件）	23
（うち）有効施設数（件）	18

※禁煙継続者の割合を厳密に算出するため、当該施設における調査対象患者のうち「禁煙継続」と自己申告した者全員について呼気検査を実施した施設のみを有効回答施設とした。

患者調査（アンケート）で「禁煙継続」と申告のあった者は 830 人である。したがって、本サンプルのカバー率は 9.8% となった。

有効回答施設における「禁煙継続」と自己申告した患者（人）	81	100.0%
（うち）呼気検査 8ppm 未満（人）	71	87.7%
（うち）喫煙しているとみなされる人数（人）	10	12.3%
呼気検査 8ppm 以上 10ppm 未満（人）	(1)	1.2%
呼気検査 10ppm 以上（人）	(5)	6.2%
検査拒否（人）	(1)	1.2%
無回答（人）	(3)	3.7%

上記により、「禁煙継続」と自己申告した者のうち、呼気検査結果で 8ppm 未満となった患者の割合は 87.7% であった。

- ②全患者に占める「自己申告+呼気検査」結果による「禁煙継続」者の割合（＝客観的な継続禁煙率）を算出。

本調査の患者調査（アンケート）において、指導終了 9 か月後の禁煙／喫煙状況で「禁煙継続」とした者の割合は全患者の 32.6% であったことから、これに上記 87.7% を乗じた。

この結果、「自己申告+呼気検査」結果による客観的な継続禁煙率は 28.6% となった。

⁴ 厚生省老人保健福祉局老人保健課（当時）「喫煙者個別健康教育マニュアル」（平成12年4月）では 8ppm 未満を非喫煙者としており、本調査ではこの基準を採用している。

(5) 禁煙成功率に関する国際比較

本調査の結果と、英国における禁煙治療による継続禁煙率に関する研究⁵の継続禁煙率を比較したものが以下の図表である。継続禁煙率に関する名称は異なるが、日英ともに禁煙治療開始から1年後の継続禁煙率を捕捉している点は共通している。これによると、自己申告による継続禁煙率、自己申告を呼気検査結果で補正した客観的な継続禁煙率、ともに、日本のほうが英国における継続禁煙率よりも高い結果となった⁶。

図表 39 禁煙成功率に関する日英比較

国名	追跡期間	継続禁煙率の名称	継続禁煙率
日本	治療開始から1年後 (治療終了9か月後)	9か月間継続禁煙率	1) 32.6% 2) 28.6%
イギリス	治療開始から1年後	1年間継続禁煙率	1) 17.7% 2) 14.6%

*1) 自主申告による。2) 「自主申告+呼気一酸化炭素濃度検査」結果による。

*イギリスの「自己申告+呼気一酸化炭素濃度検査」結果による禁煙率は、地域を限定した上で、当該地域の対象者全員に対し、呼気検査で確認した結果によるもの（自己申告で「禁煙」のうち、呼気検査で確認できた禁煙者の割合 82.5%）。

出典)

- ・日本：本調査結果。
- ・イギリス：以下の資料による。

Janet Ferguson, Linda Bauld, Johon Chesterman & Ken Judge(2005)
The English smoking treatment services : one-year outcomes. *Addiction*,100(Suppl.2)59-69.

⁵ Janet Ferguson, Linda Bauld, Johon Chesterman & Ken Judge(2005)
“The English smoking treatment services : one-year outcomes”. *Addiction*,100(Suppl.2)59-69.

⁶ 英国においては禁煙治療として、禁煙開始前に1、2回、開始日以降は4週間にわたって毎週1回、全体で5、6回の個別指導またはグループ療法が実施されているが、期間が1か月あまりと短く、日本のほうがより密度の濃い指導内容となっている。なお、薬物療法は8週間であるが、毎週引換券をもらう必要があり、日本に比べてより手間がかかり、使用期間が短くなる可能性が考えられる。

6. まとめ

平成 18 年度調査報告書のとりまとめ内容以降、新たに明らかとなった点は、以下のとおりである。

- ・ニコチン依存症指導終了 9 か月後の状況をみると、対象患者全体では 9 か月後の継続禁煙率は 32.6%となった。5 回の指導を全て終了した患者の 9 か月後の継続禁煙率は 45.7%であった。指導の回数が多いほど、9 か月後の継続禁煙率が高い傾向が認められた（図表 36）。
- ・禁煙指導開始から 1 年後の継続禁煙率は、英国の禁煙治療における継続禁煙率と比較して、高い結果となった（図表 39）。

平成 18 年度診療報酬改定結果検証に係る特別調査（厚生労働省委託事業）
ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査

※回答の際には、あてはまる番号を○（マル）で囲んでください。また、（ ）内には具体的な数値、用語等をご記入ください。（ ）内に入る数値がない場合には、「0（ゼロ）」をご記入ください。

No.	
-----	--

（1）貴施設の状況（平成 18 年 11 月現在）についてお聞きします。

施設名			
施設区分 ※病院、有床診療所の場合には、病床数も記入してください	1. 病院 ⇒ () 床	所在地（都道府県名）	() 都・道・府・県
	2. 有床診療所 ⇒ () 床	1 日平均外来患者数 ※平成 18 年 11 月	() 人
3. 無床診療所			
開設主体 ※ 1 つだけ選択	1. 国等（厚生労働省、国立病院機構、国立大学法人、労働者健康福祉機構等） 2. 公的医療機関（都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会等） 3. 社会保険関係団体（全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合等） 4. 法人（公益法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人等） 5. 個人		
標榜診療科 ※複数回答可	1. 内科 2. 呼吸器科 3. 消化器科(胃腸科) 4. 循環器科 5. 小児科 6. 精神科 7. 神経科 8. 神経内科 9. 心療内科 10. アレルギー科 11. リウマチ科 12. 外科 13. 整形外科 14. 形成外科 15. 美容外科 16. 脳神経外科 17. 呼吸器外科 18. 心臓血管外科 19. 小児外科 20. 産婦人科 21. 産科 22. 婦人科 23. 眼科 24. 耳鼻いんこう科 25. 気管食道科 26. 皮膚科 27. 泌尿器科 28. 性病科 29. こう門科 30. リハビリテーション科 31. 放射線科 32. 麻酔科 33. 歯科 34. 矯正歯科 35. 小児歯科 36. 歯科口腔外科		

（2）ニコチン依存症管理料の算定対象となる禁煙治療の状況及び体制についてお聞きします。

ニコチン依存症管理料の施設基準の届出時期	平成 18 年 () 月			
禁煙治療の体制 ※ 1 つだけ選択	1. 専門外来を設置するなど、特別の体制で禁煙治療を実施している 2. 通常の診療体制の中で禁煙治療を実施している 3. 1. と 2. の両方 4. その他 ()			
禁煙治療に携わる職員数	医師数	() 人	看護師数	() 人
	その他の職員数	() 人		
患者さんに対する 1 回あたりの平均指導時間	初回の指導	約 () 分	2 回目以降の指導 (1 回あたり)	約 () 分
平成 18 年 11 月 (1 ヶ月) における、ニコチン依存症管理料算定患者数	初回の算定患者数	() 人	2 回目以降の算定患者数	延べ () 人

ご協力いただき、誠にありがとうございました。
 様式 2 のご記入もよろしくお願い申し上げます。

- ① 平成 18 年 6 月 1 日から 7 月 31 日の期間において、ニコチン依存症管理料の算定を開始した全ての患者さんについてご記入ください。
- ② 年齢、喫煙年数、一日あたりの喫煙本数、TDS 点数は、ニコチン依存症算定開始時の状況をご記入ください。指導終了時、指導終了 3 ヶ月後の状況については、あてはまるものを○（マル）で囲んでください。各選択肢の定義は、調査要綱をご確認ください。
- ③ 5 回の指導を最後まで行わずに算定を中止した患者さんについては、中断時の喫煙状況を以下から選択し、最後に算定を行った回の右側（例えば、最終算定が 3 回目の場合は 4 回目の欄）に A、B のいずれかを記入してください（例②参照）。

A. 中断時に禁煙していた

B. 中断時に喫煙していた

- ④ 指導終了時の状況については、5 回の指導が終了した患者さんについて、終了時の状況をお答えください。指導終了 3 ヶ月後の状況については、6 月に算定を開始した患者さんについては 12 月の状況を、7 月に算定を開始した患者さんについては平成 19 年 1 月時点の状況をお答えください。

なお、5 回の指導を最後まで行わずに中止した患者さんのうち、中断時に禁煙していた患者さんについても、指導終了 3 ヶ月後の調査を行い、12 月あるいは 1 月時点における禁煙状況を調査し、結果を記入して下さい。

- ⑤ 本調査票には続紙を合わせて患者さん 50 人分の情報を記載することができますが、用紙が不足する場合には、大変恐縮ですがコピーをとり、ご記入ください。その際、番号は続き番号となるよう修正をお願いします。

患者番号	性別	年齢	喫煙年数	煙本数 一日あたりの喫	TDS 点数	算定日					5 回目の指導終了時の状況 1 週間禁煙 指導終了時点で少なくとも 1 週間禁煙できた人 4 週間禁煙 指導終了時点で少なくとも 4 週間禁煙できた人	指導終了 3 ヶ月後の状況 1 週間禁煙 3 ヶ月後の調査時点で少なくとも 1 週間禁煙できた人 禁煙継続 指導終了時から 3 ヶ月後調査までの期間、または指導中断時から 3 ヶ月後調査までの期間、禁煙を継続できた人	指導終了 3 ヶ月後の 調査の実施日		
						1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目					
例①	男	55	35	20	7	6/1	6/9	6/23	7/20	8/22	○1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	○1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	H18.12.25
例②	男	60	40	20	10	6/1	6/9	6/23	A		1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	○禁煙継続・失敗・不明	H18.12.25
1											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	
2											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	
3											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	
4											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	
5											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	
6											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	
7											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	
8											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	
9											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	
10											1 週間禁煙	4 週間禁煙・失敗	1 週間禁煙	禁煙継続・失敗・不明	

患者番号	性別	年齢	喫煙年数	煙本数 一日あたりの喫	TDS 点数	算定日					5回目の指導終了時の状況	指導終了3ヶ月後の状況	指導終了 3ヶ月後の 調査の実施日
						1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	1週間禁煙: 指導終了時点で少なくとも1週間禁煙できた人 4週間禁煙: 指導終了時点で少なくとも4週間禁煙できた人	1週間禁煙: 3ヶ月後の調査時点で少なくとも1週間禁煙できた人 禁煙継続: 指導終了時から3ヶ月後調査までの期間、または指導中断時から3ヶ月後調査までの期間、禁煙を継続できた人	
11											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
12											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
13											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
14											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
15											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
16											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
17											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
18											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
19											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
20											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
21											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
22											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
23											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
24											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
25											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
26											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
27											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
28											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
29											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	
30											1 週間禁煙・ 4 週間禁煙・ 失敗	1 週間禁煙・ 禁煙継続・ 失敗・ 不明	

患者番号	性別	年齢	喫煙年数	煙本数 一日あたりの喫	TDS点数	算定日					5回目の指導終了時の状況	指導終了3ヶ月後の状況	指導終了 3ヶ月後の 調査の実施日
						1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	1週間禁煙 指導終了時点で少なくとも1週間禁煙できた人 4週間禁煙 指導終了時点で少なくとも4週間禁煙できた人	1週間禁煙 3ヶ月後の調査時点で少なくとも1週間禁煙できた人 禁煙継続 指導終了時から3ヶ月後調査までの期間、または指導中断時から3ヶ月後調査までの期間、禁煙を継続できた人	
31											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
32											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
33											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
34											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
35											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
36											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
37											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
38											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
39											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
40											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
41											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
42											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
43											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
44											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
45											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
46											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
47											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
48											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
49											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	
50											1週間禁煙・4週間禁煙・失敗	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	

診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成19年度 厚生労働省委託事業）

ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査

- ① 平成18年6月1日から7月31日の期間において、ニコチン依存症管理料の算定を開始した患者さんの指導終了9か月後（指導開始から1年後）の状況について、医療機関から直接対象患者へお問い合わせいただき、各質問の回答欄に記入してください。
- ② 各選択肢（1週間禁煙、禁煙継続など）の定義については、同封の「調査要綱」をご覧ください。
- ③ 患者番号は、本調査の一次調査（平成18年12月調査）において貴施設で使用した患者番号と同一のものを記載してください（一次調査において貴施設で保管をお願いしました「補助票」に記載した「患者番号」と同一の番号です）。
- ④ 本調査票には続紙を合わせて患者さん46人分の情報を記載することができますが、用紙が不足する場合には、大変恐縮ですが、添付した「コピー用」調査票をコピーしていただき、ご記入ください。その際、番号は続き番号となるようお願いいたします。

NO.	
-----	--

患者番号	指導終了9か月後（指導開始から1年後）の状況	調査担当者	調査日
	1週間禁煙：指導終了9か月後の調査時点で少なくとも1週間禁煙できた人 禁煙継続：指導終了時から指導終了9か月後調査までの期間、または指導中断時から今回の9か月後調査までの期間、禁煙を継続できた人	※患者への調査を担当した方の職種に1つだけ○をつけてください。 医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
1	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
2	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
3	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
4	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
5	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
6	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
7	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
8	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
9	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
10	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
11	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
12	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
13	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
14	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
15	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
16	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
17	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
18	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
19	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日
20	1週間禁煙・禁煙継続・失敗・不明	医師・看護師・保健師・事務職員 その他（ ）	平成19年 __月__日

		合計	年齢					無回答
			30歳未満	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
全体		2546 100.0	115 4.5	507 19.9	536 21.1	608 23.9	780 30.6	0 0.0
性別	男	1884 100.0	62 3.3	324 17.2	387 20.5	454 24.1	657 34.9	0 0.0
	女	662 100.0	53 8.0	183 27.6	149 22.5	154 23.3	123 18.6	0 0.0

		合計	喫煙年数				無回答
			20年未満	20年以上 ～30年未 満	30年以上 ～40年未 満	40年以上	
全体		2546 100.0	555 21.8	667 26.2	579 22.7	745 29.3	0 0.0
性別	男	1884 100.0	327 17.4	451 23.9	432 22.9	674 35.8	0 0.0
	女	662 100.0	228 34.4	216 32.6	147 22.2	71 10.7	0 0.0

		合計	喫煙年数				無回答
			20年未満	20年以上 ～30年未 満	30年以上 ～40年未 満	40年以上	
全体		2546 100.0	555 21.8	667 26.2	579 22.7	745 29.3	0 0.0
年齢	30歳未満	115 100.0	108 93.9	5 4.3	1 0.9	1 0.9	0 0.0
	30～39歳	507 100.0	378 74.6	124 24.5	2 0.4	3 0.6	0 0.0
	40～49歳	536 100.0	36 6.7	420 78.4	80 14.9	0 0.0	0 0.0
	50～59歳	608 100.0	16 2.6	86 14.1	417 68.6	89 14.6	0 0.0
	60歳以上	780 100.0	17 2.2	32 4.1	79 10.1	652 83.6	0 0.0

		合計	喫煙本数				無回答
			10本未満	10本以上 ～20本未 満	20本以上 ～40本未 満	40本以上	
全体		2546 100.0	16 0.6	301 11.8	1645 64.6	584 22.9	0 0.0
性別	男	1884 100.0	14 0.7	191 10.1	1186 63.0	493 26.2	0 0.0
	女	662 100.0	2 0.3	110 16.6	459 69.3	91 13.7	0 0.0

		合計	喫煙本数				無回答
			10本未満	10本以上 ～20本未 満	20本以上 ～40本未 満	40本以上	
全体		2546 100.0	16 0.6	301 11.8	1645 64.6	584 22.9	0 0.0
年齢	30歳未満	115 100.0	1 0.9	4 3.5	90 78.3	20 17.4	0 0.0
	30～39歳	507 100.0	0 0.0	45 8.9	354 69.8	108 21.3	0 0.0
	40～49歳	536 100.0	0 0.0	59 11.0	347 64.7	130 24.3	0 0.0
	50～59歳	608 100.0	1 0.2	56 9.2	368 60.5	183 30.1	0 0.0
	60歳以上	780 100.0	14 1.8	137 17.6	486 62.3	143 18.3	0 0.0

		合計	TDS点数						
			5点	6点	7点	8点	9点	10点	無回答
全体		2546 100.0	203 8.0	305 12.0	483 19.0	578 22.7	556 21.8	357 14.0	64 2.5
性別	男	1884 100.0	160 8.5	238 12.6	376 20.0	420 22.3	396 21.0	248 13.2	46 2.4
	女	662 100.0	43 6.5	67 10.1	107 16.2	158 23.9	160 24.2	109 16.5	18 2.7

		合計	TDS点数						
			5点	6点	7点	8点	9点	10点	無回答
全体		2546 100.0	203 8.0	305 12.0	483 19.0	578 22.7	556 21.8	357 14.0	64 2.5
年齢	30歳未満	115 100.0	4 3.5	13 11.3	16 13.9	29 25.2	29 25.2	22 19.1	2 1.7
	30～39歳	507 100.0	25 4.9	58 11.4	101 19.9	124 24.5	119 23.5	69 13.6	11 2.2
	40～49歳	536 100.0	47 8.8	67 12.5	91 17.0	107 20.0	130 24.3	84 15.7	10 1.9
	50～59歳	608 100.0	50 8.2	78 12.8	115 18.9	135 22.2	132 21.7	81 13.3	17 2.8
	60歳以上	780 100.0	77 9.9	89 11.4	160 20.5	183 23.5	146 18.7	101 12.9	24 3.1

		合計	TDS点数						
			5点	6点	7点	8点	9点	10点	無回答
全体		2546 100.0	203 8.0	305 12.0	483 19.0	578 22.7	556 21.8	357 14.0	64 2.5
性別×年齢	男-30歳未満	62 100.0	3 4.8	8 12.9	11 17.7	19 30.6	16 25.8	5 8.1	0 0.0
	男-30～39歳	324 100.0	17 5.2	40 12.3	71 21.9	82 25.3	65 20.1	42 13.0	7 2.2
	男-40～49歳	387 100.0	38 9.8	52 13.4	70 18.1	75 19.4	90 23.3	58 15.0	4 1.0
	男-50～59歳	454 100.0	35 7.7	61 13.4	86 18.9	101 22.2	96 21.1	61 13.4	14 3.1
	男-60歳以上	657 100.0	67 10.2	77 11.7	138 21.0	143 21.8	129 19.6	82 12.5	21 3.2
	女-30歳未満	53 100.0	1 1.9	5 9.4	5 9.4	10 18.9	13 24.5	17 32.1	2 3.8
	女-30～39歳	183 100.0	8 4.4	18 9.8	30 16.4	42 23.0	54 29.5	27 14.8	4 2.2
	女-40～49歳	149 100.0	9 6.0	15 10.1	21 14.1	32 21.5	40 26.8	26 17.4	6 4.0
	女-50～59歳	154 100.0	15 9.7	17 11.0	29 18.8	34 22.1	36 23.4	20 13.0	3 1.9
	女-60歳以上	123 100.0	10 8.1	12 9.8	22 17.9	40 32.5	17 13.8	19 15.4	3 2.4

		合計	ブリンクマン				
			200以上 ～500未 満	500以上 ～1000未 満	1000以上 ～1500未 満	1500以上 無回答	
全体		2546 100.0	776 30.5	961 37.7	534 21.0	275 10.8	0 0.0
性別	男	1884 100.0	433 23.0	728 38.6	471 25.0	252 13.4	0 0.0
	女	662 100.0	343 51.8	233 35.2	63 9.5	23 3.5	0 0.0

		合計	ブリンクマン				
			200以上 ～500未 満	500以上 ～1000未 満	1000以上 ～1500未 満	1500以上	無回答
全体		2546 100.0	776 30.5	961 37.7	534 21.0	275 10.8	0 0.0
年齢	30歳未満	115 100.0	109 94.8	6 5.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	507 100.0	349 68.8	140 27.6	17 3.4	1 0.2	0 0.0
	40～49歳	536 100.0	172 32.1	268 50.0	83 15.5	13 2.4	0 0.0
	50～59歳	608 100.0	70 11.5	273 44.9	182 29.9	83 13.7	0 0.0
	60歳以上	780 100.0	76 9.7	274 35.1	252 32.3	178 22.8	0 0.0

		合計	ブリンクマン				
			200以上 ～500未 満	500以上 ～1000未 満	1000以上 ～1500未 満	1500以上	無回答
全体		2546 100.0	776 30.5	961 37.7	534 21.0	275 10.8	0 0.0
性別×年齢	男-30歳未満	62 100.0	59 95.2	3 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	男-30～39歳	324 100.0	207 63.9	104 32.1	12 3.7	1 0.3	0 0.0
	男-40～49歳	387 100.0	94 24.3	210 54.3	71 18.3	12 3.1	0 0.0
	男-50～59歳	454 100.0	27 5.9	195 43.0	155 34.1	77 17.0	0 0.0
	男-60歳以上	657 100.0	46 7.0	216 32.9	233 35.5	162 24.7	0 0.0
	女-30歳未満	53 100.0	50 94.3	3 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女-30～39歳	183 100.0	142 77.6	36 19.7	5 2.7	0 0.0	0 0.0
	女-40～49歳	149 100.0	78 52.3	58 38.9	12 8.1	1 0.7	0 0.0
	女-50～59歳	154 100.0	43 27.9	78 50.6	27 17.5	6 3.9	0 0.0
	女-60歳以上	123 100.0	30 24.4	58 47.2	19 15.4	16 13.0	0 0.0

5回の指導を全て終了した患者

		合計	指導終了時の状況			
			1週間禁 煙	4週間禁 煙	失敗	無回答
全体		764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3
性別	男	583 100.0	46 7.9	427 73.2	88 15.1	22 3.8
	女	181 100.0	17 9.4	125 69.1	36 19.9	3 1.7

5回の指導を全て終了した患者

		合計	指導終了時の状況			
			1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答
全体		764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3
年齢	30歳未満	15 100.0	2 13.3	11 73.3	1 6.7	1 6.7
	30～39歳	89 100.0	8 9.0	57 64.0	20 22.5	4 4.5
	40～49歳	132 100.0	11 8.3	101 76.5	18 13.6	2 1.5
	50～59歳	189 100.0	13 6.9	139 73.5	30 15.9	7 3.7
	60歳以上	339 100.0	29 8.6	244 72.0	55 16.2	11 3.2

5回の指導を全て終了した患者

		合計	指導終了時の状況			
			1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答
全体		764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3
喫煙年数	20年未満	100 100.0	8 8.0	69 69.0	18 18.0	5 5.0
	20年以上～30年未満	165 100.0	13 7.9	128 77.6	20 12.1	4 2.4
	30年以上～40年未満	188 100.0	14 7.4	127 67.6	39 20.7	8 4.3
	40年以上	311 100.0	28 9.0	228 73.3	47 15.1	8 2.6

5回の指導を全て終了した患者

		合計	指導終了時の状況			
			1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答
全体		764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3
喫煙本数	10本未満	8 100.0	0 0.0	6 75.0	1 12.5	1 12.5
	10本以上～20本未満	112 100.0	8 7.1	86 76.8	15 13.4	3 2.7
	20本以上～40本未満	505 100.0	42 8.3	368 72.9	81 16.0	14 2.8
	40本以上	139 100.0	13 9.4	92 66.2	27 19.4	7 5.0

5回の指導を全て終了した患者

		合計	指導終了時の状況			
			1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答
全体		764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3
TDS点数	5点	62 100.0	4 6.5	49 79.0	6 9.7	3 4.8
	6点	87 100.0	3 3.4	68 78.2	14 16.1	2 2.3
	7点	141 100.0	13 9.2	103 73.0	18 12.8	7 5.0
	8点	175 100.0	11 6.3	135 77.1	26 14.9	3 1.7
	9点	183 100.0	20 10.9	125 68.3	30 16.4	8 4.4
	10点	100 100.0	12 12.0	60 60.0	27 27.0	1 1.0

5回の指導を全て終了した患者

	合計	指導終了時の状況				
		1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答	
全体	764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3	
プリンクマン	200以上～500未満	177 100.0	13 7.3	131 74.0	25 14.1	8 4.5
	500以上～1000未満	296 100.0	24 8.1	216 73.0	47 15.9	9 3.0
	1000以上～1500未満	195 100.0	17 8.7	140 71.8	33 16.9	5 2.6
	1500以上	96 100.0	9 9.4	65 67.7	19 19.8	3 3.1

5回の指導を全て終了した患者

	合計	指導終了時の状況				
		1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答	
全体	764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3	
性別×年齢	男-30歳未満	10 100.0	2 20.0	7 70.0	0 0.0	1 10.0
	男-30～39歳	48 100.0	5 10.4	29 60.4	10 20.8	4 8.3
	男-40～49歳	94 100.0	5 5.3	75 79.8	12 12.8	2 2.1
	男-50～59歳	153 100.0	12 7.8	111 72.5	24 15.7	6 3.9
	男-60歳以上	278 100.0	22 7.9	205 73.7	42 15.1	9 3.2
	女-30歳未満	5 100.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0
	女-30～39歳	41 100.0	3 7.3	28 68.3	10 24.4	0 0.0
	女-40～49歳	38 100.0	6 15.8	26 68.4	6 15.8	0 0.0
	女-50～59歳	36 100.0	1 2.8	28 77.8	6 16.7	1 2.8
	女-60歳以上	61 100.0	7 11.5	39 63.9	13 21.3	2 3.3

5回の指導を全て終了した患者

	合計	指導終了時の状況				
		1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答	
全体	764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3	
【施設】施設区分	病院	229 100.0	12 5.2	181 79.0	28 12.2	8 3.5
	有床診療所	80 100.0	10 12.5	56 70.0	12 15.0	2 2.5
	無床診療所	449 100.0	41 9.1	312 69.5	81 18.0	15 3.3

5回の指導を全て終了した患者

	合計	指導終了時の状況				
		1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答	
全体	764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3	
【施設】開設 主体	国等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	公的医療機関	74 100.0	5 6.8	55 74.3	9 12.2	5 6.8
	社会保険関係団体	18 100.0	1 5.6	15 83.3	2 11.1	0 0.0
	法人	458 100.0	29 6.3	355 77.5	66 14.4	8 1.7
	個人	208 100.0	28 13.5	124 59.6	44 21.2	12 5.8

5回の指導を全て終了した患者

	合計	指導終了時の状況				
		1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答	
全体	764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3	
【施設】禁煙 治療の体制	特別の体制で実施	193 100.0	11 5.7	162 83.9	17 8.8	3 1.6
	通常の体制で実施	504 100.0	47 9.3	342 67.9	94 18.7	21 4.2
	1と2の両方	59 100.0	5 8.5	43 72.9	10 16.9	1 1.7
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

5回の指導を全て終了した患者

	合計	指導終了時の状況				
		1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答	
全体	764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3	
【施設】医師 数	1人	524 100.0	38 7.3	379 72.3	90 17.2	17 3.2
	2人	196 100.0	23 11.7	140 71.4	27 13.8	6 3.1
	3人以上	38 100.0	2 5.3	30 78.9	4 10.5	2 5.3

5回の指導を全て終了した患者

	合計	指導終了時の状況				
		1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答	
全体	764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3	
【施設】指導 時間（初回）	15分未満	60 100.0	18 30.0	32 53.3	9 15.0	1 1.7
	15分以上～30分未満	288 100.0	20 6.9	202 70.1	55 19.1	11 3.8
	30分以上～45分未満	313 100.0	17 5.4	236 75.4	49 15.7	11 3.5
	45分以上	93 100.0	8 8.6	75 80.6	8 8.6	2 2.2

5回の指導を全て終了した患者

		合計	指導終了時の状況			
			1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答
全体		764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3
【施設】指導 時間（2回目 以降）	10分未満	99 100.0	5 5.1	73 73.7	16 16.2	5 5.1
	10分以上～20分未満	510 100.0	46 9.0	364 71.4	84 16.5	16 3.1
	20分以上～30分未満	92 100.0	9 9.8	67 72.8	14 15.2	2 2.2
	30分以上	53 100.0	3 5.7	41 77.4	7 13.2	2 3.8

5回の指導を全て終了した患者

		合計	指導終了時の状況			
			1週間禁煙	4週間禁煙	失敗	無回答
全体		764 100.0	63 8.2	552 72.3	124 16.2	25 3.3
算定回数5回 の人の割合	0%	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	0%超～25%未満	98 100.0	10 10.2	66 67.3	19 19.4	3 3.1
	25%以上～50%未満	349 100.0	21 6.0	255 73.1	60 17.2	13 3.7
	50%以上	317 100.0	32 10.1	231 72.9	45 14.2	9 2.8

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
性別	男	1884 100.0	68 3.6	813 43.2	542 28.8	329 17.5	132 7.0
	女	662 100.0	29 4.4	227 34.3	212 32.0	129 19.5	65 9.8

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
年齢	30歳未満	115 100.0	5 4.3	32 27.8	37 32.2	31 27.0	10 8.7
	30～39歳	507 100.0	17 3.4	174 34.3	157 31.0	131 25.8	28 5.5
	40～49歳	536 100.0	19 3.5	211 39.4	153 28.5	101 18.8	52 9.7
	50～59歳	608 100.0	26 4.3	256 42.1	172 28.3	110 18.1	44 7.2
	60歳以上	780 100.0	30 3.8	367 47.1	235 30.1	85 10.9	63 8.1

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
喫煙年数	20年未満	555 100.0	20 3.6	190 34.2	169 30.5	138 24.9	38 6.8
	20年以上～30年未満	667 100.0	21 3.1	263 39.4	201 30.1	127 19.0	55 8.2
	30年以上～40年未満	579 100.0	30 5.2	237 40.9	155 26.8	107 18.5	50 8.6
	40年以上	745 100.0	26 3.5	350 47.0	229 30.7	86 11.5	54 7.2

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
喫煙本数	10本未満	16 100.0	0 0.0	8 50.0	5 31.3	2 12.5	1 6.3
	10本以上～20本未満	301 100.0	15 5.0	155 51.5	66 21.9	46 15.3	19 6.3
	20本以上～40本未満	1645 100.0	66 4.0	683 41.5	470 28.6	295 17.9	131 8.0
	40本以上	584 100.0	16 2.7	194 33.2	213 36.5	115 19.7	46 7.9

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
TDS点数	5点	203 100.0	9 4.4	96 47.3	50 24.6	34 16.7	14 6.9
	6点	305 100.0	8 2.6	135 44.3	89 29.2	46 15.1	27 8.9
	7点	483 100.0	17 3.5	207 42.9	137 28.4	84 17.4	38 7.9
	8点	578 100.0	27 4.7	227 39.3	170 29.4	109 18.9	45 7.8
	9点	556 100.0	20 3.6	229 41.2	157 28.2	102 18.3	48 8.6
	10点	357 100.0	13 3.6	118 33.1	131 36.7	72 20.2	23 6.4

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
ブリンクマン	200以上～500未満	776 100.0	33 4.3	301 38.8	213 27.4	177 22.8	52 6.7
	500以上～1000未満	961 100.0	40 4.2	413 43.0	264 27.5	159 16.5	85 8.8
	1000以上～1500未満	534 100.0	15 2.8	240 44.9	161 30.1	77 14.4	41 7.7
	1500以上	275 100.0	9 3.3	86 31.3	116 42.2	45 16.4	19 6.9

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
算定回数	1回	459 100.0	13 2.8	82 17.9	179 39.0	121 26.4	64 13.9
	2回	418 100.0	12 2.9	122 29.2	138 33.0	109 26.1	37 8.9
	3回	480 100.0	17 3.5	186 38.8	152 31.7	88 18.3	37 7.7
	4回	425 100.0	15 3.5	216 50.8	111 26.1	55 12.9	28 6.6
	5回	764 100.0	40 5.2	434 56.8	174 22.8	85 11.1	31 4.1

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
性別×年齢	男-30歳未満	62 100.0	1 1.6	23 37.1	20 32.3	15 24.2	3 4.8
	男-30～39歳	324 100.0	9 2.8	109 33.6	104 32.1	85 26.2	17 5.2
	男-40～49歳	387 100.0	12 3.1	163 42.1	105 27.1	73 18.9	34 8.8
	男-50～59歳	454 100.0	19 4.2	202 44.5	120 26.4	82 18.1	31 6.8
	男-60歳以上	657 100.0	27 4.1	316 48.1	193 29.4	74 11.3	47 7.2
	女-30歳未満	53 100.0	4 7.5	9 17.0	17 32.1	16 30.2	7 13.2
	女-30～39歳	183 100.0	8 4.4	65 35.5	53 29.0	46 25.1	11 6.0
	女-40～49歳	149 100.0	7 4.7	48 32.2	48 32.2	28 18.8	18 12.1
	女-50～59歳	154 100.0	7 4.5	54 35.1	52 33.8	28 18.2	13 8.4
	女-60歳以上	123 100.0	3 2.4	51 41.5	42 34.1	11 8.9	16 13.0

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
【施設】施設区分	病院	579 100.0	20 3.5	234 40.4	139 24.0	146 25.2	40 6.9
	有床診療所	264 100.0	11 4.2	114 43.2	97 36.7	31 11.7	11 4.2
	無床診療所	1680 100.0	66 3.9	689 41.0	512 30.5	277 16.5	136 8.1

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
【施設】開設主体	国等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	公的医療機関	165 100.0	6 3.6	71 43.0	39 23.6	36 21.8	13 7.9
	社会保険関係団体	46 100.0	4 8.7	19 41.3	14 30.4	9 19.6	0 0.0
	法人	1491 100.0	51 3.4	619 41.5	423 28.4	272 18.2	126 8.5
	個人	818 100.0	36 4.4	329 40.2	273 33.4	138 16.9	42 5.1

	合計	3か月後の状況					
		1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答	
全体	2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7	
【施設】禁煙治療の体制	特別の体制で実施	425 100.0	19 4.5	178 41.9	112 26.4	98 23.1	18 4.2
	通常の体制で実施	1876 100.0	68 3.6	756 40.3	578 30.8	318 17.0	156 8.3
	1と2の両方	209 100.0	10 4.8	99 47.4	52 24.9	35 16.7	13 6.2
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

	合計	3か月後の状況					
		1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答	
全体	2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7	
【施設】医師数	1人	1800 100.0	68 3.8	738 41.0	527 29.3	316 17.6	151 8.4
	2人	578 100.0	24 4.2	239 41.3	183 31.7	109 18.9	23 4.0
	3人以上	148 100.0	5 3.4	61 41.2	39 26.4	30 20.3	13 8.8

	合計	3か月後の状況					
		1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答	
全体	2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7	
【施設】指導時間（初回）	15分未満	234 100.0	8 3.4	94 40.2	51 21.8	30 12.8	51 21.8
	15分以上～30分未満	1047 100.0	36 3.4	413 39.4	356 34.0	160 15.3	82 7.8
	30分以上～45分未満	999 100.0	40 4.0	413 41.3	279 27.9	213 21.3	54 5.4
	45分以上	239 100.0	13 5.4	113 47.3	62 25.9	51 21.3	0 0.0

	合計	3か月後の状況					
		1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答	
全体	2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7	
【施設】指導時間（2回目以降）	10分未満	382 100.0	8 2.1	159 41.6	102 26.7	61 16.0	52 13.6
	10分以上～20分未満	1712 100.0	78 4.6	694 40.5	520 30.4	306 17.9	114 6.7
	20分以上～30分未満	281 100.0	8 2.8	115 40.9	87 31.0	62 22.1	9 3.2
	30分以上	144 100.0	3 2.1	65 45.1	39 27.1	25 17.4	12 8.3

		合計	3か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	97 3.8	1040 40.8	754 29.6	458 18.0	197 7.7
算定回数5回 の人の割合	0%	301 100.0	11 3.7	108 35.9	90 29.9	66 21.9	26 8.6
	0%超～25%未満	742 100.0	30 4.0	304 41.0	232 31.3	111 15.0	65 8.8
	25%以上～50%未満	1026 100.0	28 2.7	377 36.7	319 31.1	213 20.8	89 8.7
	50%以上	477 100.0	28 5.9	251 52.6	113 23.7	68 14.3	17 3.6

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
性別	男	1884 100.0	90 4.8	654 34.7	609 32.3	437 23.2	94 5.0
	女	662 100.0	26 3.9	176 26.6	240 36.3	171 25.8	49 7.4

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
年齢	30歳未満	115 100.0	5 4.3	27 23.5	33 28.7	42 36.5	8 7.0
	30～39歳	507 100.0	19 3.7	133 26.2	141 27.8	177 34.9	37 7.3
	40～49歳	536 100.0	25 4.7	160 29.9	177 33.0	142 26.5	32 6.0
	50～59歳	608 100.0	25 4.1	213 35.0	204 33.6	129 21.2	37 6.1
	60歳以上	780 100.0	42 5.4	297 38.1	294 37.7	118 15.1	29 3.7

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
喫煙年数	20年未満	555 100.0	15 2.7	144 25.9	158 28.5	202 36.4	36 6.5
	20年以上～30年未満	667 100.0	37 5.5	197 29.5	222 33.3	169 25.3	42 6.3
	30年以上～40年未満	579 100.0	24 4.1	204 35.2	194 33.5	126 21.8	31 5.4
	40年以上	745 100.0	40 5.4	285 38.3	275 36.9	111 14.9	34 4.6

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
喫煙本数	10本未満	16 100.0	0 0.0	5 31.3	8 50.0	3 18.8	0 0.0
	10本以上～20本未満	301 100.0	20 6.6	124 41.2	86 28.6	55 18.3	16 5.3
	20本以上～40本未満	1645 100.0	67 4.1	561 34.1	543 33.0	384 23.3	90 5.5
	40本以上	584 100.0	29 5.0	140 24.0	212 36.3	166 28.4	37 6.3

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
TDS点数	5点	203 100.0	9 4.4	76 37.4	67 33.0	38 18.7	13 6.4
	6点	305 100.0	13 4.3	111 36.4	96 31.5	72 23.6	13 4.3
	7点	483 100.0	23 4.8	163 33.7	152 31.5	116 24.0	29 6.0
	8点	578 100.0	26 4.5	180 31.1	208 36.0	128 22.1	36 6.2
	9点	556 100.0	19 3.4	179 32.2	185 33.3	148 26.6	25 4.5
	10点	357 100.0	22 6.2	97 27.2	125 35.0	95 26.6	18 5.0

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
ブリンクマン	200以上～500未満	776 100.0	30 3.9	237 30.5	223 28.7	243 31.3	43 5.5
	500以上～1000未満	961 100.0	46 4.8	330 34.3	316 32.9	211 22.0	58 6.0
	1000以上～1500未満	534 100.0	26 4.9	192 36.0	191 35.8	96 18.0	29 5.4
	1500以上	275 100.0	14 5.1	71 25.8	119 43.3	58 21.1	13 4.7

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
算定回数	1回	459 100.0	20 4.4	62 13.5	172 37.5	153 33.3	52 11.3
	2回	418 100.0	19 4.5	93 22.2	145 34.7	126 30.1	35 8.4
	3回	480 100.0	19 4.0	153 31.9	169 35.2	118 24.6	21 4.4
	4回	425 100.0	16 3.8	173 40.7	133 31.3	83 19.5	20 4.7
	5回	764 100.0	42 5.5	349 45.7	230 30.1	128 16.8	15 2.0

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
性別×年齢	男-30歳未満	62 100.0	2 3.2	18 29.0	19 30.6	21 33.9	2 3.2
	男-30～39歳	324 100.0	13 4.0	84 25.9	88 27.2	116 35.8	23 7.1
	男-40～49歳	387 100.0	17 4.4	124 32.0	122 31.5	104 26.9	20 5.2
	男-50～59歳	454 100.0	20 4.4	168 37.0	143 31.5	100 22.0	23 5.1
	男-60歳以上	657 100.0	38 5.8	260 39.6	237 36.1	96 14.6	26 4.0
	女-30歳未満	53 100.0	3 5.7	9 17.0	14 26.4	21 39.6	6 11.3
	女-30～39歳	183 100.0	6 3.3	49 26.8	53 29.0	61 33.3	14 7.7
	女-40～49歳	149 100.0	8 5.4	36 24.2	55 36.9	38 25.5	12 8.1
	女-50～59歳	154 100.0	5 3.2	45 29.2	61 39.6	29 18.8	14 9.1
	女-60歳以上	123 100.0	4 3.3	37 30.1	57 46.3	22 17.9	3 2.4

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
調査担当者	医師	667 100.0	42 6.3	277 41.5	242 36.3	102 15.3	4 0.6
	看護師	797 100.0	29 3.6	274 34.4	274 34.4	219 27.5	1 0.1
	保健師	33 100.0	1 3.0	16 48.5	10 30.3	6 18.2	0 0.0
	事務職員	719 100.0	42 5.8	230 32.0	259 36.0	188 26.1	0 0.0
	その他	66 100.0	2 3.0	19 28.8	26 39.4	19 28.8	0 0.0

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
【施設】施設区分	病院	579 100.0	28 4.8	177 30.6	192 33.2	153 26.4	29 5.0
	有床診療所	264 100.0	9 3.4	92 34.8	82 31.1	43 16.3	38 14.4
	無床診療所	1680 100.0	79 4.7	557 33.2	562 33.5	406 24.2	76 4.5

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
【施設】開設主体	国等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	公的医療機関	165 100.0	10 6.1	65 39.4	47 28.5	19 11.5	24 14.5
	社会保険関係団体	46 100.0	0 0.0	11 23.9	21 45.7	14 30.4	0 0.0
	法人	1491 100.0	61 4.1	504 33.8	490 32.9	375 25.2	61 4.1
	個人	818 100.0	45 5.5	246 30.1	276 33.7	193 23.6	58 7.1

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
【施設】禁煙治療の体制	特別の体制で実施	425 100.0	16 3.8	139 32.7	146 34.4	110 25.9	14 3.3
	通常の体制で実施	1876 100.0	88 4.7	611 32.6	623 33.2	430 22.9	124 6.6
	1と2の両方	209 100.0	8 3.8	73 34.9	64 30.6	59 28.2	5 2.4
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
【施設】医師数	1人	1800 100.0	92 5.1	603 33.5	605 33.6	411 22.8	89 4.9
	2人	578 100.0	21 3.6	184 31.8	180 31.1	151 26.1	42 7.3
	3人以上	148 100.0	3 2.0	39 26.4	53 35.8	41 27.7	12 8.1

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
【施設】指導時間（初回）	15分未満	234 100.0	20 8.5	81 34.6	88 37.6	44 18.8	1 0.4
	15分以上～30分未満	1047 100.0	40 3.8	319 30.5	374 35.7	239 22.8	75 7.2
	30分以上～45分未満	999 100.0	53 5.3	338 33.8	304 30.4	237 23.7	67 6.7
	45分以上	239 100.0	3 1.3	83 34.7	71 29.7	82 34.3	0 0.0

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
【施設】指導時間（2回目以降）	10分未満	382 100.0	25 6.5	145 38.0	125 32.7	68 17.8	19 5.0
	10分以上～20分未満	1712 100.0	76 4.4	530 31.0	553 32.3	440 25.7	113 6.6
	20分以上～30分未満	281 100.0	12 4.3	97 34.5	103 36.7	58 20.6	11 3.9
	30分以上	144 100.0	3 2.1	49 34.0	56 38.9	36 25.0	0 0.0

		合計	9か月後の状況				
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6
算定回数5回の人の割合	0%	301 100.0	14 4.7	80 26.6	115 38.2	86 28.6	6 2.0
	0%超～25%未満	742 100.0	36 4.9	233 31.4	238 32.1	186 25.1	49 6.6
	25%以上～50%未満	1026 100.0	36 3.5	322 31.4	348 33.9	244 23.8	76 7.4
	50%以上	477 100.0	30 6.3	195 40.9	148 31.0	92 19.3	12 2.5

		合計	中止状況		
			禁煙	喫煙	無回答
全体		1782	825	644	313
		100.0	46.3	36.1	17.6
算定回数	1回	459	109	222	128
		100.0	23.7	48.4	27.9
	2回	418	193	153	72
		100.0	46.2	36.6	17.2
3回	480	270	163	47	
	100.0	56.3	34.0	9.8	
4回	425	253	106	66	
	100.0	59.5	24.9	15.5	

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546	459	418	480	425	764	0
		100.0	18.0	16.4	18.9	16.7	30.0	0.0
性別	男	1884	310	303	355	333	583	0
		100.0	16.5	16.1	18.8	17.7	30.9	0.0
	女	662	149	115	125	92	181	0
		100.0	22.5	17.4	18.9	13.9	27.3	0.0

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546	459	418	480	425	764	0
		100.0	18.0	16.4	18.9	16.7	30.0	0.0
年齢	30歳未満	115	40	26	21	13	15	0
		100.0	34.8	22.6	18.3	11.3	13.0	0.0
	30～39歳	507	133	95	113	77	89	0
		100.0	26.2	18.7	22.3	15.2	17.6	0.0
	40～49歳	536	96	111	100	97	132	0
		100.0	17.9	20.7	18.7	18.1	24.6	0.0
50～59歳	608	106	103	107	103	189	0	
	100.0	17.4	16.9	17.6	16.9	31.1	0.0	
60歳以上	780	84	83	139	135	339	0	
	100.0	10.8	10.6	17.8	17.3	43.5	0.0	

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546	459	418	480	425	764	0
		100.0	18.0	16.4	18.9	16.7	30.0	0.0
喫煙年数	20年未満	555	144	103	122	86	100	0
		100.0	25.9	18.6	22.0	15.5	18.0	0.0
	20年以上～30年未満	667	140	131	123	108	165	0
		100.0	21.0	19.6	18.4	16.2	24.7	0.0
	30年以上～40年未満	579	91	98	100	102	188	0
	100.0	15.7	16.9	17.3	17.6	32.5	0.0	
40年以上	745	84	86	135	129	311	0	
	100.0	11.3	11.5	18.1	17.3	41.7	0.0	

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546	459	418	480	425	764	0
		100.0	18.0	16.4	18.9	16.7	30.0	0.0
喫煙本数	10本未満	16	2	2	3	1	8	0
		100.0	12.5	12.5	18.8	6.3	50.0	0.0
	10本以上～20本未満	301	49	37	56	47	112	0
		100.0	16.3	12.3	18.6	15.6	37.2	0.0
	20本以上～40本未満	1645	282	270	305	283	505	0
	100.0	17.1	16.4	18.5	17.2	30.7	0.0	
40本以上	584	126	109	116	94	139	0	
	100.0	21.6	18.7	19.9	16.1	23.8	0.0	

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546 100.0	459 18.0	418 16.4	480 18.9	425 16.7	764 30.0	0 0.0
TDS点数	5点	203 100.0	32 15.8	32 15.8	43 21.2	34 16.7	62 30.5	0 0.0
	6点	305 100.0	53 17.4	53 17.4	69 22.6	43 14.1	87 28.5	0 0.0
	7点	483 100.0	84 17.4	86 17.8	92 19.0	80 16.6	141 29.2	0 0.0
	8点	578 100.0	105 18.2	94 16.3	102 17.6	102 17.6	175 30.3	0 0.0
	9点	556 100.0	95 17.1	83 14.9	99 17.8	96 17.3	183 32.9	0 0.0
	10点	357 100.0	76 21.3	60 16.8	64 17.9	57 16.0	100 28.0	0 0.0

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546 100.0	459 18.0	418 16.4	480 18.9	425 16.7	764 30.0	0 0.0
ブリンクマン	200以上～500未満	776 100.0	173 22.3	147 18.9	156 20.1	123 15.9	177 22.8	0 0.0
	500以上～1000未満	961 100.0	172 17.9	142 14.8	178 18.5	173 18.0	296 30.8	0 0.0
	1000以上～1500未満	534 100.0	71 13.3	84 15.7	102 19.1	82 15.4	195 36.5	0 0.0
	1500以上	275 100.0	43 15.6	45 16.4	44 16.0	47 17.1	96 34.9	0 0.0

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546 100.0	459 18.0	418 16.4	480 18.9	425 16.7	764 30.0	0 0.0
性別×年齢	男-30歳未満	62 100.0	18 29.0	11 17.7	12 19.4	11 17.7	10 16.1	0 0.0
	男-30～39歳	324 100.0	82 25.3	67 20.7	76 23.5	51 15.7	48 14.8	0 0.0
	男-40～49歳	387 100.0	66 17.1	78 20.2	75 19.4	74 19.1	94 24.3	0 0.0
	男-50～59歳	454 100.0	76 16.7	78 17.2	70 15.4	77 17.0	153 33.7	0 0.0
	男-60歳以上	657 100.0	68 10.4	69 10.5	122 18.6	120 18.3	278 42.3	0 0.0
	女-30歳未満	53 100.0	22 41.5	15 28.3	9 17.0	2 3.8	5 9.4	0 0.0
	女-30～39歳	183 100.0	51 27.9	28 15.3	37 20.2	26 14.2	41 22.4	0 0.0
	女-40～49歳	149 100.0	30 20.1	33 22.1	25 16.8	23 15.4	38 25.5	0 0.0
	女-50～59歳	154 100.0	30 19.5	25 16.2	37 24.0	26 16.9	36 23.4	0 0.0
	女-60歳以上	123 100.0	16 13.0	14 11.4	17 13.8	15 12.2	61 49.6	0 0.0

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546 100.0	459 18.0	418 16.4	480 18.9	425 16.7	764 30.0	0 0.0
【施設】施設区分	病院	579 100.0	81 14.0	71 12.3	98 16.9	100 17.3	229 39.6	0 0.0
	有床診療所	264 100.0	53 20.1	42 15.9	44 16.7	45 17.0	80 30.3	0 0.0
	無床診療所	1680 100.0	322 19.2	297 17.7	333 19.8	279 16.6	449 26.7	0 0.0

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546 100.0	459 18.0	418 16.4	480 18.9	425 16.7	764 30.0	0 0.0
【施設】開設 主体	国等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	公的医療機関	165 100.0	14 8.5	13 7.9	21 12.7	43 26.1	74 44.8	0 0.0
	社会保険関係団体	46 100.0	3 6.5	2 4.3	11 23.9	12 26.1	18 39.1	0 0.0
	法人	1491 100.0	274 18.4	251 16.8	278 18.6	230 15.4	458 30.7	0 0.0
	個人	818 100.0	166 20.3	145 17.7	163 19.9	136 16.6	208 25.4	0 0.0

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546 100.0	459 18.0	418 16.4	480 18.9	425 16.7	764 30.0	0 0.0
【施設】禁煙 治療の体制	特別の体制で実施	425 100.0	44 10.4	43 10.1	69 16.2	76 17.9	193 45.4	0 0.0
	通常の体制で実施	1876 100.0	363 19.3	331 17.6	365 19.5	313 16.7	504 26.9	0 0.0
	1と2の両方	209 100.0	46 22.0	36 17.2	36 17.2	32 15.3	59 28.2	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546 100.0	459 18.0	418 16.4	480 18.9	425 16.7	764 30.0	0 0.0
【施設】医師 数	1人	1800 100.0	331 18.4	297 16.5	345 19.2	303 16.8	524 29.1	0 0.0
	2人	578 100.0	91 15.7	89 15.4	106 18.3	96 16.6	196 33.9	0 0.0
	3人以上	148 100.0	35 23.6	26 17.6	24 16.2	25 16.9	38 25.7	0 0.0

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546 100.0	459 18.0	418 16.4	480 18.9	425 16.7	764 30.0	0 0.0
【施設】指導 時間（初回）	15分未満	234 100.0	62 26.5	43 18.4	34 14.5	35 15.0	60 25.6	0 0.0
	15分以上～30分未満	1047 100.0	199 19.0	169 16.1	207 19.8	184 17.6	288 27.5	0 0.0
	30分以上～45分未満	999 100.0	162 16.2	169 16.9	195 19.5	160 16.0	313 31.3	0 0.0
	45分以上	239 100.0	34 14.2	30 12.6	38 15.9	44 18.4	93 38.9	0 0.0

		合計	算定回数					無回答
			1回	2回	3回	4回	5回	
全体		2546 100.0	459 18.0	418 16.4	480 18.9	425 16.7	764 30.0	0 0.0
【施設】指導 時間（2回目 以降）	10分未満	382 100.0	85 22.3	64 16.8	68 17.8	66 17.3	99 25.9	0 0.0
	10分以上～20分未満	1712 100.0	310 18.1	282 16.5	328 19.2	282 16.5	510 29.8	0 0.0
	20分以上～30分未満	281 100.0	43 15.3	46 16.4	51 18.1	49 17.4	92 32.7	0 0.0
	30分以上	144 100.0	19 13.2	19 13.2	27 18.8	26 18.1	53 36.8	0 0.0

		合計	9か月後の状況						
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答		
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6		
性別	男性	計	1884 100.0	90 4.8	654 34.7	609 32.3	437 23.2	94 5.0	
		算定回数	1回	310 100.0	15 4.8	47 15.2	120 38.7	102 32.9	26 8.4
			2回	303 100.0	16 5.3	74 24.4	97 32.0	92 30.4	24 7.9
			3回	355 100.0	15 4.2	121 34.1	116 32.7	88 24.8	15 4.2
			4回	333 100.0	15 4.5	143 42.9	100 30.0	57 17.1	18 5.4
			5回	583 100.0	29 5.0	269 46.1	176 30.2	98 16.8	11 1.9
	女性	計	662 100.0	26 3.9	176 26.6	240 36.3	171 25.8	49 7.4	
		算定回数	1回	149 100.0	5 3.4	15 10.1	52 34.9	51 34.2	26 17.4
			2回	115 100.0	3 2.6	19 16.5	48 41.7	34 29.6	11 9.6
			3回	125 100.0	4 3.2	32 25.6	53 42.4	30 24.0	6 4.8
			4回	92 100.0	1 1.1	30 32.6	33 35.9	26 28.3	2 2.2
			5回	181 100.0	13 7.2	80 44.2	54 29.8	30 16.6	4 2.2

		合計	9か月後の状況						
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答		
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6		
年齢	30歳未満	計	115 100.0	5 4.3	27 23.5	33 28.7	42 36.5	8 7.0	
		算定回数	1回	40 100.0	2 5.0	5 12.5	13 32.5	17 42.5	3 7.5
			2回	26 100.0	1 3.8	3 11.5	11 42.3	8 30.8	3 11.5
			3回	21 100.0	1 4.8	4 19.0	7 33.3	7 33.3	2 9.5
			4回	13 100.0	0 0.0	8 61.5	1 7.7	4 30.8	0 0.0
			5回	15 100.0	1 6.7	7 46.7	1 6.7	6 40.0	0 0.0
		30～39歳	計	507 100.0	19 3.7	133 26.2	141 27.8	177 34.9	37 7.3
	算定回数		1回	133 100.0	3 2.3	22 16.5	38 28.6	56 42.1	14 10.5
			2回	95 100.0	5 5.3	22 23.2	19 20.0	37 38.9	12 12.6
			3回	113 100.0	4 3.5	33 29.2	32 28.3	42 37.2	2 1.8
			4回	77 100.0	2 2.6	24 31.2	22 28.6	22 28.6	7 9.1
			5回	89 100.0	5 5.6	32 36.0	30 33.7	20 22.5	2 2.2
	40～49歳		計	536 100.0	25 4.7	160 29.9	177 33.0	142 26.5	32 6.0
		算定回数	1回	96 100.0	5 5.2	12 12.5	42 43.8	26 27.1	11 11.5
			2回	111 100.0	7 6.3	25 22.5	37 33.3	34 30.6	8 7.2
			3回	100 100.0	3 3.0	27 27.0	39 39.0	27 27.0	4 4.0
			4回	97 100.0	2 2.1	34 35.1	30 30.9	26 26.8	5 5.2
			5回	132 100.0	8 6.1	62 47.0	29 22.0	29 22.0	4 3.0
		50～59歳	計	608 100.0	25 4.1	213 35.0	204 33.6	129 21.2	37 6.1
	算定回数		1回	106 100.0	6 5.7	14 13.2	31 29.2	39 36.8	16 15.1
			2回	103 100.0	3 2.9	23 22.3	43 41.7	28 27.2	6 5.8
			3回	107 100.0	5 4.7	37 34.6	38 35.5	21 19.6	6 5.6
			4回	103 100.0	4 3.9	44 42.7	32 31.1	19 18.4	4 3.9
			5回	189 100.0	7 3.7	95 50.3	60 31.7	22 11.6	5 2.6
	60歳以上		計	780 100.0	42 5.4	297 38.1	294 37.7	118 15.1	29 3.7
算定回数		1回	84 100.0	4 4.8	9 10.7	48 57.1	15 17.9	8 9.5	
		2回	83 100.0	3 3.6	20 24.1	35 42.2	19 22.9	6 7.2	
		3回	139 100.0	6 4.3	52 37.4	53 38.1	21 15.1	7 5.0	
		4回	135 100.0	8 5.9	63 46.7	48 35.6	12 8.9	4 3.0	
		5回	339 100.0	21 6.2	153 45.1	110 32.4	51 15.0	4 1.2	

		合計	9か月後の状況						
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答		
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6		
喫煙年数	20年未満	計	555 100.0	15 2.7	144 25.9	158 28.5	202 36.4	36 6.5	
		算定回数	1回	144 100.0	3 2.1	24 16.7	39 27.1	68 47.2	10 6.9
			2回	103 100.0	5 4.9	23 22.3	26 25.2	36 35.0	13 12.6
			3回	122 100.0	2 1.6	32 26.2	39 32.0	44 36.1	5 4.1
			4回	86 100.0	1 1.2	29 33.7	25 29.1	26 30.2	5 5.8
			5回	100 100.0	4 4.0	36 36.0	29 29.0	28 28.0	3 3.0
		20年以上 ～30年未満	計	667 100.0	37 5.5	197 29.5	222 33.3	169 25.3	42 6.3
	算定回数	1回	140 100.0	7 5.0	17 12.1	63 45.0	36 25.7	17 12.1	
		2回	131 100.0	9 6.9	26 19.8	44 33.6	43 32.8	9 6.9	
		3回	123 100.0	8 6.5	36 29.3	46 37.4	28 22.8	5 4.1	
		4回	108 100.0	3 2.8	40 37.0	29 26.9	28 25.9	8 7.4	
		5回	165 100.0	10 6.1	78 47.3	40 24.2	34 20.6	3 1.8	
	30年以上 ～40年未満	計	579 100.0	24 4.1	204 35.2	194 33.5	126 21.8	31 5.4	
		算定回数	1回	91 100.0	7 7.7	12 13.2	28 30.8	30 33.0	14 15.4
			2回	98 100.0	1 1.0	20 20.4	39 39.8	31 31.6	7 7.1
			3回	100 100.0	4 4.0	31 31.0	36 36.0	26 26.0	3 3.0
			4回	102 100.0	2 2.0	48 47.1	34 33.3	16 15.7	2 2.0
			5回	188 100.0	10 5.3	93 49.5	57 30.3	23 12.2	5 2.7
		40年以上	計	745 100.0	40 5.4	285 38.3	275 36.9	111 14.9	34 4.6
	算定回数	1回	84 100.0	3 3.6	9 10.7	42 50.0	19 22.6	11 13.1	
2回		86 100.0	4 4.7	24 27.9	36 41.9	16 18.6	6 7.0		
3回		135 100.0	5 3.7	54 40.0	48 35.6	20 14.8	8 5.9		
4回		129 100.0	10 7.8	56 43.4	45 34.9	13 10.1	5 3.9		
5回		311 100.0	18 5.8	142 45.7	104 33.4	43 13.8	4 1.3		

		合計	9か月後の状況						
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答		
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6		
1日あたり喫煙本数	10本未満	計	16 100.0	0 0.0	5 31.3	8 50.0	3 18.8	0 0.0	
		算定回数	1回	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
			2回	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
			3回	3 100.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0
			4回	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
			5回	8 100.0	0 0.0	4 50.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0
		10本以上 ~20本未満	計	301 100.0	20 6.6	124 41.2	86 28.6	55 18.3	16 5.3
	算定回数	1回	49 100.0	3 6.1	7 14.3	16 32.7	14 28.6	9 18.4	
		2回	37 100.0	1 2.7	10 27.0	15 40.5	9 24.3	2 5.4	
		3回	56 100.0	3 5.4	26 46.4	13 23.2	13 23.2	1 1.8	
		4回	47 100.0	1 2.1	23 48.9	15 31.9	6 12.8	2 4.3	
		5回	112 100.0	12 10.7	58 51.8	27 24.1	13 11.6	2 1.8	
	20本以上 ~40本未満	計	1645 100.0	67 4.1	561 34.1	543 33.0	384 23.3	90 5.5	
		算定回数	1回	282 100.0	12 4.3	43 15.2	102 36.2	95 33.7	30 10.6
			2回	270 100.0	12 4.4	69 25.6	90 33.3	75 27.8	24 8.9
			3回	305 100.0	10 3.3	96 31.5	116 38.0	70 23.0	13 4.3
			4回	283 100.0	9 3.2	116 41.0	84 29.7	62 21.9	12 4.2
			5回	505 100.0	24 4.8	237 46.9	151 29.9	82 16.2	11 2.2
	40本以上	計	584 100.0	29 5.0	140 24.0	212 36.3	166 28.4	37 6.3	
		算定回数	1回	126 100.0	5 4.0	12 9.5	52 41.3	44 34.9	13 10.3
			2回	109 100.0	6 5.5	14 12.8	40 36.7	40 36.7	9 8.3
3回			116 100.0	6 5.2	31 26.7	38 32.8	34 29.3	7 6.0	
4回			94 100.0	6 6.4	33 35.1	34 36.2	15 16.0	6 6.4	
5回			139 100.0	6 4.3	50 36.0	48 34.5	33 23.7	2 1.4	

		合計	9か月後の状況					
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答	
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6	
TDS点数	5点	計	203 100.0	9 4.4	76 37.4	67 33.0	38 18.7	13 6.4
		算定回数	1回	32 100.0	1 3.1	5 15.6	11 34.4	11 34.4
	2回		32 100.0	0 0.0	5 15.6	16 50.0	9 28.1	2 6.3
	3回		43 100.0	5 11.6	16 37.2	13 30.2	6 14.0	3 7.0
	4回		34 100.0	0 0.0	18 52.9	9 26.5	5 14.7	2 5.9
	5回		62 100.0	3 4.8	32 51.6	18 29.0	7 11.3	2 3.2
	6点	計	305 100.0	13 4.3	111 36.4	96 31.5	72 23.6	13 4.3
		算定回数	1回	53 100.0	4 7.5	5 9.4	27 50.9	14 26.4
	2回		53 100.0	2 3.8	14 26.4	15 28.3	20 37.7	2 3.8
	3回		69 100.0	1 1.4	26 37.7	23 33.3	13 18.8	6 8.7
	4回		43 100.0	2 4.7	18 41.9	11 25.6	10 23.3	2 4.7
	5回		87 100.0	4 4.6	48 55.2	20 23.0	15 17.2	0 0.0
	7点	計	483 100.0	23 4.8	163 33.7	152 31.5	116 24.0	29 6.0
		算定回数	1回	84 100.0	2 2.4	10 11.9	30 35.7	30 35.7
	2回		86 100.0	5 5.8	19 22.1	31 36.0	22 25.6	9 10.5
	3回		92 100.0	3 3.3	31 33.7	27 29.3	30 32.6	1 1.1
	4回		80 100.0	2 2.5	35 43.8	25 31.3	14 17.5	4 5.0
	5回		141 100.0	11 7.8	68 48.2	39 27.7	20 14.2	3 2.1
	8点	計	578 100.0	26 4.5	180 31.1	208 36.0	128 22.1	36 6.2
		算定回数	1回	105 100.0	4 3.8	11 10.5	40 38.1	36 34.3
2回	94 100.0		6 6.4	18 19.1	31 33.0	29 30.9	10 10.6	
3回	102 100.0		4 3.9	31 30.4	44 43.1	20 19.6	3 2.9	
4回	102 100.0		4 3.9	43 42.2	34 33.3	16 15.7	5 4.9	
5回	175 100.0		8 4.6	77 44.0	59 33.7	27 15.4	4 2.3	
9点	計	556 100.0	19 3.4	179 32.2	185 33.3	148 26.6	25 4.5	
	算定回数	1回	95 100.0	3 3.2	12 12.6	35 36.8	37 38.9	8 8.4
2回		83 100.0	4 4.8	21 25.3	25 30.1	28 33.7	5 6.0	
3回		99 100.0	2 2.0	30 30.3	39 39.4	25 25.3	3 3.0	
4回		96 100.0	2 2.1	36 37.5	32 33.3	20 20.8	6 6.3	
5回		183 100.0	8 4.4	80 43.7	54 29.5	38 20.8	3 1.6	
10点	計	357 100.0	22 6.2	97 27.2	125 35.0	95 26.6	18 5.0	
	算定回数	1回	76 100.0	5 6.6	14 18.4	26 34.2	24 31.6	7 9.2
2回		60 100.0	2 3.3	14 23.3	25 41.7	13 21.7	6 10.0	
3回		64 100.0	3 4.7	17 26.6	19 29.7	23 35.9	2 3.1	
4回		57 100.0	4 7.0	18 31.6	19 33.3	16 28.1	0 0.0	
5回		100 100.0	8 8.0	34 34.0	36 36.0	19 19.0	3 3.0	

		合計	9か月後の状況						
			1週間禁煙	禁煙継続	失敗	不明	無回答		
全体		2546 100.0	116 4.6	830 32.6	849 33.3	608 23.9	143 5.6		
プリンクマン指数	200以上 ～500未満	計	776 100.0	30 3.9	237 30.5	223 28.7	243 31.3	43 5.5	
		算定回数	1回	173 100.0	5 2.9	28 16.2	53 30.6	70 40.5	17 9.8
			2回	147 100.0	7 4.8	30 20.4	46 31.3	52 35.4	12 8.2
			3回	156 100.0	5 3.2	48 30.8	50 32.1	46 29.5	7 4.5
			4回	123 100.0	2 1.6	50 40.7	32 26.0	35 28.5	4 3.3
			5回	177 100.0	11 6.2	81 45.8	42 23.7	40 22.6	3 1.7
		500以上 ～1000未満	計	961 100.0	46 4.8	330 34.3	316 32.9	211 22.0	58 6.0
	算定回数	1回	172 100.0	8 4.7	21 12.2	68 39.5	53 30.8	22 12.8	
		2回	142 100.0	4 2.8	40 28.2	41 28.9	44 31.0	13 9.2	
		3回	178 100.0	6 3.4	58 32.6	65 36.5	44 24.7	5 2.8	
		4回	173 100.0	7 4.0	69 39.9	57 32.9	28 16.2	12 6.9	
		5回	296 100.0	21 7.1	142 48.0	85 28.7	42 14.2	6 2.0	
	1000以上 ～1500未満	計	534 100.0	26 4.9	192 36.0	191 35.8	96 18.0	29 5.4	
		算定回数	1回	71 100.0	6 8.5	9 12.7	29 40.8	18 25.4	9 12.7
			2回	84 100.0	6 7.1	18 21.4	38 45.2	15 17.9	7 8.3
			3回	102 100.0	6 5.9	34 33.3	39 38.2	20 19.6	3 2.9
			4回	82 100.0	2 2.4	39 47.6	22 26.8	15 18.3	4 4.9
			5回	195 100.0	6 3.1	92 47.2	63 32.3	28 14.4	6 3.1
		1500以上	計	275 100.0	14 5.1	71 25.8	119 43.3	58 21.1	13 4.7
	算定回数	1回	43 100.0	1 2.3	4 9.3	22 51.2	12 27.9	4 9.3	
2回		45 100.0	2 4.4	5 11.1	20 44.4	15 33.3	3 6.7		
3回		44 100.0	2 4.5	13 29.5	15 34.1	8 18.2	6 13.6		
4回		47 100.0	5 10.6	15 31.9	22 46.8	5 10.6	0 0.0		
5回		96 100.0	4 4.2	34 35.4	40 41.7	18 18.8	0 0.0		