

表8. 病態別剖検率

	死亡者数	剖検実施者数	剖検実施率(%)
孤発性CJD	638	111	17
変異型CJD	1	1	100
硬膜移植歴を有するCJD	65	26	40
家族性CJD	78	27	35
GSS	18	3	17
FFI	3	3	100
合計	804	171	21

剖検の実施は判明しているが結果がまだサーベイランス委員会で検討されていない例や、生検によって確実例となった例があるため、表7の結果とは一致しない。

表9. 硬膜移植歴を有するクロイツフェルト・ヤコブ病患者の移植のもととなった病態

病態(疾患)	人数 (%)
脳腫瘍	60 (45)
脳出血	21 (16)
未破裂動脈瘤	9 (7)
脳血腫	6 (5)
奇形	6 (5)
事故	4 (3)
顔面痙攣	18 (14)
三叉神経痛	7 (5)
後縦靭帯骨化症	1 (1)
計	132 (100)

括弧内は%(四捨五入の関係で合計は100%にならないこともある)

表10. 硬膜移植歴を有するクロイツフェルト・ヤコブ病患者の移植年と移植から発病までの期間
 移植から発病までの期間(年)

移植年	1-10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計
1978												1	1			2
79				1					1							2
1980					1	1										2
81	1			1											1	3
82	4			2		1							1			8
83	6			1	5	1						1				14
84	12	2		4	1	1	1	2				1	1			25
85	12	1	1	2	2	2	2		1	2						23
86	10	1	2	3	2	4	4	2								28
87	8	2	1	3	1		2		2							19
88	1					1										2
89	2															2
1990																
91	1															1
92																
93	1															1
合計	58	6	4	17	12	9	9	4	4	2		3	3		1	132