

No.	一般名	薬効分類	改訂内容
平成19年8月10日			
07-031	乾燥甲状腺 レボチロキシナトリ ウム水和物	243 甲状腺、副 甲状腺ホルモン剤	〔副作用〕の「重大な副作用」の項に「肝機能障害、黄疸」を追記した。
07-032	シクロフェニル	249 その他のホル モン剤	〔副作用〕の項に新たに「重大な副作用」として「肝機能障害、黄疸」を追記した。
07-033	シロドシン	259 その他の泌 尿生殖器官及び肛門 用薬	〔副作用〕の「重大な副作用」の項に「肝機能障害、黄疸」を追記した。
07-034	ジスルフィラム	393 習慣性中毒 用剤	〔副作用〕の「重大な副作用」の項に「肝機能障害、黄疸」を追記した。
07-035	エンテカビル水和物	625 抗ウイルス 剤	〔重要な基本的注意〕の項に「抗HIV療法を受けていないHIV/HBVの重複感染患者のB型肝炎に対して本剤を投与した場合、薬剤耐性HIVが出現する可能性があるため、抗HIV療法を併用していないHIV/HBV重複感染患者には本剤の投与を避けることが望ましい。」を追記した。
07-036	組換え沈降B型肝炎ワ クチン（酵母由来）	631 ワクチン類	〔副反応〕の「重大な副反応」の項に「ショック、アナフィラキシー様症状」を追記した。
07-037	乾燥弱毒生麻しん風し ん混合ワクチン	636 混合生物学 的製剤	「重大な副反応」の項に単味ワクチン（乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン）接種後の副反応として記載されている重大な副反応を、本剤（混合ワクチン）接種後の重大な副反応として記載整備した。
平成19年9月7日			
07-038	プラリドキシムヨウ化 メチル	392 解毒剤	〔重要な基本的注意〕の項を新たに設け、「本剤を投与中の患者において、実際の血糖値よりも高値を示すことがあるので、血糖測定用試薬及び測定器の血糖測定値に対する影響について、事前に製造販売業者から情報を入手すること。〔本剤を投与中の患者で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがある。〕」を追記した。
07-039	アキュチェックアビバ ストリップ	743 体外診断用 医薬品	〔警告〕の項の「実際の血糖値より高値を示すことがあるので、以下の患者には使用しないこと。」として「プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者」を追記し、 〔操作上の注意〕の「妨害物質・妨害薬剤」の項に「プラリドキシムヨウ化メチルにより、実際の血糖値より高値を示すことがある。」を追記した。