

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		無顆粒球症	5
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ減少	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	8
		アルコール相互作用	1
		意識変容状態	8
		アナフィラキシーショック	1
		無嗅覚	1
		赤芽球癆	1
		再生不良性貧血	1
		無呼吸発作	2
		不整脈	1
		関節痛	2
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ減少	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	9
		固定姿勢保持困難	2
		無力症	1
		運動失調	1
		出血時間延長	1
		血中コレステロール増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血中クレアチニン増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	5
		血中カリウム減少	1
		血圧低下	3
		血圧上昇	2
		血中トリグリセリド増加	1
		血中尿素増加	1
		徐脈	4
		乳癌	1
		気管支拡張症	1
		C-反応性蛋白増加	5
		心停止	2
		心不全	2
		慢性心不全	1
		心肺停止	2
		カタトニー	1
		蜂巣炎	2
		脳梗塞	1
		胸部不快感	1
		胆管炎	1
		舞蹈病アテトーゼ	1
		潰瘍性大腸炎	3
		昏睡	1
		自殺既遂	1
		転換性障害	3
		痙攣	8
		死亡	1
		意識レベルの低下	3
		うつ病	1
		水疱性皮膚炎	1
		剥脱性皮膚炎	3
		尿崩症	1
		下痢	3
		複視	2
		播種性血管内凝固	3
		浮動性めまい	4
		薬疹	32
		薬物過敏症	3
		薬物相互作用	5
		薬物濃度減少	1
		薬物毒性	2
		構語障害	1
		ジスキネジー	3
		労作性呼吸困難	1
		湿疹	1
		心電図異常	1
		肺気腫	1
		心内膜炎	1
		好酸球数増加	3
		好酸球増加症	2
		好酸球性肺炎	3
		てんかん	5
		紅斑	1
		多形紅斑	12
		転倒・転落	4
		疲労	1
		歩行障害	3
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	11
		大発作痙攣	1
		顆粒球減少症	1
		女性化乳房	1
		吐血	1
		ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	3
		溶血性貧血	1