

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
117	リスベリドン	白血球数減少	1
		アカシジア	1
		意識変容状態	1
		喘息	1
		運動失調	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		徐脈	2
		急性心不全	1
		カタトニー	1
		脳梗塞	1
		自殺既遂	3
		死亡	4
		意識レベルの低下	2
		糖尿病	1
		糖尿病性昏睡	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	2
		薬疹	3
		新生児薬物離脱症候群	1
		ジスキネジー	1
		ジストニー	1
		射精障害	1
		心電図QT延長	1
		てんかん	1
		幻聴	1
		頭痛	2
		肝機能異常	3
		高プロラクチン血症	1
		低ナトリウム血症	2
		肝障害	1
		心筋梗塞	1
		悪性症候群	15
		好中球減少症	1
		過量投与	2
		急性肺炎	1
		パーキンソニズム	1
		持続勃起症	3
		肺血栓症	1
		発熱	1
		横紋筋融解	5
		洞不全症候群	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		胎児頻脈	1
		遅発性ジスキネジー	1
		血小板減少症	1
		水中毒	4
		男性性器感覚異常	1
		呼吸器ジスキネジー	1
		脂質代謝障害	1
117	マレイン酸フルボキサミン	腹痛	1
		アカシジア	1
		意識変容状態	1
		食欲不振	1
		不安	1
		房室ブロック	1
		心停止	1
		心肺停止	1
		白内障	1
		子宮頸部癌	1
		昏睡	1
		自殺既遂	2
		錯乱状態	1
		便秘	1
		痙攣	9
		意識レベルの低下	2
		抑うつ気分	1
		うつ病	1
		浮動性めまい	1
		薬剤離脱症候群	2
		新生児薬物離脱症候群	2
		味覚異常	1
		心電図ST部分下降	1
		脳波異常	1
		喉頭蓋炎	1
		乳汁漏出症	1
		胃十二指腸潰瘍	1
		幻覚	2
		聴覚障害	1
		肝機能異常	1
		多汗症	1
		高カリウム血症	1
		低ナトリウム血症	2
		低血圧	1
		不眠症	2
		企図的過量投与	4
		INR増加	2
		腸閉塞	1