

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		傾眠	3
		新生児傾眠	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		昏迷	1
		突然死	2
		自殺念慮	6
		自殺企図	26
		失神	1
		血管迷走神経性失神	1
		頻脈	1
		頻呼吸	1
		催奇形性	1
		口渇	1
		分娩開始切迫	1
		血小板減少症	2
		振戦	7
		尿閉	1
		子宮平滑筋腫	1
		心室中隔欠損症	1
		嘔吐	3
		体重増加	1
		白血球数減少	1
		精神運動機能障害	1
		殺人念慮	1
		筋緊張	1
		自傷念慮	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	14
		無脾	1
		退行行動	1
		パーキンソン歩行	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		肝酵素上昇	1
		先天性大血管異常	1
		異常行動	1
		体感幻覚	1
		自傷行動	6
		アクティブーション症候群	10
		廃用症候群	1
117	フマル酸ケチアピン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3
		意識変容状態	2
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中ブドウ糖増加	2
		血中カリウム増加	1
		徐脈	1
		運動緩慢	1
		心肺停止	2
		蜂巣炎	1
		胆汁うっ滞	1
		自殺既遂	1
		痙攣	2
		糖尿病	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	5
		薬疹	1
		薬物相互作用	1
		薬物毒性	1
		尿中ブドウ糖陽性	1
		肝機能異常	3
		高血糖	5
		低血糖症	1
		低血圧	1
		低体温	1
		イレウス	3
		黄疸	1
		肝障害	2
		QT延長症候群	2
		意識消失	1
		肺障害	1
		縮瞳	1
		新生児呼吸抑制	1
		ネフローゼ症候群	1
		悪性症候群	15
		パーキンソニズム	1
		血小板数減少	2
		嚥下性肺炎	1
		精神運動亢進	1
		発疹	1
		呼吸停止	1
		呼吸抑制	1
		横紋筋融解	1
		鎮静	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		突然死	2
		遅発性ジスキネジー	2
		血小板減少症	1
		トルサード ド ボアン	2