

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	3
		ショック	2
		不活発	1
		妊娠週に比して小さい児	1
		新生児傾眠	1
		てんかん重積状態	1
		突然死	1
		自殺念慮	1
		自殺企図	5
		遅発性ジスキネジー	1
		分娩開始切迫	1
		強直性痙攣	2
		霧視	1
		新生児嘔吐	1
		体重減少	1
		体重増加	3
		白血球数減少	3
		深部静脈血栓症	1
		間代性痙攣	1
		ミオクローヌス性てんかん	1
		新生児呼吸障害	1
		高脂血症	4
		処置による低血圧	1
		企図的多剤過量投与	1
		アナフィラキシー様ショック	1
		低血糖性意識消失	1
		廃用症候群	1
		細胞遺伝学的異常	1
117	アリピプラゾール	流産	1
		稽留流産	1
		攻撃性	1
		激越	1
		アカシジア	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		不安定狭心症	1
		不安	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		無力症	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	4
		血中ブドウ糖増加	3
		血中カリウム増加	1
		心不全	3
		心肺停止	4
		自殺既遂	10
		痙攣	15
		死亡	1
		脱水	1
		妄想	11
		糖尿病	1
		下痢	1
		脱抑制	1
		薬物毒性	1
		新生児薬物離脱症候群	1
		ジストニー	4
		子宮外妊娠	1
		心電図QT延長	1
		脳波異常	1
		情動障害	1
		グリコヘモグロビン増加	1
		大発作痙攣	2
		幻覚	5
		幻聴	2
		肝不全	1
		肝機能異常	3
		高血糖	9
		低血糖症	2
		低カリウム血症	1
		不眠症	1
		易刺激性	2
		白血球減少症	1
		リビドー亢進	1
		肝障害	3
		心筋虚血	1
		悪性症候群	20
		過量投与	1
		汎血球減少症	1
		妄想症	3
		嚥下性肺炎	1
		徘徊癖	1
		プロトロンビン時間延長	1
		精神運動亢進	1
		発熱	1
		急性腎不全	1
		呼吸障害	1