

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		潰瘍性大腸炎	1
		咳嗽	1
		意識レベルの低下	1
		播種性血管内凝固	1
		胃腸出血	1
		尿中ブドウ糖陽性	1
		肝機能異常	3
		高カリウム血症	1
		低血糖症	1
		低血糖昏睡	1
		低カリウム血症	1
		低ナトリウム血症	1
		低血圧	1
		甲状腺機能低下症	1
		角膜機傷	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		ミオパチー	1
		悪心	1
		間質性腎炎	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		末梢性浮腫	1
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		そう痒症	1
		発疹	1
		腎障害	1
		急性腎不全	2
		慢性腎不全	1
		横紋筋融解	1
		皮膚萎縮	1
		タキフィラキシー	1
		血小板減少症	1
		甲状腺炎	1
		嘔吐	1
		喘鳴	1
		中毒性皮疹	1
		食欲減退	1
		糖尿病性腎症	1
		腎機能障害	1
		咽喉頭不快感	1
214	カンデサルタンシレキセチル	急性心筋梗塞	1
		無顆粒球症	1
		貧血	1
		狭心症	1
		血中クレアチニン増加	2
		血中カリウム増加	1
		血中尿素増加	1
		徐脈	1
		心停止	1
		慢性心不全	1
		小脳梗塞	1
		脳梗塞	4
		先天異常	1
		死亡	1
		浮動性めまい	2
		大腿骨骨折	1
		肝機能異常	3
		高カリウム血症	5
		高熱	1
		低カリウム血症	1
		低ナトリウム血症	1
		低血圧	1
		間質性肺疾患	10
		白血球減少症	1
		肝障害	2
		新生児仮死	1
		新生児呼吸窮迫症候群	1
		羊水過少	1
		骨形成不全症	1
		過量投与	1
		汎血球減少症	2
		動脈管開存症	1
		胎児循環遺残	1
		血小板数減少	1
		気胸	1
		肺低形成	1
		腎不全	2
		急性腎不全	3
		新生児腎不全	1
		横紋筋融解	6
		洞不全症候群	1
		突然死	1
		自殺企図	1
		顔面腫脹	1